

COMMENTARII
DE REBUS
IN
SCIENTIA NATVRALI
ET
MEDICINA
GESTIS.



VOLVMINIS XI. PARS IV.

LIPSIAE MDCCLXIV.

APVD IOH. FRIDERICVM GLEDITSCH.

Venduntur etiam

Amstelodami apud I. Schreuder et P. Mortier iun. Parisiis apud Briasson, Patavii
apud I. Manfr , Holmiae apud L. Saluiam.





I.

Noui Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. Tom. VII. pro annis *C13 13CCLVIII* et *C13 13CCLVIII*. Petropoli typis Academiae scientiarum. 1761. in Quarto. Alph. 3. tab. aen. 19. Tom. VIII. pro annis *C13 13CCLX* et *C13 13CCLXI*. Ibid. 1763. Alph. 3. pl. 7. tab. aen. 14.



Omissis aliis dissertationibus, quae in duobus hisce Commentariorum Academiae Petropolitanae voluminibus continentur, liceat nobis ratione consueta, eas tantum indicare, quae propius ad nos pertinere videntur. Ex his vero voluminis septimi classis physico-mathematica sequentes articulos complectitur.

De quibusdam circa lentes causticas et specula vstro- T. VII.
ria emendatis et nouiter inuentis, Cl. I E. ZEIHNER P. 237.
agit. Cl. Auctor exemplo Cel. *BUFFON*, cuius ta-

men inuenta ad ZEIHERVUM, hanc dissertationem elaborantem, nondum peruenerant, studuit, plura specula plana ita combinare, vt coniuncta sphaericam superficiem obtinerent, quo lumen eorum reflexum, et in eundem locum proiectum, idem praestaret, quod speculum concauum metallicum. Tabulis porro vitreis planis ignis vi curuaturam induxit, easque ita incuruatas retinuit, quibus vel vt speculo vstorio, vel binis coniunctis et cauitate intermedia aqua repleta, vt lente vstoria vti licet.

- p. 252. *Phaenomenorum iridis s. arcus coelestis disquisitio.* Auctore Cl. S. KOTELNIKOW. Originem, naturam et phaenomena iridis, ex principiis dioptricis explicat.
- p. 277. *Descriptio ac explicatio quorundam experimentorum electricorum.* Auctore Cl. F. V. T. AEPINO. Experimentum electricum cum acu magnetica, a Patribus Societ. Iesu qui Pekini commorantur institutum, Cl. AEPINVS repetiit, et hic explicationem eius ex theoria electrica Frankliniana tradit.
- p. 303 *Observatio optica de mutabilitate diametri apparentis foraminis angusti oculo propinqui, EODEM Auctore.* Singularem inter vtramque pupillam, ratione mutationis diametri, obseruauit consensum, quo, vel vno tantum oculo fortiori lumini exposito, tamen se pupilla quoque alterius oculi, etsi multo minorem lucis copiam excipiat, contrahit. Deinde adnotauit idem, si quis oculo v. gr. sinistro, per foramen exiguum obiecta spectat, tunc multo maiorem visionis campum, se ipsi offerre clauso dextro, quam eo aperto. Huius vero phaenomeni ratio in eo est sita, quod aperto oculo dextro, eiusque pupilla ob maius lumen coarctata, simul sinistri oculi pupilla contrahebatur, quae nunc dextro clauso

clauso, ob minorem lucis copiam, per foramen acceptam expanditur, maioremque visionis campum complectitur.

Acus nouae declinatoriae descriptio. Auctore Cl. P. 309.

ZEIHER. Modum ille excogitauit, acum magneticam sine vlllo capitulo suspendendi, quo se liberri-
me ad omnes plagas conuertere, et vim se dirigen-
di sine vlllo impedimento exercere queat.

In classe autem physica sequentes occurrunt dis- P. 315.

sertationes. *Nitraria planta obscura explicata* a Cl.

CAROLO LINNAEO. Primus hanc plantam, Rus-
siae indigenam, in vicinia officinae nitrariae Astra-
chanensis obseruauit SCHOBERUS, eandemque *Ni-
trariam* vocauit. Postea illam ad lacum quendam sal-
sum Sibiriae repertam GMELINUS nomine *Cassiae*
fructu nigro descripsit, AMMANNO illius descriptio-
nem publicantē. Idem vero GMELINUS in Sibirica
flora, nomen *Osyridis foliis obtusis* ex LINNAEI horto
Vpsaliensi adsumsit, figuramque eius, mancā tamen,
exhibuit.

Cl. LINNAEVS, qui per plures annos
plantam hanc sterilem coluit, tandem post varia
alia tentamina, sale radicibus adiecto, flores eius
obtinueit, eosque, nondum accurate descriptos, ver-
bis hic et figura depingit. Habet vero, vti ex de-
scriptione eius patet, planta haec radicem ligno-
sam, fibrosam, patulam. Caulis eius fruticosus
est, sesqui - seu bipedalis, diffusus, prostratus, ra-
mosissimus, rimosus et cinereus. Rami alterni sunt,
subadscendentes, ramosi, caulis longitudinem ha-
bent, et subincani sunt, atque ad folia dentibus
truncatis et obtusis prominent.

Praeteritorum
annorum ramuli saepe apice arido, qui spinam fra-
gilem mentitur, terminantur. Folia ramea, alter-
na, erecto patula sessiliaque sunt et bina, raro 3.
4. seu 5. occurrunt, sed floralia et superiora in fer-

tiliori solo terna sunt, tamen simplicia. Foliola sunt sessilia, lanceolata linearia, subcarnosa, integerrima, obtuso - acuta, auenia, planiuscula, pollicaria, annua et superius magis a se inuicem diuergunt. Stipulae duae minimae et acutae adsunt, inflexae, obscurae dentibus ramorum insertae. Pedunculi saepius duo sunt, solitarii, adscendentes, teretes, aphylli, ebracteati, laeues, virides, foliis duplo longiores. bifidique, altero ramo bifido, altero trifido, subracemosi. Flores habet subsessiles, e latere superiore ramulorum pedunculi prouenientes, alternos saepe quinque vel sex. Calyx est perianthium monophyllum, semiquinquefidum, erectum minimum, acutum, persistens. Corolla petala quinque lineari lanceolata habet, canaliculata, apice fornicato, inflexoque hamata et acuminata. Stamina: Filamenta adsunt quindecim, subulata erectiuscula, petalorum longitudine. Antherae subouatae sunt, et luteae. Pistillum habet germen conicum desinens in stylum breuissimum et stigma conicum scabrum. Pericarpium drupa est ouato - oblonga monosperma. Semen nux ouata, acuta, trilocularis. Ex his vero apparet, genus huius plantae esse distinctissimum, nec cum ullo alio facile confundendum. Pertinet autem ad pentapetala regularia RIVINI, et dodecandra monogyna LINNAEI.

p. 321. *Polypi marini Russis Karakatiza, recentioribus Graecis Οκτάπγς dicti descriptio.* Auctore Cl. Ι. Τ. KOELREYTER. Animalia haec exenterata et siccata, in Russiam copiose importari solent, cum palato tempore ieiunii gratum praebeant edulium. Pedes octoni, forma et longitudine inter se similes, et acetabula duorum ordinum, situ inter se alterna et sessilia *Polyporum* genus a *Loligine* et *Sepia* distinguunt. Abdomen quoque in *Polypis* ouatum et conuexum molleque est, pinnisque lateralibus hoc
genus

genus destituitur. Haec vero species huius generis, quam accuratius sibi describendam Cl. Auctor sumsit, dicitur ab eo *Polypus pedibus octo, similibus, intermediis quatuor crassioribus: acetabulorum alternantium ordine duplici instructis*. Primo autem mensura magnitudinis polypi, eiusque partium, ex diversis polypis desumpta traditur. Substantia musciosa est, durior tamen quam aliorum animalium caro. Cutis ipsa insignem laeuitatem habet, neque ullis pilis aut squamis ornatur. In toto corpore nullum os verum delitescit. Color in dorso ex purpureo nigricans et saturatus est, in supina vero parte pallidus deprehenditur. Distinguit vero Noster polypum in caput, pedes et abdomen. Primum autem pedum situm diuersamque eorum crassitiem subtilius describit. Per totam eorum internam faciem acetabula distribuuntur, vascula scilicet conica, duriuscula, fundo eleuato, lateribus orbicularibus strictis et mollioribus praedita. Varietatem longitudinis pedum, numerique acetabulorum Cl. Auctor ex comparatione duorum polyporum cognouit, et in adiecta tabula explicat. Ex ea adparet, acetabula, licet organicae valde sint structurae, tamen cum corporis incremento numero augeri, pedes polypis mutilatos redintegrari, renatamque partem nouis instrui acetabulis. Interiora pedum membranis satis validis ex cute duplicata ortis coniunguntur. In capite oris apertura est, in pedum centro posita, elliptica et exigua, dentesque bini nigricantes prominent, ipsa vero oris labia plicata sunt. Ipsum autem caput in vniuersum paruum est, imaeque pedum basi proxime iungitur. Oculi duo sunt, ad latera capitis positi, subrotundi, et praeter eos in capite tres quoque appendiculae cutaneae deprehenduntur. Collum adeo breue est, vt colli nomen illud vix mereatur. Abdomen vero

ouatum, et vtrinque compressum, atque in eius dorso decem appendiculæ apparent, quæ a cute elongata, suam originem ducunt. Sed in inferiore abdominis parte alvei apertura est, tam large patens, ut facile pulmones per eam conspiciantur. Nam abdomen saccum refert musculosum, in quo præter pulmones alia quoque viscera, propriis inuoluta membranis reconduntur. In summo ventre supra alueum, fistula caua super capitis faciem inferiorem antrorsum exporrigitur, quam modo in dextram, modo in sinistram partem transferre, illiusque opere mare transmittere polypi dicuntur. Refert autem illa infundibulum conicum et ouatum. Ad basin vtrinque cum ea velum aliquod connectitur, quo expanso sinus amplius se adspicientibus offert. In vniuersum vero non fistula solum, sed et vela illa, ex tunicis musculosis et ferme cartilagineis componuntur. In spatio inter imum fistulae et velorum, summumque alvei marginem relicto, duo lacerti musculosi ad latera positi conspiciuntur, qui ab angulo fistulae veloque communi principio lato proueniunt, in cuius medio duo canales ad tres fere lineas profundi aperiuntur. Simile quoque ostium Noster aliquando in postica parte abdominis deprehendit. Ad illud pertinebat canalis duriusculus et laevis ipsius abdominis substantiam perforans.

P. 344. *Zoophyti marini e Coralliorum genere historia.*
Autore EODEM. Est hoc *Corallium spongiosum, leue; ramis tuberosis, nutantibus; tuberculis aggregatis*, a LINNAEO autem vocatur *Alcyonium stipite arborecente, ramis obtusis*. Monet tamen Noster, tantum ab Alcyonio distare, quantum Agaricus a Lycoperdo, atque forma, substantia atque structura diuersissimum esse. Externam internamque Zoophyti huius structuram diuersasque, quæ in eo occurrunt partes, Cl. KOELREYTER ea, qua pollet,

let, dexteritate et elegantia deferibit, variosque Auctores, qui de coralliis egerunt, inprimis MARSILLIVM hinc inde emendat, tandemque chemicam eius analyfin, variorum menſtruorum et ignis ope inſtitutam, proponit. Ex hac patet, contineri in eo zoophyto praeter ſal marinum, aliquod principium alcalinum bituminofum, nec non terram calcaream, oleumque animale volatile. Terrae, ſalis volatilis oleique copia in variis eiusmodi zoophytis varia eſt.

Deſcriptio tubiporae maris albi indigenae. Au- p. 374.
Auctore EODEM. Eſt illa tubipora ramoſa; interſtitiis ſubrotundis diſtincta, tubulis ramorum confluentium ſimplicibus, flexuoſis, aggregatis et conglutinis. Haec tubipora ad hunc uſque diem incognita, ſi chemice examinatur, etiam de intima naturae vegetabilis et animalis vnione teſtatur, cum, vt praecedens zoophytum, olei animalis volatilis alcalini indicia exhibeat.

Continuatio hiſtoriae zoophyti marini e coralliorum p. 377.
genere. Auctore EODEM. Corallii ſpongioſi exemplum, quod in hac diſſertatione deſcribitur, cum ſpecie, de qua antea dictum eſt, omnibus notis eſſentialibus conuenit, ſed accidentalibus differt. Inſignis enim eius magnitudo oſtendit, plantas marinas ſaepe in tantam molem excreſcere, vt magnitudine ſua terrae arbores exaequent. Zoophyto huic adiungit Noſter deſcriptionem *tuberis* cuiusdam, quod *pyriforme nutans* que vocat.

Obſervationes meteorologicae factae Petropoli anni p. 388.
1755. et 1756. ſt. v. et conſectaria. Auctore Cl. I. A. BRAVN. Continuationem obſervationum, quae in Volumine quinto horum Commentariorum continentur, Cl. Auctor exhibet. Singulare eſt, primis Februarii a. 1755 diebus frigus in Germania circa Goettingam magis intenſum fuiſſe, quam Petropoli.

tropoli. Cum vero Cl. Auctor thermometro Deliliano usus sit, in eorum gratiam, qui illud non possident, tabulam adiecit, in qua omnia thermometra maxime usitata, inter se exacte comparantur.

P. 39. In *Summario dissertationum*, quas tomus hic continet, quaedam supplementa ad Beat. G M E L I N I historiam *Ibicus imperbis*, quae in horum commentariorum volumine quinto exstat, communicantur. Ex iis adparet, descriptionem animalis huius ibidem traditam, festinationem, qua confecta est, quodammodo redolere. Quo vero clarius figura et habitus huius animalis patefcant, marem et foeminam delineari et aeri incidi Academia curavit.

Octavi voluminis classis physico - mathematica
sequentibus articulis componitur.

T.VIII. *Dilucidationes de resistentia fluidorum.* Auctore

P. 197. L. EVLERO. Principia vnde resistentiae fluidorum vulgo deducuntur examinat, et cum ea hypothesi manifesto falsae innitantur, qua, ad similitudinem collisionis corporum solidorum, particulae fluidi corpus in eo motum similiter percutere assumuntur, illa, tanquam omni fundamento destituta reiicit. Ostendit potius, in resistentia nullam plane collisionem, similem ei, qua solida se percutiunt, admittendam esse, corpusque in fluido motum ab eo non aliam vim sustinere, praeter pressionem, quam fluidum praeterlabens, in totam eius superficiem circumquaque exferit, et resistentiam esse effectum, ex omnibus his pressionibus natum, motui corporis contrarium. Disquirat quoque, quomodo cognita ea pressione, qua corpus vrgetur, ipse motus fluidi iuxta corpus defluentis definiri possit.

P. 230. *Principia theoriae machinarum.* Auctore EOD-DEM. Non vulgarem machinarum theoriam tradit,

dit, sed ea potissimum, quae ad effectum machinarum determinandum attinent, explicat.

De motu et attritu lentium, dum super catinis poliuntur, IDEM differit. In attritum, quem catinus a lente patitur, inquit, et varia consilia artificibus, qui in hoc opere versantur, tradit, docetque, motum lentis super catino ita esse comparatum, ut inde necessario minimus attritus oriri debeat.

De noua quadam vectis proprietate Cl. AEPH. P. 271. **NVS** agit. Considerat vectem aequalium brachiorum, quorum extremitates binae, ad bina virium centra infinite remota, singulatim, viribus quibuscunque sollicitentur, quaeritque fitum, quo vectis sit in aequilibrio futurus.

Descriptionem instrumenti cuiusdam nautis Barometri ad instar inseruituri, Cl. ZEIHNERUS exhibet. Cum barometra in nauibus, ob continuos motus, usum nullum praestare possint, ex ipsius aëris indole Noster mensuram elasticitatis eius excogitauit. Commendat autem cylindrum cauum, omni aëre vacuum, cuius bases mobiles sunt. Inter eas vero in ipso vacuo elastrum constituit, eas distendens, pressionique aëris exterioris ita resistens, ut tensio elastri semper cum pressione aëris in aequilibrio sit. Aucta itaque aëris elastica vi, bases propius ad se accedunt, recedunt ea minuta, sicque ex earum distantia aëris pressio patebit.

Duarum machinarum, vnius ad perficienda quaedam instrumenta, germ. raendeleisen, alterius ad cochleas infinitas exscindendas idoneae, descriptio. Auctore EODEM.

Acus nauticae nouae descriptio. Auctore EODEM. p. 284. Superius iam proprietates exposuit, quibus effectum est, ut pertica chalybea, vim maximam magneticam, nec nisi popos duos acceperit; nunc modum excogitauit, quo prisma eiusmodi chalybeum

beum ita suspenditur, vt se libere circummoueat, et pyxidis nauticae instar inferuire queat.

P. 286. *De aequilibrio virium corporibus applicatarum, commentatio.* Autore Cl. KOTELNIKOW.

P. 304. *De commoda acus declinatoriae suspensione dissertatiuncula.* Auctore EODEM. Aliud artificium excogitauit, commodae acus sine perforatione eius suspensionis.

Classis physica sequentes continet dissertationes:

P. 315. *Plantarum aliquot rariorum descriptiones completae.* Adiectae sunt delineationes III. Auctore Cl. I. CHRIST. HEBENSTREIT. Prima ea planta est, quam AMMANNVS *Argusiam*, LINNAEVS in Horto Vpsalienfi *Messerschmidiam*, et in Speciebus Plantarum *Tournefortiam* (sibiricam) *foliis lanceolatis, floribus corymbosis, caule herbaceo* vocauit. Calycem habet monophyllum, quinquesidum, laciniis lanceolatis, hispidis, conniuentibus, dimidiam tubi partem haud attingentibus. Corolla monopetala est, regularis, infundibuliformis, tubo cylindrico in fundo globofo, limbo quinquifido, segmentis ad horizontem directis, sulco longitudinali excauatis, in ambitu sinuatis, apicibus extremis deorsum flexis. Stamina quinque in medio tubi, filamenta sustinent antheras breuissimas, subulatas. Pistillum staminibus breuius est, stigmate globofo scabro, quod extremitati globosae tubi clauis instar infigitur. Semina sunt duae capsulae osseae, substantia spongiosa exterius vestitae, secundum longitudinem leuiter cohaerentes, quarum quaelibet in parte exteriori conuexa, transuersim dissecta, duos nucleos oblongos, incuruatos, angulatos, in loculamentis separatis includit. Ex his Cl. HEBENSTREIT concludit, plantam hanc a *Tournefortia* differre, cum filamenta non sint longitudine tubi corollae, sed brevissima,

vissima, antherae non in fauce corollae, sed profundius in medio tubi haereant, fructusque ficcus sit, ex duobus hemisphaeriis coalitus, quorum singulum duo loculamenta distincta habet, semen vnicum includentia. Quapropter in honorem Cl. DANIEL GOTTLIEB MESSERSCHMID, qui ab anno 1719 ad 1727 Sibiriae plantas disquisiuit, eam Cl. HEBENSTREIT *Messerschmidiam* vocat, cum character eius ab aliorum generum characteribus differat. Partes vero huius plantae, eiusque habitus in adiecta tabula aenea delineantur. Altera planta, cuius accurata descriptio hic traditur, est *Aeschynomene* P. 321. (americana) caule herbaceo bifido, foliolis acuminatis, leguminum articulis semicordatis, bracteis ciliatis LINN. Spec. f. *Hedysarum caule hispido mimosae foliis alatis, pinnis acutis minimis gramineis.* SLOAN. Jamaic. Accuratam figuram ad viuam plantam factam, qualis nulla hucusque aderat, Cl. Auctor exhibet. Ter. p. 325. tium locum occupat, *Verbesina foliis oppositis ovato-acutis integerrimis, scabris, pedunculorum summitatibus incrassatis, et foliosis* f. *Rudbeckia foliis oppositis hirsutis, ovato-acutis, calyce imbricato cylindrico, radii petalis vifillatis ZINNII* *). Absoluta partium plantae huius expositione, Cl. Auctor ex calyce squamoso, thalamo paleaceo et seminibus angulosis concludit, eam ad *Verbesinae* genus pertinere. Celeberrimus IVSSIEU hanc plantam Lipsiensibus nomine *Bidentis saponariae folio* communicauit, vnde semina eius Petropolim missa fuerunt, vbi Cl. Auctor a. 1757. hanc descriptionem composuit, delineationemque conficere curauit, quam ob plantae elegantiam hic tradere, quamquam ZINNII descriptio et figura interim prodierat, non dubitauit. Quar. P. 331. ta est *Brassica* (chinensis) foliis ovalibus subintegerrimis, floralibus amplexicaulibus, lanceolatis, calycibus

*) Est *Zinnia pauci flora* 1. Linn. Spec. Ed. II. p. 1261.

lycibus unguibus petalorum longioribus LINNAEI. Plantae huius femina, ex China Academia accepit, qua occasione Cl. Auctor varias, easque curiosas circa hanc, aliasque Sinensium brassicas, adnotationes tradit.

- P. 339. *De gradibus frigoris summis, quos certa fluidorum genera ferre possunt, antequam fiant solida, in glaciem abeuntia, atque gradibus summis caloris, quos accipere possunt, donec bullire incipiant, et in ipsa bullitione continuata, dissertatio experimentalis.* Auctore Cl. BRAUN. Scalam graduum frigoris et caloris NEWTONUS primus publicavit, cuius vestigia Noster, in primis in frigoris scala perficienda, optimo cum successu legit. Materiae vero, circa quas Cl. Auctor durante hieme anni 1757 et 1758 experimenta instituit, fuerunt salium solutiones, vina et spiritus vini, olea expressa, oleosaeque corpora, tandemque metalla quaedam. Semper thermometro Deliliano usus est. Ex comparatione variorum frigoris graduum, sub quibus diuersorum salium solutiones in glaciem abeant, adparet, solutionem salis communis et ammoniaci, maximum frigoris gradum sc. 181. et 182., minimum sc. 151. solutionem tartari albi ad congelationem requirere. Hinc nullum sal congelationem aquae magis quam sal marinus et ammoniacus impedit. Salium solutiones igni adhibitae, sub minori gradu quam aqua pura ebullire incipiunt. Vinum generosum hispanicum sub gradu 167. in glaciem abiit, rhenanum 159. cereuisia ordinaria 152. spiritus vini rectificatus sub gradu frigoris 197. nullum adhuc congelationis vestigium ostendebat, vulgari iam sub gradu 190. in glaciem mutato. Contra omnia fluida spirituosae eo minori gradu caloris ad ebullitionem opus habent, quo maiorem spiritus copiam continent. Oleum oliuarum gradu 165. iam in massam solidam abit, lini vero sub

sub gradu demum 197. in glaciem mutari et perfecte indurari Noster expertus est, quamquam vulgo illud nullo frigoris gradu indurari existimatur. In vniuersum, oleum quo purius est, eo magis congelationi resistit; hinc essentialia expressis longe difficilius congelantur. Ebullitionem autem expressa olea gradu 360. supra 0. ostendunt, cum vero mercurium in thermometro, quo in definiendo caloris gradu uti solent, ipsum bullientem efficiant, finem mox obseruationi imponunt. Oleorum vero ebullitio in vniuersum duplex esse videtur, prior ab aqua pendens cum strepitu fit, posterior placida est, sineque strepitu. Hoc in butyro quoque et cera obseruatur. In vniuersum oleorum expressorum et corporum oleosorum ebullitioni, gradum mercurii ebullientis tribuere possumus. Plumbum in tentaminibus Nostri liquefieri coepit, sub gradu supra 0. 320-596. sc. Fahrenh. stannum purum gr. supra 0. 170-416. sc. Fahr. bismuthum gr. supra 0. 235-494. Fahr. Zinci gradus liquefactionis non definiri potest, nam mercurius prius bullire coepit, quam zincum liquefieret. Concludit tandem Noster, metalla firma pro congelatis, et glaciei specie reputari debere, quae multo tamen minorem frigoris gradum quam aquae glacies requirit. Quae de congelatione mercurii hic occurrunt, non adeo plena sunt et definita, uti ex recentiori Autoris scripto, quod suo loco indicauimus, cognosci possunt *). Initium vero ebullitionis mercurii, figi posse videtur, circa gradum supra 0. 419 - 715. Fahrenh.

Cautelae circa obseruationes meteorologicas adhibendae. Auctore Cl. PETRO VAN MUSCHENBROEK. Ostendit B. Autor hac dissertatione defectus et imperfectiones obseruationum meteorologicarum,

p. 367.

*) vid. Comment. nostr. Vol. X. P. II. p. 212.

carum, et quomodo tales observationes perfectae et accuratae faciendae sint, ostendit.

P. 392. *Halonum extraordinariorum descriptio.* Auctore Cl. AEPINO. Nouum halonum genus producit. Vidit enim haloni consuetae circulari ellipticam halonem ita iunctam, vt axis minor verticalis diametrum halonis circularis aequaret, maior horizontalis sex diametris solaribus circiter axem minorem superaret.

P. 404. *Piscium rariorum e museo Petropolitano exceptorum descriptiones.* Autore Cl. KOELREUTER. In ingenti rerum naturalium thesauro, qui in Museo Petropolitano asseruatur, insignis etiam piscium collectio continetur, quae PETRUS MAGNUS Russorum Imperator, ab ALB. SEBA pretio comparauit. Cum vero tertius thesauri SEBAE tomus, qui pisces exhibere debebat, nunquam editus sit, Noster pisces rariores huius musei describere aggressus est. Primus ex his est *Gasteropelecus* GRONOV. f. *Clupea pinnis flauis ventralibus minutissimis* LINN. Secundus *Trutta dentata*, dorso plano, abdomine acuto, prominente, taenia longitudinali argentea, pinna ani longissima. *Piabucu Brasil.* MARGGRAF. Tertius *Gobio pinnis pectoralibus flabello insistentibus, pinna dorsi prima radiorum 12, secunda 13.* Horum piscium accuratas descriptiones et figuras Noster exhibet, accurata omnium earum partium mensura adiecta.

II.

Ornithologia siue Synopsis Methodica, sistens Avium diuisiones in Ordines, Sectiones, Genera, Species ipsarumque Varietates. Cum accurata cuiusque speciei descriptione, Citationi.

tionibus Auctorum de iis tractantium, Nominibus eis ab ipsis et Nationibus impositis, Nominibusque vulgaribus. A. D. BRISSON, Regiae Scientiarum Academiae Socio. Opus figuris aeneis adornatum. Parisiis apud Cl. Ioannem - Baptistam Bauche 1760 4. Tom. I. Alph. 3. pl. 11. tab. aen. 38. cum titulo. Tom. II. Alph. 3. pl. 3. tab. aen. 45. Tom. III. Alph. 4. pl. 12. tab. aen. 37. Tom. IV. Alph. 3. pl. 10. tab. aen. 46. Tom. V. Alph. 3. pl. 6. tab. aen. 42. Tom. VI. Alph. 3. pl. 7. tab. aen. 47. Cui tomo accedit: Supplementum Ornithologiae, siue citationes, descriptionesque antea omissae et species de nouo adiectae, ad suaque genera relatae. pl. 21. tab. aen. 6.

et

Ornithologie ou Methode contenant la Division des Oiseaux en Ordres, Sections, Genres, Especies et leurs Variétés. A laquelle on a joint vne Description exacte, de chaque Espece, avec les Citations des Auteurs qui en ont traité, les Noms qu'ils leur ont donnés, ceux que leur ont donnés les différentes Nations, et les Noms vulgaires. Par M. BRISSON, de l'Académie Royale des Sciences. Ouvrage enrichi de Figures en taille-douce. T. I. II. III. IV. V. et VI. Cui tomo adnectitur: Supplement d'Ornithologie ou les citations et descriptions précédemment omises, aux quelles ont a joint les especes nouvellement découvertes, rapportées chacun a leur genre.

Tom. XI. Pars IV.

Pp

Id

In hocce egregio splendidissimoque opere Clarissimus BRISSON regni animalis partes omnes explicare pergit, cum illud tertiam classem animalium, aves scilicet, contineat *). Mora vero, quae inter priorum classium huiusque editionem intercessit, nata est ex laudatissimi Auctoris desiderio, opus hoc quantum eius quidem fieri possit perficiendi augendique. Quapropter ex hac re liber hic maximam adquisiuit praestantiam. Plurimae enim avium species rariores, specierumque varietates plurimae hoc ipso tempore Clarissimo Auctori innotuerunt, eae scilicet, quae ex omnibus totius terrarum orbis partibus Cl. REAUMURIO transmissae fuerunt, ab iis qui mutuum litterarum commercium cum eo colunt. In vniuersum vero ratio huius operis, cum ea conuenit, quae in prioribus classibus de quadrupedibus et cetaceis disseruit. Plurimas avium species, quae hic describuntur, Cl. Auctor ipse examinavit, reliquarum descriptiones ex optimis scriptoribus desumpsit, quos vbique indicat. Semper autem in avis cuiuslibet descriptione ita versatur, vt primo suum nomen, autorumque synonyma et figuras iudiciumque de earum praestantia proponat. Addit quoque triuialia nomina et nomina, quae a diuersis gentibus auibus imponuntur, qua tamen in re, si vel de germanicis nominibus iudicium nobis ferendum sit, insignes saepe errores irrepsere, nominumque numerus sine vlla necessitate maxime auctus est. Deinde aues, magnitudi-

nem

*) *Regnum animale in classes nouem distributum, siue Synopsis methodica sistens generalem animalium distributionem in classes IX. et duarum primarum classium quadrupedum scilicet et cetaceorum particularem diuisionem*, prodiit Paris. 1756. vid. Comment. I. Decadis Suppl. I. p. 129.

nem earum et formam, partiumque rationem et diuersitatem coloresque ample et dilucide verbis depingit, additque loca, vbi aues nascuntur, eosque, a quibus Cl. REAUMUR harum auium exempla missa sunt: characteres ordinum generumque ex pedum rostrique differentiis desumfit, et figuris, in septem prioribus tabulis aeneis contentis, explicauit. In vniuersum 150 circiter genera, et 1500 species varietatesque enumerat. In tabulis aeneis circa 500 aues depinguntur, ex quibus 350 nunquam antea, 150 autem male delineatae, 320 non descriptae fuerunt. Varias figuras auium nondum cognitarum a Cl. POIVRE, qui aues Indiae Orientalis magna cura disquisiuit, accepit, has tamen a suis adiecta nota distinxit. In maiorum auium figuris scalam mensurae semper adiecit.

In ipsius operis initio conspectum quendam generalem methodi, secundum quam aues disposuit, tradit, deinde hunc conspectum in tabulis adiectis generum explicat, tandemque se ad singulorum ordinum considerationem conuertit.

Aues in vniuersum, vel digitis membranis desti- Tom.I.
tutis praeditae sunt, quae *Fissipedes* dicuntur, vel di- P. I.
gitos habent membranis per totam longitudinem au-
ctos, et *Palmipedes* vocantur. *Fissipedum* autem
crura, vel ad calcaneum vsque plumosa sunt, vel
in parte inferiore plumis destituuntur. *Palmipedum*
digiti vero per totam suam longitudinem membra-
nis augentur, vel fissis, vel semifissis vel integris.
Et haec est generalis methodi a Cl. Auctore tradita
idea, secundum quam decem et septem auium ordi-
nes ad *Fissipedes*, nouem ad *Palmipedes* pertinent.
Horum vero ordinum tres priores, in primo huius
operis volumine continentur. Primus itaque ordo
eas comprehendit aues, quae digitos habent qua-

tuor membranis destitutos, tres scilicet anteriores, vnum posticum, omnes ad exortum vsque aut circiter discretos: rostrum rectum: mandibulae superioris apicem crassiore parumper et incuruum: nares membrana crassa et molli semitectos. Vnicum genus ad hunc ordinem refertur, *Columbae*. Huius generis sequentes species in tabulis quindecim prioribus delineantur. T. I. quae octaua est totius operis: *Turtur carolinensis*, *Turtur parvus fuscus americanus* et *Turtur gutture maculato senegalensis*. T. II. siue IX. *Turtur parvus americanus* s. *Columba passerina* LINN. *Turtur Cap. bonae spei* et *Turtur amboinensis*. T. X. *Turtur senegalensis* et *Columba viridis amboinensis* T. XI. *Turtur torquatus senegalensis* et *Columba viridis philippensis*. T. XII. *Columba viridis martinicana* et *ruffa cayanensis* s. *montana* LINN. T. XIII. *Turtur iamaicensis*, s. *Columba cyanocephalos* LINN. et *Palumbus moluccensis* T. XIV. *Palumbus coeruleus madagascariensis* et *viridis madagascariensis*. T. XV. *Palumbus amboinensis* s. *Columba indica* L. et *Turtur viridis amboinensis*. Ordinis secundi aues rostro conico incuruo a prioribus differunt. Habent vero ex his aliae caput paleis praeditum, quae domesticae sunt, vt *Gallopauo*, *Gallus* et *Meleagris* vel paleis carent, vt *Lagopus*, *Perdix* et *Phasianus*, quae genera sylvestres aues comprehendunt. Ad Phasianum Noster genus *Pauonis* et *Crax* LINN. refert. Ex his pingitur: Tab. XVI. *Gallopauo* s. *Meleagris Gallopauo* LINN. XVII. *Gallus crispus* LINN. et *iaponicus* XVIII. *Meleagris* s. *Phasianus meleagris* LINN. XIX. *Bonasa pyrenaeica* mas et foemina XX. *Bonasa canadensis*. XXI. *Bonasa canadensis maior* et *Perdix montana* XXII. *Bonasa scotica* et *Coturnix ludouiciana*. XXIII. *Perdix graeca* et *Francolinus* s. *Tetrao orientalis* L. XXIV. *Perdix senegalensis* et *Coturnix madagascariensis* XXV.

Cotur-

Coturnix philippensis, *mexicana cristata* et *Phasianus varius* XXVI. *Phasianus cristatus indicus*, et *guianensis* XXVII. *Pauo cristatus* L. XXVIII. *Perdix sinensis* et *Pauo tibetanus*. XXIX. *Crax guianensis* f. *nigra* L. Ad tertium ordinem pertinent eae aues, quae p.307. a prioribus rostro breui adunco tantum distinguuntur. Rapaces autem sunt omnes et carniuorae, variaeque earum species difficile a se inuicem separantur, cum tantopere vel aetatis vel sexus ratione colores mutant, vt non solum vna eademque species, sed et vnum idemque indiuiduum variis temporibus obseruatum, ad plures species pertinere appareat. In aliis vero basis rostri cute nuda tegitur, vt in *Accipitre*, *Aquila* et *Vulture*: in aliis vero ea plumis antrorsum incumben- tibus cooperta est, vt in *Asione* et *Strigis* genere. A LINNAEO *Aquila* et *Accipiter* Nostri ad *Falconem*, *Asio* ad genus *Strix* dictum refertur. Sequentes icones in tabulis aeneis huic ordini adnexis continentur. Tab. XXX. *Accipiter minor* et *Gyrfalco* f. *Falco gyrfalco* L. XXXI. *Gyrfalco islandicus*. XXXII. *Aesalon carolinensis* f. *Falco sparnerius* L. et *Aesalon dominicensis*. XXXIII. *Miluus regalis* f. *Falco miluus* L. XXXIV. *Aquila marina* siue *Haliaeetus* aut *Falco haliaeetus* L. XXXV. *Aquila ponticeriana* XXXVI. *Rex vulturum* f. *Vultur papa* L. XXXVII. *Scops* f. *Strix scops* L. et *Strix canadensis*.

Secundum totum quinque ordines efficiunt. T. II. Quarti ordinis aues conicum rostrum elongatum habent. Ex his *Coracia*, f. *Vpupa* LINN. *Coruus*, *Pica* *Garrulus* et *Nucifraga*, quae genera omnia ad *Coruos* retulit LINNAEUS, plumas habent, quae basi rostri incumbunt antrorsum, naresque tegunt. In aliis vero plumae baseos rostri retrorsum versae nares detectas relinquunt. Ad has

pertinent *Galgulus*, quod genus varias species, a LINN. ad Coraciae, Corui et Fringillae genera relatas, continet, *Icterus*, quod genus etiam ad Coraciam a LINN. translatum est et *Manucodiata* f. *Paradisaea* L. Ex speciebus, quas hicce ordo comprehendit, delineantur: Tab. I. *Coracia*, f. *Vpupa pyrrhocorax* L. et *Pyrrhocorax* II. *Monedula philippensis* et capit. b. sp. III. *Pica candida* et *senegalensis* IV. *Garrulus cayanensis* et *canadensis fuscus* V. *Nucifraga* f. *Coruus caryocotactes* L. et *Galgulus* f. *Coracias garrulus* L. VI. *Galgulus mindanoensis* f. *Coruus Benghalensis* L. et *garrulus sinensis* VII. *Galgulus angolensis* et *indicus* VIII. *Icterus* et *Cassicus ruber*. IX. *Cassicus luteus* et *Xanthornus cayanensis* X. *Icterus niger*, *minor viridis* et *minor spurius*. XI. *Icterus guaianensis* et *Xanthornus mexicanus* XII. *Icterus minor* et *Xanthornus iamaicensis*, *dominicensis* et *icterocephalus cayanensis* XIII. *Manucodiata* f. *Paradisaea apodo* L. et *Manucodiata minor* f. *Paradisaea regalis*

p. 139. L. Quinti ordinis aues rostrum rectum et mandibulam superiorem apice vtrinque emarginatam habent. Ex his rostro conuexo sunt *Lanius*, *Turdus*, *Cotinga*, quod nouum genus est, vnica specie a LINNAEO ad *Lanios* relata excepta: rostro horizontaliter basi compresso et fere triangulari *Muscicapa*, nouum quoque genus praeter paucas species sub variis aliis generibus descriptas. Delineantur ex his sequentes: Tab. XIV. *Lanius cayanensis cinereus* et *cayanensis naeuius*. XV. *Lanius cap. b. spei*, *ludovicianus* et *madagascariensis minor viridis* XVI. *Lanius madagascariensis minor mas* et *foemina*, *madagascariensis coeruleus* et *cayanensis luteus* XVII. *Lanius senegalensis cinereus* et *ruber* XVIII. *Lanius lucionensis*, *manillensis*, *canadensis* et *madagascariensis rufus*. XIX. *Collurio madagascariensis* et *Lanius madagascariensis maior viridis*. XX. *Turdus iliacus* f. *musicus* LINN. et *Merula cristata cap. b. spei*. XXI. *Merula montana*

montana et sinensis cristata minor XXII. *Turdus arundinaceus* LINN. *Merula senegalensis* et *oliuacea* cap. b. spei XXIII. *Turdus sinensis* et *Merula* cap. b. spei XXIV. *Merula canadensis*, *madagascariensis aurea*, et *borbonica*. XXV. *Merula alia madagascariensis*, *cinerea madagascariensis* et *cinerea indica*. XXVI. *Merula philippensis* et *caeva philippensis* XXVII. *Merula dominicensis*, *oliuacea dominicensis* et *fusca* cap. b. spei. XXVIII. *Merula solitaria philippensis* et *Mainatus* f. *Gracula religiosa* L. XXIX. *Merula palmarum*, *palmarum atricapilla* et *Lanius cayanensis striatus* XXX. *Merula torquata* cap. b. spei et *viridis angolensis* XXXI. *Merula viridis longicauda senegalensis*, *oliuacea indica* et *alia indica* XXXII. *Merula viridis moluccensis* et *viridis atricapilla moluccensis* XXXIII. *Oriolus cochinchinensis* et *merula solitaria manillensis* XXXIV. *Cotinga purpurea*, *cinereo purpurea* et *Muscicapa*. XXXVI. *Muscicapa senegalensis torquata*, *martinicana cristata*, *capitis b. spei*, *torquata cap. b. spei* et *Tyrannus brasiliensis* XXXVII. *Muscicapa maior cinerea madagascariensis*, *senegalensis pectore rufo* et *pectore nigro*, et *madagascariensis maior nigra cristata*. XXXVIII. *Muscicapa martinicana fusca*, *Tyrannus dominicensis*, *Muscicapa nigra cayanensis* et *alia cayanensis* XXXIX. *Muscicapa borbonica*, *cristata senegalensis*, *cinerea canadensis*, *cristata borbonica* et *Tyrannus cauda bifurca*. XL. *Muscicapa madagascariensis longicauda*, *madagascariensis albicilla longicauda* et *madagascariensis varia longicauda*. XLI. *Muscicapa cristata* et *cristata alba utraque ex Cap. b. spei* *Corvus paradisi* LINN. Sexti ordinis aues rostrum rectum mandibulamque integram vtramque habent. *Buphagi* genus rostrum subquadrangulare, paululum superne conuexum inferne angulosum, *Sturnus* conuexum, apice obtusum, apicis latitudine crassitiem superante habet. Delineatur Tab. XLI. *Sturnus cap. b. spei* f.

p. 453. *Sturnus contra* L. XLII. *Sturnus ludouicianus* et *Buphagus*. Characterem septimi ordinis exprimit rostrum gracile parum arcuatum. reliquae partes partibus avium priorum ordinum similes sunt. Ad hoc genus numeratur *Vupa*, quae in capite corollam longitudinalem, plumosam, in duplici serie parallela diuisam et plicatilem gerit, et *Promerops*, genus scilicet simplici capite donatum. Tab. XLIII. *Vpupae* f. *Vpupae* epops L. et *Promeropis* figuras **p. 469.** exhibet. Octavi ordinis aves a prioribus distinguuntur rostro minimo basi horizontaliter compresso, apice adunco; et oris rictu capite ampliore. *Caprimulgi* genus ex generibus huius ordinis simplicem caudam, *Hirundines* duplicem habent. Delineantur ex huius ordinis speciebus sequentes: Tab. XLIV. *Caprimulgus europaeus* LINNAEI. XLV. *Hirundo senegalensis*, *martiniana*, *americana* et *riparia senegalensis*. XLVI. *Hirundo cayanensis*, *riparia cochinsinensis* f. *esculenta* L. et *apocochinsinensis*.

T. III. In tertii Voluminis initio Cl. Auctor ad nonum **p. i.** progreditur ordinem. Continentur in eo aves digitis quatuor membranis destitutis tribus scilicet anticis, vno postico, omnibus circiter ad exortum vsque discretis, cruribus ad calcaneum vsque plumosis et rostro conico attenuato. Sectio prima earum est, quae mandibulam vtramque rectam habent. *Tangara* scilicet, *Carduelis*, *Passer*, *Coccothraustes*, *Emberiza*, quae genera LINNAEUS omnia ad *Loxiae*, *Emberizae* et *Fringillae* genus vario modo refert. Secundae sectionis aves superiorem mandibulam aduncam habent. *Colius* nimirum et *Pyrrhula*, quam ad *Loxiam* retulit LINNAEUS. Mandibulam vero vtramque aduncam apicibus se decussantibus *Loxia BRISSONII* habet. Pinguntur ex his Tab. I. *Tangara*, *Episcopus auis*, *Tangara cayanensis coerulea*

lea et brasiliensis coerulea. II. *Tangara cayanensis nigra*, *brasiliensis nigro lutea*, *cayanensis nigro lutea*, *dominicensis* et *cardinalis canadensis*. III. *Cardinalis* et *cardinalis purpureus* mas et foemina f. *Fringilla gyrola* L. IV. *Tangara Peruviana viridis*, *viridis indica punctata*, *cayanensis viridis* et *Carduelis candida et nigra*. V. *Passer sylvestris*, *passerculus cap. b. spei* f. *Emberiza alario* LINN. *alius passer capitis b. spei*, et *erythrorhynchos capit. b. spei*. VI. *Passer erythrorhynchos senegalensis*, *cardinalis madagascariensis*, *cardinalis cap. b. spei* f. *Emberiza Orix* L. et *cardinalis dominicanus* f. *Loxia dominicana* L. VII. *Passer niger*, *Fringilla sinensis*, *Maia ex insula cuba* et *chloris iauensis*. VIII. *Vidua* f. *Emberiza paradisaea* L. *Vidua minor*, et *Chloris ludouiciana* vulgo *papa dicta* f. *Emberiza ciris* L. IX. *Vidua riparia africana*, *maia sinensis*, *Granatinus* f. *Fringilla brasiliiana* L. X. *Bengalus* f. *Fringilla angolensis* L. *Senegalus ruber*, *Bengalus fuscus*, *Bengalus punctulatus* f. *Fringilla Amandaeca* L. *Senegalus striatus* f. *Loxia astrild.* L. XI. *Coccothraustes capitis b. spei*, *lutea capitis bonae spei*, *cayanensis*, *sinensis cinerea* f. *Loxia oryzouora* L. XII. *Coccothraustes philippensis*, *ludouiciana*, et *canadensis* f. *Loxia enucleator* L. XIII. *Coccothraustes iauensis*, *naeuia* f. *Loxia punctulata* L. *moluccensis*, *barbarica* et *emberiza dominicensis*. XIV. *Emberiza canadensis coerulea*, *Hortulanus ludouicianus* et *Hortulanus cap. b. spei*. XV. *Fringilla niualis*, *senegalensis* et *Hortulanus carolinensis* f. *Fringilla oryzuora* L. XVI. *Fringilla cap. b. spei*, *Colius cap. b. spei*, et *Colius senegalensis cristatus*. XVII. *Pyrrhula africana nigra minor*, *brasiliensis coerulea* et *Loxia curuirostra* LINNAEI XVIII. *Nidus Coccothraustis philippensis*. Ordo decimus continet aves rostro subulato instru P.333. Etas, quoad reliqua haftenus recensitis similes. Ex his nares detectas habent *Alauda* et *Ficedula* f. *Motacilla*

facilla L. In *Paro* contra nares plumis baseos rostri operiuntur. Sequentes vero figurae exhibentur. Tab. XIX. *Alauda candida*, *senegalensis cristata* et *Alauda cap. b. spei*. XX. *Alauda arborea* L. maior f. *calandra* L. *Rubetra senegalensis* XXI. *Curruca cinerea* siue *cineraria* f. *Motacilla sylvia* L. *Vitiflora grisea* f. Variet. α . *motacillae oenanthe* L. *Vitiflora cinerea* et *rufescens* XXII. *Luscinia madagascariensis*, *Curruca naevia cap. b. spei*, *Rubetra philippensis* et *Ficedula martinicana*. XXIII. *Rubetra*, *Rubetra philippensis* et *Motacilla flava*. XXIV. *Rubetra maior* seu *rubicola* f. *Motacilla rubetra* L. *Rubetra lucionensium* mas et foemina et *madagascariensis* et *Ficedula madagascariensis maior* XXV. *Motacilla cinerea*, *iauensis*, *capitis b. spei* et *Vitiflora rufescens* XXVI. *Ficedula Canadensis maior*, *dominicana minor*, *canadensis*, *ludouiciana* et alia *dominicana*. XXVII. *Ficedula canadensis cinerea*, *canadensis cinerea minor*, *canadensis fusca*, *canadensis icterocephalos*, *dominicana cinerea* et *dominicana varia* XXVIII. *Sylvia canadensis coerulea*, *Ficedula madagascariensis minor*, *borbonica*, *Sylvia viridis* et *Ficedula dominicana fusca*. XXIX. *Parus canadensis atricapillus*, *polonicus* siue
 p.587. *pendulinus* LINN. Ordinis undecimi, qui unicum *Sittae* genus comprehendit, character in rostro cuneiformi consistit. Sistit Tab. XXIX. adhuc *Sittam europaeam* L. et *canadensem*. Ordinis duodecimi aves rostrum habent filiforme, quod vel arcuatum est in *Certhia* et *Polytmo*, quem LINNAEUS ad *Trochili* genus refert, vel rectum in *Mellisuga* f. *Trochilo* L. Exhibetur vero Tab. XXX. *Certhia muralis* f. *familiaris* L. *philippensis* et *grisea* XXXI. *Certhia capitis bonae spei*, *philippensis purpurea* mas et foemina *cayanensis* f. *coerulea* LINN. et *brasiliensis coerulea*. XXXII. *Certhia torquata capitis b. spei*, *madagascariensis violacea*, *violacea brasiliensis* et *philippensis minor*. XXXIII.

XXXIII. *Certhia madagascariensis oliuacea, cayanensis viridis, brasiliensis nigricans, madagascariensis viridis* mas et foemina et *longicauda minor capitis b. spei*.
 XXXIV. *Certhia longicauda senegalensis, longicauda capitis b. spei, senegalensis violacea, philippensis oliuacea, et martinicana seu sacchariuora* f. *Certhia flauo-ola* LINN. XXXV. *Polytmus iamaicensis* f. *Trochilus mango* LINN. *Polytmus mexicanus* f. *Trochilus holosericeus* L. *Polytmus cayanensis violaceus et cayanensis longicauda*. XXXVI. *Mellisuga* f. *Trochilus minimus* L. *Mellisuga gutture naeuio cayanensis, alia cayanensis* f. *Trochilus niger* L. *Mellisuga ventre griseo cayanensis, Mellisuga gutture rubro carolinensis* mas et foemina f. *Trochilus colubris et tormineo* L. *Mellisuga ventre albo cayanensis, dominicensis* f. *Trochilus Surinamensis* L. et *Mellisuga cayanensis cauda bifurca*. XXXVII. *Mellisuga gutture topazino brasilicana, cristata* f. *Trochilus cristatus* L. *Mellisuga maior cayanensis, Mellisuga gutture rubro brasiliana, alia brasiliana cauda bifurca, et violacea cauda bifurca iamaicensis*.

Eorum autem ordinum, qui quartum huius operis tomum constituunt, primus est decimus tertius. Aues, quas CL. BRISSON huic ordini adnumerat, habent omnes digitos quatuor membranis destitutos, duos scilicet anticos, totidemque posticos, cruraque ad calcaneum vsque plumosa. Ex illis vero sub prima sectione enumerantur eae, quae rostro recto instructae sunt, linguamque longissimam et lumbriciformem habent, vt *Torquilla* f. *Ignius* et *Picus*. Quae vero lingua rostrum longitudine non superante rostroque longissimo quadrangulaculo instructae sunt vt *Galbula* f. *Alcedo* L. ad secundam sectionem pertinent. Tertiae Sectionis aues rostrum modice deorsum inflexum, superne conuexum, lateraliter compressum habent, *Bucco* nimirum et *Cuculus*.
 Quar-

T. IV.
 p. I.

Quartae sectionis aues rostrum breue et aduncum gerunt, cuius latitudo vel crassitiem superat vt in genere *Trogonis*, vel crassities latitudinem, vt in *Crotophago* et *Psittaco*. Quae vero huius ordinis aues rostro longo, crassitie caput aequante ferrae instar denticulato: vtriusque mandibulae apice deorsum incuruo: linguaque pennae aemula donatae sunt, eae ad *Tucanae* genus quod *Ramphostos* L. est, pertinent, quod quintam sectionem constituit. Plures huius ordinis species in tabulis adnexis delineantur, nimirum Tab. I. *Torquilla* s. *Ignius torquilla* L. et *Picus niger canadensis cristatus*. II. *Picus varius* s. *medius* L. et *Picus varius canadensis*. III. *Picus virginianus* s. *erythrocephalos* L. et *Picus dominicanus striatus minor* IV. *Picus dominicensis striatus*, et *alius dominicensis minor* V. *Galbula iacamar* et *galbula iacamar longicauda* s. *Alcedo dea* L. VI. *Picus capitis bonae spei* et *Bucco*. VII. *Bucco cayanensis*, *philippensis*, *maynanensis* et *Bucco cayanensis naeuius*. VIII. *Cuculus senegalensis*, et *cayanensis*. IX. *Cuculus cayanensis naeuius* et *Cuculus naeuius indicus*. XI. *Cuculus cristatus coromandelensis* et *Cuculus naeuius malabaricus*. XII. *Cuculus naeuius mindanensis* et *cristatus madagascariensis* XIII. *Cuculus coeruleus madagascariensis* et *alius madagascariensis*. XIV. *Cuculus siamensis cristatus* et *coeruleus sinensis*. XV. *Cuculus maior madagascariensis mas* et *foemina*. XVI. *Trogon cayanensis cinereus* et *Cuculus cayanensis minor* XVII. *Trogon cayanensis viridis* et *Cuculus rostro longo iamaicensis*. XVIII. *Crotophagus* s. *Crotophaga ani* L. et *Crotophagus maior* XIX. *Ara brasiliensium* et *Psittaca cyanocephala*. XX. *Ara brasiliensis cyaneocrocea* s. *Psittacus ararauna* L. XXI. *Cacatua* XXII. *Psittacus lucionensis* et *Cacatua minor*. XXIII. *Lorius philippensis* s. *Psittacus lory* L. et *Lorius moluccensis* s. *Psittacus garrulus* L. XXIV. *Lorius orientalis indiae* s. *Psit-*

f. *Psittacus domicella* L. et *Psittacula senegalensis* XXV. *Psittacus amazonicus gutture coeruleo* et *Psittaca indica coccinea* XXVI. *Psittacus amazonicus brasiliensis* et *Psittacus amazonicus varius* f. *Psittacus aesturius* L. XXVII. *Psittaca borbonica torquata* et *Psittaca cayanensis* XXVIII. *Psittaca guianensis* et *Psittaca amboinensis coccinea*. XXIX. *Psittaca ginginiana* et alia *ginginiana erythrocephalos*. XXX. *Psittacula philippensis*, *Psittacula madagascariensis* et *Psittacula gutture luteo*. XXXI. *Tucana cayanensis gutture luteo* et *Tucana cayanensis gutture albo*. XXXII. *Tucana brasiliensis gutture luteo* f. *Ramphastos piperiurus* L. et *Tucana cayanensis torquata* f. *Ramphastos tucanus* L. XXXIII. *Tucana brasiliensis viridis* et *cayanensis viridis*. Qui hunc ordinem excipit deci- P.435.
mus quartus aves continet, quae digitis quatuor membranis destitutis, tres scilicet anticis vnoque postico; medio trium anteriorum cum extimo digito trium articulorum spatio, cum intimo primi tantum articuli intervallo arcte cohaerente: et cruribus ad calcaneum vsque plumosis praeditae sunt. Huius ordinis aves aliae rostro donantur leui, et versus apicem lateraliter compresso *Rupicola* nimirum et *Manacus*, quod genus a LINNAEO ad *Parum* refertur: vel rostro conico, ferrae instar denticulato. utriusque mandibulae apice deorsum incuruo, ut *Momotus*: vel rostro recto longiusculo ut *Ispida*? ad Alcedinem a LINNAEO relata et *Todus*, quod genus etiam species quasdam Alcedinis L. continet: vel rostro arcuato et acuto, ut *Apiaſter* f. *Merops* LINNAEI: vel denique rostro crasso et falciformi, ut *Hydrocorax* f. *Buceros* L. Horum vero generum sequentes species depictae sunt. Tab. XXXIV. *Rupicola*, *Manacus ruber* f. *Parus aureola* XXXV. *Manacus niger cristatus*, *Manacus albo-capillus* f. *Parus pipra* L. et *Momotus* XXXVI. *Manacus gutture albo*, *Manacus fronte alba* et *Ispida capitis b. spei* XXXVII. *Ispida indica*,

indica, torquata indica et cristata philippensis. XXXVIII. *Ispida madagascariensis et coerulea madagascariensis.* XXXIX. *Ispida senegalensis et alba et nigra* f. *Alcedo rudis* L. XL. *Ispida senegalensis maior et ternatana* XLI. *Ispida cristata mexicana et Todus* f. *Alcedo todus* L. XLII. *Apiaster madagascariensis et madagascariensis torquatus.* *Merox viridis* L. XLIII. *Apiaster maior philippensis et minor philippensis.* XLIV. *Apiaster angolensis, Apiaster insulae franciae et apiaster erythrocephalus indicus* XLV. *Hydrocorax* XLVI. *Hydrocorax senegalensis rostro nigro et senegalensis rostro rubro.*

- T.V. Ordinis decimi quinti, qui Voluminis quinti initium facit, aues digitos habent membranis destitutos, crura in parte inferiore plumis denudata sunt: alaeque pro mole corporis exiguae et volatui inutiles, nam ob hanc alarum breuitatem, moli corporis comparatam, nunquam volant. Aliae earum duos tantum habent digitos anticos, posticos nullos vt *Struthio*, aliae anticos tres, posticos nullos, vt *Rhea* f. *Struthio-americanus* L. et *Casuarus* f. *Struthio-casuarus* L. aliae anticos tres, posticum vnum vt *Raphus* siue *Struthio cucullatus* L. In tabulis
- P. 17. aeneis delineantur Tab.I. *Struthio* et *Casuarus*. Ordinis decimi sexti aues habent digitos tres anticos, membrana destitutos, posticum nullum, crura in parte inferiore planis denudata, alasque sat magnas et volatui idoneas. Diuiduntur vero eius ordinis aues in tres sectiones, in prima continentur illae, quae rostrum habent conico incuruum: in secunda, quae rostro donantur recto et longissimo, in apice crassiori, vt *Himantopus*, *Charadrius* et *Ostralega*: f. *Haemontopus* L. in tertia, quae rostrum rectum et breue in apice crassius habent, vt *Pluvialis*. f. *Charadrius* L. Delineantur in tabulis; Tab.II. *Otis minor*,

minor, *Anas campestris* vulgo dicta, f. *Otis tetrax* L. mas et foemina III. *Himantopus* f. *Charadrius himantopus* L. *Ostralega Pica marina* vulgo dicta, f. *Himantopus ostralegus* L. IV. *Pluvialis aurea* f. *Charadrius pluvialis* L. *Pluvialis minor* sive *Morinellus* f. *Charadrius morinellus* L. V. *Pluvialis torquata* an *Charadrius Alexandrius*? an *Aegyptius* L.? *Pluvialis torquata minor* f. *Charadrius hiaticula* L. VI. *Pluvialis dominicensis aurea et dominicensis torquata*. VII. *Pluvialis maior oedicnemus* vulgo dicta f. *Charadrius oedicnemus* L. et *Pluvialis senegalensis armata*. Or. p. 91.
ordinis decimi septimi aues cum auibus ordinis praecedentis conueniunt in omnibus, solis digitis exceptis, quorum tres anticos vnumque posticum habent. Ex iis rostro recto et apice crassiori sunt *Vanellus* f. *Tringae* L. species et *Iacana* f. *Fulicae* L. species, rostro subrecto sursum modice tendente et horizontaliter paullulum compresso *Arenaria* f. *Tringa* LINN. rostro superne conuexo et apice lateraliter compresso, *Glareola*: rostro recte et lateraliter compresso, *Rallus*: rostro gracili *Tringa*, *Limosa* *Scolopacis* L. species continens et *Scolopax*: rostro deorsum arcuato *Numenius*, etiam ad *Scolopacem* a LINNAEO relatus: rostro recto horizontaliter plano ipsius apice ampliato, subrotundo, spathae-formi *Platea* f. *Platalea* LINN. rostro crasso et longo *Ciconia* *Ardeae* L. species, *Ardea* et *Scolopax*: rostro crasso et breui, ipsiusque mandibula superiore cochleari formi, apice vnguiculato *Cochlearius*: rostro breui, recto apice conico *Balearica*, quae in capite ornatur corolla plumis, graminis radicum aemulis, conflata et *Ardeae* L. species est; rostro conico incuruo *Cariama* et *Anhima*: rostro conico lateraliter compresso *Porphyrio* *Fulicae* L. Species. Ex his pingitur Tab. VIII. *Vanellus* f. *Tringa vanellus* L. et *Vanellus armatus Ludouicianus*. IX. *Vanell-*

Vanellus griseus f. *Tringa squatarola* L. et *Vanellus varius* X. *Vanellus helueticus* et *senegalensis armatus* XI. *Iacana armata fusca* et *arenaria cinerea* XII. *Glareola* et *Rallus aquaticus* LINN. XIII. *Rallus aquaticus minor* f. *Maruetta*, et *Rallus genistarum ortygometra* f. *Rallus crex* L. XIV. *Rallus Philippensis* et *philippensis striatus* XV. *Rallus philippensis torquatus* et *philippensis fuscus* XVI. *Tringa* f. *Tringa ochiopus* L. et *Guinetta* f. *Tringa hypoleucos* L. XVII. *Totanus* f. *Scolopax totanus* L. et *Totanus cinereus* f. *Tringa littorea* L. XVIII. *Totanus striatus* et *naevius* XIX. *Cinclus* et *cincius torquatus* XX. *Calidris* et *Calidris grisea minor* XXI. *Calidris naevia* et *grisea* XXII. *Pugnax* f. *Tringa pugnax* L. *anas* et *foemina* XXIII. *Limosa grisea* et *fusca*. XXIV. *Cinclus dominicensis* et *Limosa grisea maior* XXV. *Limosa rufa* f. *Scolopax Lapponica* L. *Cinclus dominicensis minor* XXVI. *Gallinago* f. *Scolopax gallinago* L. et *Gallinago minor* XXVII. *Numenius minor* f. *Scolopax phaeopus* L. et *Numenius viridis* XXVIII. *Numenius madagascariensis* XXIX. *Numenius brasiliensis coccineus* f. *Scolopax rubra* L. *diuersae aetatis* XXX. *Platea rosea* f. *Platalea aiaia* L. XXXI. *Ciconia fusca* f. *Ardea ciconia nigra* L. XXXII. *Ciconia alba* f. *Ardea ciconia* XXXIII. *Grus* f. *Ardea grus* LINNAEI XXXIV. *Ardea cinerea* L. XXXV. *Ardea cristata* XXXVI. *Ardea grisea* et *cristata purpurascens* XXXVII. *Botaurus* f. *Ardea stellaris* L. et *Cancrophagus philippensis* XXXVIII. *Cancrophagus viridis* f. *Ardea virescens* L. et *Cancrophagus viridis naevius* XXXIX. *Nycticorax* f. *Ardea nycticorax* L. XL. *Ardeola* et *Ardeola naevia* XLI. *Balearica* f. *Ardea pauonina* L. XLII. *Porphyrio* f. *Fulica porphyrio* L. et *Porphyrio minor*.

Progredimur ad sexti siue vltimi voluminis con- T. VI.
tenta, in quo Cl. BRISSON *Palmipedum* ordines p. 1.
recenset. Initium vero huius decimus octauus or-
do facit, cuius aues digitis quatuor, tribus anticis,
vnoque postico, per totam longitudinem membra-
nis auctis fissis praeditae sunt. Habent vero ea-
rum aliae digitos membranis simplicibus obsitos vt
Gallinula, quae a LINNAEO ad fulicas refertur:
aliae membranis emarginatis, vt *Phalaropus* f. Trin-
gae species, et *Fulica*. Tab. I. delineatur *Gallinula*
mas et foemina f. *Fulica choropus* L. II. *Fulica* ni-
gricans L. et maior f. *diabolus marinus* f. aterrima
Ordinis decimi noni aues digitis quatuor, tribus an-
terioribus membranis inter se semifissis connexis
postico soluto, cruribus ad podicem positis, et extra
abdomen conditis praeditae sunt, et ad vnicum *Co-*
lymbi genus pertinent. Depingitur Tab III. *Co-*
lymbus et *Colymbus cristatus minor* IV. *Colymbus cri-*
status V. *Colymbus cornutus* f. cristatus L. et *Colym-*
bus cornutus et *fluuiatilis dominicensis*. Ordinis vicesi-
mi genera donantur digitis tribus anticis, membran-
is integris inter se connexis, postico nullo: cruribus p. 69.
ad podicem positis et intra abdomen conditis. Ex
his *Vria* rostrum rectum et acutum; rostrum vero
lateraliter planum, transuersim striatum *Fratercula*
et *Alca* habent, quae genera omnia sub vnico Al-
cae genere a LINNAEO describuntur. Sequen-
tes vero species figurae sistunt. Tab. VI. *Vria* f. Al-
ca lommia L. et *Fratercula* f. *Alca arctica* L. VII.
Alca maior f. impennis L. VIII. *Alca torda* L. et *Al-*
ca minor. Vicesimi primi ordinis aues digitis qua- p. 95.
tuor, tribus scilicet anticis, membran-
is inter se con-
nexis, postico soluto: cruribus ad podicem positis
et intra abdomen conditis, praeditae sunt. Aliae
ex iis rostrum rectum apicemque superioris maxillae
aduncum habent, vt *Spheniscus* f. *Diomedea* L. et
Tom. XI. Pars IV. Qq Catar-

- Catarractes* f. *Phaethon* L. aliae rostrum rectum et acutum vt *Mergus*. Tab. IX. sistitur *Spheniscus naevius* f. *Diomedea demersa* L. X. *Mergus maior* et minor XI. *Mergus gutture ruffo*, et maior *naevius*. Vni-
- p.125. cum *Albatri* genus vnicaque eius species a LINNAEO ad *Diomedea*s relata ordinem vicesimum secundum constituit. Habet ea digitos tres anticos membranis integris inter se connexos, posticum nullum, et crura circa corpus medium et extra abdomen posita, corpore breuiora. Aues autem, quas
- p.129. Cl. BRISSON ordine vicesimo tertio enumerat, digitis quatuor, tribus anterioribus, membranis inter se connexis, postico soluto, cruribus circa corpus medium et extra abdomen positis, corpore brevioribus et rostro edentulo instructae sunt. Aliae earum rostrum versus apicem aduncum habent, vt *Puffinus*, quod genus a LINNAEO sub *Procellariae* genere quoque comprehenditur, *Procellaria*, *Stercorarius*, qui *Lari* LINNAEI species est, et *Larus*: aliae rostrum rectum et lateraliter planum, vt *Sterna* et *Rygchopsalia* f. *Rynchops* LINNAEI. Pinguntur sequentes species huius ordinis. Tab. XII. *Puffinus cinereus* et *Procellaria cinerea* XIII. *Procellaria pelagia* L. et *Stercorarius striatus* XIV. *Larus cinereus*. XV. *Larus varius* f. *Skua* XVI. *Gauia cinerea* f. *Larus canus* L. et *Gauia cinerea maior*. XVII. *Gauia cinerea minor* et *cinerea naeuia* XVIII. *Gauia ridibunda* f. *Larus atricilla* L. et *Gauia fusca* f. *Sterna stolidus* XIX. *Sterna* f. *Sterna hirundo* L. et *Sterna minor* f. *nigra* L. XX. *Sterna nigra* et *naeuia* f. *Rallus lariformis* L. XXI. *Sterna fusca* et
- p.229. *Rygchopsalia* f. *Rynchops nigra* L. Ordo vicesimus quartus ea auium genera complectitur, quae digitis quatuor, tribus anterioribus membranis integris inter se connexis, postico soluto, cruribus circa corpus medium et extra abdomen positis, corpore breviori-

vioribus et rostro denticulato praedita esse deprehenduntur. Quae vero ad hunc ordinem referuntur aves, eae sunt rostro vel subcylindraco, mandibulae superioris apice adunco, vt *Merganser*, quod genus quasdam Mergi LINNAEI species comprehendit, vel rostro superne conuexo, inferne planiusculo, vt *Anser* et *Anas*. Continentur in tabulis aeneis ordinis huius species sequentes Tab. XXII. *Merganser*. XXIII. *Merganser cristatus* f. *Mergus merganser* L. XXIV. *Merganser cristatus minor* siue *Albellus* f. *Mergus albellus* L. mas et foemina XXV. *Merganser cinereus* XXVI. *Anser sylvestris canadensis* L. XXVII. *Anser Aegyptius*. XXVIII. *Cygnus ferus* f. *Anser cygnus* L. XXIX. et XXX. *Anser lanuginosus* siue *Eider* mas et foemina f. *Anas mollissima* L. XXXI. *Brenta* f. *Anas bernicla* L. XXXII. *Anas clypeata* f. *clypeata* L. et *platyrhynchos* L. et *Anas aestiva* f. *sponsa* L. XXXIII. *Anas strepera* L. et *Anas tadorna* L. XXXIV. *Anas longicauda* mas et foemina XXXV. *Penelope* f. *Anas fenna* L. et *Anas fistularis* f. *penelope* L. XXXVI. *Anas glaucium* L. mas et foemina XXXVII. *Glaucium minus* f. *Anas faligula* L. et *Anas clangula* L. XXXVIII. *Anas fistularis americana*, siue *Anas autumnalis* et *Anas nigra* L. XXXIX. *Anas querquedula* L. mas et foemina XL. *Querquedula minor* f. *Anas crecre* L. et *Querquedula ferroensis* XLI. *Querquedula ludouiciiana* f. *Anas albeola* L. et *Querquedula dominicensis*. Aves ordinis vi- P. 475. cesimi quinti digitis quatuor, omnibus membranis integris inter se connexis: cruribus circa corpus medium et extra abdomen positis, corpore breuioribus praeditae sunt. Ex his rostrum acutum habet *Anhinga* et *Lepturus* f. *Phaeton* L. rostrum vero apice aduncum *Sula* f. *Pelecanus* L. *Phalacrocorax*, qui etiam ad *Pelecanum* a LINNAEO refertur et *Onocrotalus*. Tab. XLII. pingitur *Lepturus* f. *Phaeton*
Qq 2 aethe-

aethereus L. et *Lepturus candidus* XLIII. *Sula fusca* et *Fregata* f. *Pelecanus aquilus* L. XLIV. *Bassana* f. *Pelecanus bassanus* L. XLV. *Phalacrocorax* f. *Pelecanus carbo* L. et XLVI. *Onocrotalus philippenfis*.
 p. 531. Aves ordinis vicesimi sexti digitis quatuor, tribus anterioribus membranis integris inter se connexis, postico soluto, cruribus circa corpus medium et extra abdomen positis, corpore longioribus, praeditae sunt. Ex his *Phoenicopterus* rostrum denticulatum habet, *Auocetta* f. *Recuruirostra* L. et *Corrira edentulum*. Delineatur Tab. XLVII. *Phoenicopterus ruber* L. et *Auocetta* f. *Recuruirostra auocetta* LINN.

In supplemento, sexto huius operis volumini adnexo, Cl. BRISSON tredecim nouas species, quae ad eum sub ipsa huius libri impressione accesserunt, aliasque varias ex EDWARDI opere describit. Multa quoque synonyma specierum, quae totum hoc opus continent, ex variis autoribus in primis ex decima editione systematis LINNAEI addit. Sex tabulae aeneae, quae ad hoc supplementum pertinent, sequentes aves exhibent. Tab. I. *Falco pedibus pennatis* II. *Corvus borealis albus* et *Xanthornus ietrocephalus americanus*. III. *Merula surinamensis*, *Merula atricapilla cap. b. spei* et *Muscicapa cayanensis rufa*. IV. *Tangara cayanensis varia chlorocephalos*, *Tangara cayanensis varia cyanocephalos*, *cayanensis nigra cristata*, et *Cardinalis americanus* V. *Coccothraustes americana coerulea*, et *Curruca grisea naeuia*. VI. *Galinago capitis bonae spei*.

Singulis Voluminibus et supplemento huic adiectus est index omnium nominum avium ex variis linguis in opere adductorum.

Operis huius, cuius tertiam classem iam adduximus,
 altera editio prodiit, quae latinum tantum tex-
 tum continet, Lugduni Batauorum octaua forma apud
 Theodorum Haak. Tomus eius primus anno 1762
 editus primam et secundum classem Briffoniani operis
 comprehendit, secundus et tertius 1763 prodierunt.
 Addidit tamen editor, quem Cl. ALAMAND esse ferunt,
 descriptiones nonnullorum animalium, quorum Cl.
 BRISSON non meminit. Sunt vero ea: *Guanaco* siue Ca- T.I.
melus pilis prolixis et crassis vestitus. Ihex imberbis. Rupi- p. 35.
capra Sibirica. Bos cornubus destitutus. Bos corni-
bus pendulis. Bos cauda equina. Mangarsahoc siue
equus auriculis longis et pendulis. Cuniculus insigni-
ter caudatus. Cuniculus cauda longissima. Sciurus
maximus volans siue Felis volans. Mus albus ceylo-
nicus. Musaraneus aquaticus. Ad Manati descri-
 ptionem addita est nouissima STELLERI huius ani-
 malis historia. Nec non ex eodem *Vrsus marinus*
 et *Leo marinus*. Secundus tomus Ornitho-
 logiae initium, decem scilicet priores auium or-
 dines, tertius Ornithologiae finem sistunt. Pari-
 ter in hac editione gallicus textus omissus, latinus
 vero ita concisus est, vt, quae ad aues ad genera
 sua, ordines speciesque referendas requiruntur,
 haud praetermissae sint. Reliqua descriptio, integra
 quidem sed breuius expressa comparet. In citatio-
 nibus autorum, iconum indicatione, et descriptio-
 nibus ex aliis scriptoribus repetitis varia quoque Cl.
 Editor mutauit, solasque Gallicas, Anglicas, Ger-
 manicas et Belgicas denominationes seruauit. Quae
 in sexaginta vltimis tabulis FRISCHII depictae fue-
 rant aues, etiam loco inseruit. Adiecit quoque se-
 quentes aues, quas Cl. BRISSON videre non li-
 cuit; *Crax vertice cono corneo onusto* quae species T.II.
Phasiani in insula Curassao habitat. Troyon Ceylo- p. 87.
nenfis.

T. III. *nenfis.* *Hydrocorax indicus.* *Pluvialis minima in-*
 p. 91. *dica.* Ex FRISCHIO vero sequentes anatum va-
 rietates Cl. editor subiunxit: *Anas domestica cirrata.*
Anas persica. *Anas fera nigra.* *Penelope capite*
fusco. *Querquedula pectore subrufo,* et *Querquedu-*
la macula in fronte nigra.

III.

Histoire abrégée des insectes, qui se trouvent
 aux environs de Paris, dans laquelle ces
 animaux sont rangés suivant un ordre me-
 thodique. a Paris chez Durand 1762. Tom.
 I. Alph. 3. Tab. aen. 10. Tom. II. Alph. 3.
 pl. 18. Tab. aen. 12.

i. e.

Epitome historiae insectorum, quae in agro Pa-
 risiensi reperiuntur, in qua haec animalia ad
 ordinem methodicum disposita sunt.

Longè plura profecto a Cl. huius libri Auctore,
 quem Cl. GEOFFROY iuniorem esse percepimus,
 hoc ipso opere praestita sunt, quam quae ti-
 tulo indicantur. Recensentur enim non solum no-
 mina insectorum, quae in agro Parisiensi a Cl. Au-
 tore eiusque amicis ad vnum alterumque milli-
 are ab urbe inuenta et collecta fuerunt, eaque ipsa,
 characteresque eorum, nec non locus quo nascuntur,
 et vita ample et eleganter describuntur; sed et me-
 thodica eorum dispositio traditur. Cum enim LIN-
 NAEI methodus non in omnibus Nostro arriserit,
 sedulo ille in insectorum characteres inquisiuit, et
 ex his multa noua genera constituit, eorum defini-
 tiones tradidit, eaque a se inuicem non vno sed
 pluribus signis distinguere annisus est. Accedit sa-
 tis

tis magna generum, specierum et varietatum novarum aut nondum penitus cognitarum copia, qua, ut additarum figurarum elegantia, operis huius praestantia quam maxime augetur. Non tamen in omnibus Noster a LINNAEO recessit, sed et ordinem et nomina eius saepissime servavit, suoque libro inseruit.

Praemissa est brevis aliqua praecipuorum scriptorum, qui de insectis egerunt, recensio. Hanc p. 1.

generalis aliqua in historiam insectorum introductio excipit, in qua de hisce animalculis Noster in univ-
ersum eleganter disputat, partium praecipuarum descriptionem dat, et generationem, metamor-
phosin seu evolutionem eorum, tandemque nutritio-
nem explicat. Ad ipsam vero systematicam divi-
sionem accedens, insecta in univ-
ersum in sex sectio-
nibus describit. Harum prima *Coleoptera*, secunda
Hemiptera, tertia *Tetraptera alis farinaceis*, quarta
Tetraptera alis nudis, quinta *Diptera*, sexta denique
Aptera comprehendit. *Coleopterorum* generalem di-
visionem et subdivisionem primo proponit, et ad-
iecta tabula ita explicat, ut hanc sectionem in tres
articulos diuidat. Horum characteristicas differen-
tias, non ex antennis, ut LINNAEUS, sed ex co-
leopterorum diuersitate adsumit, signa vero ordi-
num, in quos singulos articulos iterum abire iussit,
ex numero articulorum tarforum desumuntur. Pri-
mo itaque articulo describuntur ea, quae *coleo-
ptris integris duris* sunt, quorum ordinem ea effi-
ciunt, quae articulos tarforum quinque habent: ut
Platycerus, *Ptilinus*, *Scarabaeus*, *Copris*, *Attelabus*,
Dermestes, *Byrrhus*, *Anthrenus*, *Cistela*, *Peltis*,
Cucuius, *Elater*, *Buprestis*, *Bruchus*, *Lampyris*, *Ci-
cindela*, *Omalysus*, *Hydrophilus*, *Dyticus* et *Gyri-
nus*. Horum vero et sequentium generum distin-
ctiones ex antennis potissimum, tum ex omni reli-

p. 46.

p. 58.

p. 59.

quo corporis habitu desumuntur. Platycerorum alii antennis fractis, alii integris sunt. Scarabaei vel antennarum lamellas septem, vel tres tantum habent. Genus Buprestis diuiditur primo in species, quae thorace cordato, capite latiore elytris angustiore sunt, deinde in tales, quae thoracem capite et elytris angustiore habent, tandemque in illas, quae thorace capite latiore elytrorum latitudine instructae deprehenduntur. Secundus ordo eorum est, quae tarforum articulos quatuor ostendunt, scilicet *Melolontha*, *Prionus*, *Cerambyx*, *Leptura*, cuius species thoracem vel cylindraceum, vel globosum, vel inaequalem scabrum habent, *Stenocorus*, cuius species vel aculeato vel inermi thorace gaudent, *Luperus*, *Cryptiocephalus*, *Crioceris*, *Altica*, *Galeruca*, *Chrysomela*, *Mylabris*, *Rhinomacer*, *Curculio*, cuius generis prima familia femoribus inermibus, altera denticulatis instruitur, *Bostrichus*, *Clerus*, *Anthribus*, *Scolytus*, *Cassida*, et *Anaspis*. Tertio ordine ea, quibus tarforum articuli tres sunt, *Coccinella*, et *Tritoma*, quarto vero ea recensentur, quae tarforum primi et secundi pedum paris articulos quinque, pedum posteriorum articulos quatuor habent. Huc pertinent *Dinoderis*, *Pyrochroa*, *Cantharis*, cuius generis aliae species tarforum articulos nudos, aliae spongiosos gerunt. Porro *Tenebrio*, quorum antennae vel articulis globosis instruuntur et extrorsum crassiores sunt, vel longis, et ubique aequales apparent, *Mordella*, *Notoxus*, *Cerocoma*. Articulo secundo ea, quae coleoptris dimidiatis duris sunt, enarrantur. In eorum primo ordine ea sunt, quae tarforum articulis quinque instruuntur, quae omnia ad vnicum *Staphylini* genus pertinent. Secundus de *Necydali* agit, quae quatuor tarforum articulos habet, tertius vero de *Forficula* quae tarforum articulis tribus est. Quarti ordinis insecta, primi et secun-

secundi pedum paris articulis quinque, pedum posteriorum articulis quatuor gaudent, ergo *Meloës* genus sub eo comprehenditur. Articulo tertio, quae coleoptris mollibus membranaceis sunt, describuntur. Ex his *Blatta*, tarforum primi et secundi pedum paris articulos quinque, pedum vero posteriorum articulos quatuor, *Thrips*, tarforum articulos duos, *Gryllus* et *Acridium* tres, *Locusta* quatuor, *Mantes* vero quinque habent. Vt itaque longe plura coleopterorum genera Noster faciat, quam quae ante eum a LINNAEO constituta fuerunt, speciesque tot fere enumeret, in Parisiensi agro obuias, quot a LINNAEO ex toto orbe terrarum collecta fuerunt. Negandum tamen non est, multas quoque varietates et in hac et in sequentibus sectionibus enarratas et descriptas esse. p.379.

Secunda sectio de insectis hemipteris agit. Hanc decem sequentia genera constituunt. *Cicada*, a quo genere *Tetigoniam* (la *Procigale*) vt nouum genus distinguit. *Cimex*, quod genus duas iterum familias obtinet, cum aliae species antennarum articulos quatuor, aliae quinque habeant. *Naucoris*, *Notonecta*, *Corixa*, *Hepa*, *Psylla*, *Aphis*, *Chermes* et *Coccus*. p.401.

Posterioris voluminis initium tertia sectio facit, T. II. quae tetraptera alis farinaceis siue *Lepidaptera* LINNAEI continet. Ad illa primo *Papilio* refert, quorum alii *tetrapi* alii *hexapi* sunt, quos iterum vario diuidit modo. Secundum genus *sphinx*, tertium *Pterophorus* dicitur. Quartum *Phalaenae* constituunt, quarum aliae antennis pectini cornibus, aliae filiformibus instruuntur. Quintum *Tinearum* est. p. 1.

Quarta sectio de insectis tetrapteris alis nudis agit, quo nomine *neuroptera* et *hymenoptera* LINNAEI comprehendit. Ea vero ita diuidit, vt alia ex iis

p.233. *tarforum articulos tres habeant, vt Libellula et Perla,*

p.234. *alia quatuor vt Raphidia, alia quinque vt Ephemera, Phryganea, Hemerobius, Formicaleo, Panorpa, Crabro, Vrocerus, Tenthredo Cynips, Diplolepis, Eulophus, Ichneumon, Vespa, Apis et Formica. Tenthredinis tres familias facit, quarum antennae vel nouem, vel vndecim, vel octodecim nodis componuntur. Cynipum antennae vel vndecim, vel septem, vel tredecim articulis constant. Apum prima familia, quae corpora villosa habet, apes proprie sic dictas comprehendit. Altera corpore hirsutissimo est, et Apis bombylius vocatur.*

p.430. Quinta sectione *diptera* describuntur, tredecim generibus comprehensa. Sunt ea *Oestrus, Tabanus, Afilus, Stratiomys, Musca, Stomoxys, Volucella, Nemotelus, Scatopse, Hippobosca, Tipula, Bibio, Culex.* Genus *Stratiomys* dictum duas iterum familias habet, quarum prima thoracis aculeos duos, altera sex obtinet. Muscae in quinque familias abeunt. Earum prima alas variegatas, secunda os laruatum habet, tertia variegatas, quarta auratas, quinta vulgares sistit. Tipularum aliae alis patentibus, aliae alis incumbentibus sunt.

p.581. Sexta sectione quindecim tandem apterorum genera describuntur. *Pediculus* scilicet, *Podura*, cuius aliae species globulosae, aliae longae sunt, *Forbicina, Pulex, Chelifer, Acarus, Phalangium, Aranea*, quas in varias familias secundum oculorum diuisiones abire iussit, *Monoculus, Binoculus, Cancer, Oniscus, Asellus, Scolopendra et Iulus.*

In omnibus vero haecenus adductis generibus eorumque historia proponenda, ita Noster versatur, vt in initio singularum sectionum, in vniuersum de insectis, quae sub hac sectione continentur, agat, tum methodicam eorum dispositionem et generum characteres, non gallice solum, sed et latine proponat.

nat. In ipsa vero generum descriptione primum singulorum characteres, et quae circa quodque notanda sunt exponit, tunc species enarrat omnes in agro Parisiensi obuias, non solum illo, quod aptissimum ei videtur nomine, sed et synonymis ex aliis scriptoribus et triualibus gallicis denominationibus adductis. Mensuram tandem magnitudinis insecti addit, exteriorumque illius formam fuse describit, nam de internis partibus pauca monet, historiamque generationis transmutationisque explicat, locumque ubi quaelibet insecta nascuntur indicat. In figuris, quae suo operi addidit Noster, praecipua insectorum genera eorumque partes, quas generum characteres adsumsit, raro plures vnius generis species eleganter depinguntur. Si insecta microscopiorum ope aucta delineantur, vera magnitudo naturalis semper addita fuit.

Super esset, ut quae hinc inde in hoc opere continentur, aut noua aut accuratius explicata, paullo specialius indicarem. Cum vero tanta operis huius praestantia sit, ut hoc libro, qui paullo ulterius in methodica dispositione insectorum progredi cupiunt, vix carere possint, pauca hic de vniuersa Auctoris methodo inserta, nobis adduxisse sufficiat. Quapropter ex vltima tantum sectione, quae omnium breuissima est mininumque generum numerum continet, pauca tantum speciminis loco adiciamus.

Pulsatio, quae in ligno vetusto horologii instar per- T. II.
cipitur, non ab ea *Termetis* specie, quam LIN- p.602.
NAEUS ideo *pulsatoriam* dixit, sed a *Dermeste*, qui
ad coleoptera pertinet, et a LINNAEO *Byrrhus*
pulsatorius vocatur, efficitur. *Forbicina* Nostri est
Lepisma LINNAEI. Genus, quod a Nostro *Chelifer*
(*la Pince*) dicitur, *Acarum cancroidem* siue *Scorpio*
araneam et *Acarum longicornem* LINNAEI compre-
hendit. Scabiem ab *Acari* aliqua specie oriri for-
titer

titer defendit. Quae araneorum telis similia fila autumnali tempore in aere circum volitant, ab acari quadam specie ducuntur, quae ea arborum corticibus affigit, unde per ventum auferuntur. Speciem hanc Nolter *acarum fuscum autumnalem textorem* (*le tisserand*) dixit. *Phalangiis* pedum ablatorum et abruptorum loco novos iterum excreſcere putat. Omnes *araneae* constanti naturae lege octo oculos habent, nullae ex iis ſex tantum inſtruuntur. Sollicite modus, quo *aranea aquatica* fila ſua ſub ipsis vndis ducit, deſcribitur. *Monoculi* genus vnum tantum oculum *Binoculi* vero duos habent, vt itaque eae tantum ſpecies *Monoculi* LINNAEI, quas ille *Apum* et *foliaceum* vocauit, ad *Binoculos* Noſtri Aucloris, reliquae omnes ad *Monoculos* pertineant. *Araneas* non ex colorum differentia diſtinguere poſſumus, cum illi inſigniter, ſi exuias deponunt mutantur. *Oniſci* non ouipari, ſed viuipari, aut forte vtrumque ſimul ſunt. *Aſelli* genus eas *Oniſci* ſpecies continet, quibus quatuor antennae fractae, duaeque reliquis longiores ſunt, ſcilicet eas, quae in aqua viuunt. *Scolopendrarum* articulos, ſi ex eorum numero ſpecies diſtinguere cupimus, in adultis tantum numerare debemus, iuniores enim ſemper additione nouorum annulorum creſcunt. Reliquae ſectiones plures proſecto et praestantiores adhuc adnotationes continent, quas hic, ſpatii anguſtia impediti, ſicco pede tranſire cogimur.



IV.

Mémoires sur la structure intérieure de la Terre, par M. ELIE BERTRAND, M. D. S. E. et Membre de l'Académie Royale des Sciences de Prusse. A Zurich, chez Heidegger et Compagnie. MDCCLX. 8. pl. 11.

h. e.

Commentarii de structura interiorum partium telluris. Auctore ELIA BERTRANDO etc.

In tres commentarios diuisum est hoc opusculum. In primo doctissimus Auctor ea collegit, et vno quasi obtutu conspicienda exhibuit, quae hactenus de interiorum telluris partium structura satis innotuerunt. In secundo recensuit hypotheses diuersas, quarum ope diuersi philosophi illorum phaenomenorum rationes reddere sunt conati. In tertio suam ipse sententiam de rationibus illorum phaenomenorum exposuit. Subiuncta est opusculo epistola ad Cl. FORMEI de diminutione marium, et montium origine.

Nota phaenomena structurae telluris ab Auctore plurimum reuerendo hoc ordine et modo recensentur. 1) Fundus maris tam inaequalis est, quam p. 9. terra continens, et habet suos montes et valles, fissuras, cauernas, et abyssos. 2) Interiora telluris constant stratis diuersarum materialium, plus minus profundis, quae in locis planis fere horizontalem situm habent, in montibus autem fere vbi- que accliuitati cuiusque montis conuenienter inclinata sunt; neque semper eae materiae, quibus maior est grauitas specifica, inferiora strata componunt. 3) Maximi montium duas series, et p. 11. quasi

- quasi catenas, constituunt, quarum vna aequatori, altera meridiano propemodum parallela est; et ex vtraque serie vtrique producantur, tanquam rami, alii montes, sub angulis ad istarum directionem fere rectis.
- p. 13.** 4) Inter montes binos vallis iacet ad eum fere modum, quo fundus fluminis inter ripas, ut prominentes partes montis ex vno latere respondeant reductis partibus montis in opposito latere: strata interiora ambitum montis sequuntur (nisi ubi mons ad perpendicularum scissus est), et ea, quae ad parem altitudinem in utroque binorum oppositorum montium sita sunt, eandem fere profunditatem habent, et ex eadem materia constant; quo angustior est vallis, eo plures flexus montium vtrique positorum latera habere solent.
- p. 14.** 5) In montibus solidissima etiam strata saepius interrupta cernuntur foraminibus et fissuris variae latitudinis, profunditatis, ac directionis, in quibus alius generis materiae, veluti metalla, et vegetabilia saepe reperiuntur. Sunt etiam in omnibus montibus scrobes vel putei, ad perpendicularum fere descendentes usque ad speluncas seu cauernas aquae plenas. Huiusmodi cauernarum plurimae in figuram hemisphaerii per eleuationem et inflexionem strati superiacentis formatae videntur, et secum inuicem per ductus variae figurae communicant; aliae ex partibus ingentibus rupium abscissis, et delapsis super se inuicem, formatae videntur. In his illisque cauernis saepius stalactitas et crystallos mirae magnitudinis et figurae gigni notum est. Aquas in multis harum cauernarum cum mari communicare, ex falsedine vel aestu colligitur.
- p. 16.** Quaedam cauernae et ductus seu meatus subterranei aquas lacuum et fluminum recipiunt. In aliis praeparatur materies, quae inflammata erumpit, et sic terram quassat, et igniuomos montes efficit. Et sunt montes igniuomi, qui per canales subterra-

terraneos inter se iuncti videntur. Montes, qui marmore, vel sulphure abundant, maxime sunt cauernosi. Quo profundius sub vertice montis sitae sunt cauernae, eo fere spatiosiores deprehensae sunt. 6) In stratis terrae materiae insunt diuersi generis, succi oleosi et inflammabiles, salia, lapides figurati, ac gemmae, marcasitae, metalla, immo animalium et vegetabilium tanquam rudera. 7) Circa stagna, lacus, maria, flumina, et nonnunquam adeo in tractibus montosis paludes reperiuntur, in quibus partes plantarum et arborum, vel totae arbores cum terra nigra bituminosa mistae, apparent; quaedam harum paludum vno pluribusue stratis solidis teguntur, vt in vicinia *Mutinae* obseruauit RAMAZZINUS (de font. Mut. etc.) et paludes in planitie profundiores sunt illis, qui in vallibus reperiuntur. 8) Nonnunquam in superficie terrae, vel proxime eam, inuentae sunt venae tophaceae, quae ex partibus arborum et arena mistae, et ope succi cuiusdam lapideam naturam induisse videntur; occurrunt in his plantarum distinctae impressiones, conchyliia fluuiatilia, et rami arborum incrustati; et prope has venas reperiuntur plerumque riui vel fontes, quorum aqua res submersas crusta lapidea obducit. 9) Vbique fere ex terra, in primis autem in montibus, effoditur incredibilis multitudo lapidum figuratorum, in omnis generis stratis, siue terreis, siue arenosis, siue margaceis, siue cretaceis, in schisto, silice, marmore cet. delitescentium, et eiusdem plerumque cum stratis, in quibus iacent, naturae. Horum maximae partis originem e mari repetierunt historici naturales, etsi nondum inter eos conuenit, quorum animalium marinorum, vel quarum horum partium figuras isti referant, vt belemnitae, lapides lenticulares, et frumentarii (quos pro tuberculis conchyliorum habent), entrochi, asteritae

p. 19.

p. 20.

p. 22.

p. 23.

- asteritae columnares, glossopetrae, echinitae, ostracitae, cornua Ammonis, cet. qui omnes figurati lapides plerisque animantia marina, vel horum partes fuisse videntur, alii pro plantis marinis petrefactis habentur. In vno eodemque monte nonnunquam reperiuntur istius modi lapides figurati, qui referunt animalia in maribus a se inuicem valde diffitis habitantia. In quibusdam, praesertim pectinitis et ostracitis, apparet adhuc polita et splendens testae superficies: sed obseruauit tamen Auctor, hanc laminam politam multo tenuiorem esse quam in veris ostreis, et valde friabilem, et sub hac lamina reperiri materiam strati, in quo illi lapides latent. Saepius quidem referunt lapides figurati internas partes conchyliorum, non raro tamen etiam externas et conuexas. Quidam fracta et mutilata conchilia referunt. In nonnullis figurae piscium vel integrorum vel mutilatorum tanquam depictae apparent, et in quibusdam tanquam exsculptae, horumque substantia nunc cornea, nunc vere lapidea, interdum etiam metallica deprehenditur. Rarius occurrunt lapides figurati, qui animalium terrestrium partes referunt; at *Constadii* tamen prope *Stutgardiam* aliquando in strato arenoso, viginti tantum pedes sub terra posito, ingens cumulus ossium animantium omnis generis, ferorum et domesticorum, magnorum et paruorum, detectus est. Omnia ossa fossilia, si ebur Sibiriae excipias, aut lapideae sunt naturae, admixtis subinde particulis metallicis vel crystallinis; aut calcinata apparent, et salibus vitriolicis repleta. Haec ea fere sunt, quae doctissimus Auctor de structura interiorum telluris exponere voluit. Plura quidem ab iis, qui terrae viscera curiosius rimati sunt, obseruata et litteris prodita esse constat: sed videtur Auctor ea tantum elegisse phaenomena, quae ad scopum suum proxime facerent.
- In

In *secundo* Commentario ponderat hypotheses, per quas Physici haëtenus rationem horum phaenomenorum reddere conati sunt. Et postquam eos confutauit, qui fossilia figurata pro lusibus naturae, vel pro operibus naturae talibus, qualia sunt crystallisatione, sublimatione, concretione, nata, habent, hypotheses istas ad tria capita reducit. Primum enim fuerunt, qui causas istorum in perturbationibus, quas tellurem in primis praesertim a creatione seculis ab exundatione fluminum et marium, terrae tremoribus, ignis subterranei eruptione passam esse putarunt, quaerendas crederent. Sed etiamsi isto modo explicari possent deuastationes et ruinae, quae multis in locis cernuntur: tamen illa ordinata dispositio et iunctura montium conualliumque in continenti et in mari, illa series stratorum, inde intelligi neutiquam potest. Deinde visum est magnis quibusdam viris, vti LEIBNITIO, VALLISNIERO, REAUMURIO, aliis, status praesentis telluris rationem reddi posse ex oceani restagnatione super continenti, eiusque successiuo ad littora regressu, quo factum sit, vt deposita ab eo strata induruerint progressu temporis. His primum generatim respondet Auctor, continuitatem stratorum in montibus et sub regionibus planis, fundoque lacuum vel maris, nec non telluris aetatem, sexaginta seculis, quod ex sacrarum litterarum testimonio constat, minorem huic sententiae haud parum aduersari. Deinceps eis coniecturis, quibus VOLTAIRE et BUFFON hanc sententiam exornarunt, veri similitudinem demere studet. Quod autem doctissimus Auctor monet, nimis sapienter tam montes, quam interiora telluris, disposita ad certos fines apparere, quam vt haec dispositio pro opere fortuiti fluxus et refluxus aquarum haberi possit, neque specuum et cauernarum in interioribus terrae

p. 53.

p. 56.

p. 67.

ortum ex illa sententia intelligi posse: id ipsi largiendum quidem existimamus, vicissim tamen monendus videtur, aequè propositum fuisse huic sententiae addictis, saltim plerisque, illorum phaenomenorum rationem ex aquae motibus reddere, quippe quae illi, LEIGNITUS certe, per frigefactionem massae telluris primitus candentis explicare satius putarunt. Denique fuerunt, qui diluuiò Noachico tantam vim tribuerent, ut ex eius undis nouum quasi orbem extitisse crederent; in quam classem BURNETUS, WHISTONUS, WOODWARDUS referendi sunt. Horum virorum singulorum systemata Cl. BERTRAND examinat, et reiicit.

In *tertio* Commentario Vir doctissimus propriam sententiam modeste proponit, quae huc redit: non fieri posse, ut omnia, quae de structura terrae obseruata sunt, per vnicam hypothesin explicentur; hinc in tres classes ea partienda esse, et ad primam classem referenda ea, quae partium telluris intimarum dispositionem primitiuam et vniiformitatem, magnorum montium originem, specuum, cauernarum, puteorum naturalium excauationem spectent, horumque phaenomenorum omnium rationem nullam, nisi creatoris, secundo creationis die, operationem, dari posse, quibus autem causis secundariis DEVS in hac operatione vsus sit, a nobis temere quaeri; ad secundam classem pertinere phaenomena generalia in superficie terrae haerentia, nempe stratorum arenosorum et limosorum supremorum seu parum profundorum, quae ex diluuiò vniuersali Noachico intelligi possint; ad tertiam denique classem trahenda esse phaenomena, in singularibus locis ad variam sub terra altitudinem obseruata, quorum rationes ex singularibus diluuiis, terrae tremoribus, et aliis huiusmodi deuastationibus sint reddendae. Ceterum in

in numero eorum, quae a prima creatione sola pendere dixit Auctor, ponit etiam fossilia figurata, quae p. 100. animantium vel plantarum imagines exhibent, ea certe, quae in stratis primitiuis et nunquam antea ruptis vel reiectis sunt deprehensa. Existimat enim, DEUM in principio vna cum ipsa tellure creasse innumerabilem animalium marinorum et plantarum multitudinem, sed vita carentium, ex his autem per aquas dispersis certum numerum die tertio et quinto collegisse, in locis conuenientibus disposuisse, et neglectis ceteris, solis hisce vitam seque propagandi facultatem impertitum esse. Non possumus autem dissimulare, hanc opinionem nobis videri tot premi difficultatibus, vt plurimum reuerendo Auctori neutiquam assentiri queamus. Vt enim alias breuitatis studio taceamus, haec sola assensum nostrum satis impedire potest, quod ista opinio diuinæ sapientiae, quae nihil facit frustra, repugnare videtur. Nam frustra certe creata erat illa ingens conchitarum copia, quae a DEO sine vita in vndis reiecta, et deinceps sub stratis terrae, ab aqua depositis, sepulta est. Neque exemit nobis hunc scrupulum Auctor, magnam seminum copiam, quae quotannis pereunt, in opinioni suae patrocinium aduocando. Multum enim interest, vtrum aliquod corpus a corpore viuo, gignendi facultate praedito, procreatum intereat, an res, a DEO primitus condita, omnis vsus expers, et tanquam neglecta, iaceat. p. 118.

In epistola, huic libro adiecta, Auctor Cl. SULZERI Dissertationem de origine montium, in Diario litterario *Bibliothèque impartiale* anno 1750 exhibitam, sub examen reuocat, et plerasque propositiones in ea traditas approbat, paucis tantum assensum suum denegans. Nam telluris centrum gravitatis aliud et aliud continui punctum in medio globi

R r 2

terra-

- p. 141. terraquei occupare, quum magnae terrae partes ex loco suo in alium transferri soleant; valles pleraeque vndarum restagnatione effectas esse; et multos
 p. 144. montes post diluuium Noachicum demum formatos
 p. 145. esse ignis subterranei eruptione; quas propositiones Cl. SULZERUS ibi affirmauerat, plurimum reuerendus BERTRAND negat, et idoneis argumentis impugnat.

V.

Dissertation sur l'education physique des enfans, depuis leur naissance iusqu' a l'age de puberté. Ouvrage, qui a remporté le prix le 21 Mai. 1762, a la Societé Hollandoise des Sciences. Par M. BALLEXSERD, Citoyen de Geneve, a Paris, chez Vallat-la-Chapelle, 1762. 8 mai. pl. 16.

h. e.

Disputatio de infantum educatione physica, a pueritia vsque ad annos pubertatis, Auctore BALLEXSERD.

Paemissa breui introductione, quae docet, quo modo parentes se gerere debeant, donec infans nascatur, haec disputatio in quatuor periodos diuiditur, quarum *prima* differit de natiuitate infantis, et vsque ad illud tempus progreditur, quo infans ablaetatur. *Secunda* continet spatium temporis, quo ablaetatus est, vsque ad eius quintum vel sextum annum. *Tertia* incipit ab anno, quo in Europa puerorum vestimenta mutantur, et ad infantis decimum annum finitur. *Quarta* complectitur tempus a decimo vel duodecimo anno pueri vsque ad eius pubertatem.

bertatem, quam decimo quinto vel sexto anno intrat. In singulis vero periodis indagatur, quaenam vestimenta infantibus conueniant, quibus alimentis nutriantur, et praeter varias adiectas obseruationes tandem disquiritur, quaenam exercitia iis vel concedantur, vel dissuadeantur. Nos, qui nuperrime Cl. SCHÜLZII libellum *), ad infantum educationem spectantem, indicauimus, hic, ne dicta iam repetamus, non nisi maxime necessaria declarabimus.

Parentes, qui, antequam foetus concipitur, bona p. 5. valetudine fruuntur, moderato victu nutriuntur, nec nimis ieiuniis saepe debilitantur, corpus satis exercent, iustam aetatem et animum hilarem habent, multum profecto ad infantis bonam et robustam corporis constitutionem afferunt. Inprimis vero mater, simulac se grauidam sentit, ab amore coniugali abstineat, consuetis alimentis, iisque vario modo praeparatis, modice vtatur, vinum vel aqua diluat, vel, vti reliqua fortiora potus genera, plane euitet, aerem purum respiret, omissis fortioribus odora- mentis, somno magis indulgeat, nimias animi per- turbationes fugiat, vestimenta satis laxa gerat; prae- cipue vero brachia non nimis attollat, nec pondera magna ferat, omniaque vehementiora exercitia pla- ne omittat.

In prima periodo Cl. Auctor suadet, vt infans, p. 13. ligato funiculo vmbilicali, statim linteis mollibus, siccis et satis calidis obtegatur, eique, si a partu la- borioso debilitatus est, paululum vini tepidi cum saccharo exhibeatur, alias ad 24 vel 30 horas, prius- quam meconium reddidit, nullum nutrimentum su- mat. Caput, nisi a partu nimis compressum sit,

R r 3

mi-

*) vide Commentar. nostror. Vol. praesent. Part. III. pag. 412.

- minime, qui est mos nonnullorum populorum, ex arbitrio formetur. Infans nunquam aqua frigida baptizetur, quae facile conuulsiones producit.
- p. 30. Mater ipsa hunc lactare debet, cuius lac, cum infans illius succis iam sit assuetus, teneris eius organis largius magisque conueniens suppeditat nutrimentum, quam alienum lac, et praeterea colostrum ei a natura destinatur, ad meconium facillime expellendum. Ipsius vero matris sanitati maximopere conuenit infantem lactare, cui alias lochia ad quadraginta dies fluunt, fluxus albus plerumque accedit, mammarum obstructio vel effusio lactis facile
- p. 44. est timenda. Nutrix autem eligatur temperamento matris quodam modo similis, viginti circiter aut triginta quinque annorum, quae iam a partu felici quatuor vel quinque menses lactauit, bona valetudine et moribus. Cum porro earum lac, quarum rubri sunt capilli, ut plurimum acre sit: bona nutrix habeat capillos fuscis; spiritum et transpirationem suauem, copiosum lac album, sine odore, et mediocri sapore praeditum, nec nimis aquosum vel spissum, et quod ligne facile coagulatur. Infanti robusto robusta conuenit nutrix, gracilior teneriori, ne nimis spissum lac cum nausea fugat; praeterea sit hilaris, non iracunda, munditiei dedita, nec nimis timida. Alimenta sumat facile digerenda, iuscula, cocta et assata, non multis aromatibus condita, legumina, mucilaginosae, farinosae; usum fructuum acidorum et acetariorum lactis conditio aut concedit, aut dissuadet; vinum aqua diluat, fortiolem potum plane omittat, et corpus modice exerceat.
- p. 52. Cum saepe infanti maxima incommoda excitentur a fasciis, non recte circumuolutis, Cl. Auctor potius, his omissis, suadet, recens natum lintheis mollibus et siccis circumdare, deinde stragulo laneo leuiter inuoluere; sic puluinari impositus in
- cunas

cunas transferatur, et lateri vtrique vicissim incumbat, ut mucus ex arteria aspera commodius exeat et tussis caueatur. Vfus vero fasciarum tum necessarius est, cum pedes, crura, genua, coxae infantis coactum situm exigunt. Si forte cogeremur, infantes, ex defectu boni lactis vel matris, vel nutricis, lacte animalium nutrire: tum, uti Noster arbitrat, lac caprinum imprimis conuenit infantibus Germaniae Septentrionalis ad humores diluendos, Italiae vero infantibus lac vaccinum, ad humorum nimium motum sedandum. p. 75.

Infantibus, quippe qui saepe obnoxii sunt herenniis, a fibrarum laxitate et clamoribus, vermibus a glutine, muco et tussi a tardiori digestionem, vsum pultriculae lactis Cl. Auctor plane interdicit, iisque quotidie cochlear boni vini exhiberi iubet, quo viscido oleosum soluatur. Cuna non ponantur ad latus, nec sub plagulis lecti nutricis, et ita obtegantur, ut alius aer semper accedat; alias impurum respirat infans, qui sensim asthma inducit. Cum in vlnis gestatur, eius situs saepe in alterum latus mutetur, ne mollis structura corporis in vnum latus nimis inclinetur. Nono aetatis mense, postquam ablactatus est, pedibus uti discat, cum citius plerumque crura incuruentur; frenulis non sustineatur, quod facile assuescit corpus nimis antrorsum dirigere. p. 80.

In *secunda* periodo haec monentur: thoraces ut plurimum thoracem nimis comprimunt, et deminueda pectoris cauitate, tussim, viscerum obstructions, tristitiam, languorem et deformitatem infantibus excitant: igitur non nimis elastici esse debent. Primis annis infantes sensim frigori adsuescant, hilaritas iis semper seruetur, quae ad incrementum corporis maxime prodest, et omnia vitentur vestimenta, quibus nimis coercentur. In hac aetate sensim variare cibum p. 98.

p. 110. conuenit. Pulticula lactis tribus prioribus annis male digeritur, vasa lactea cum glandulis mesenterii obstruit, gluten et vermes producit. Melior quidem est, si ex farina in patina ampla cocta et saepe agitata paratur; attamen praeferatur oryzae cremor, vel mica panis cum iusculo carnis bubulae, vel lacte aut butyro recenti ad pulticulam cocta, quae singulis tribus horis paruo cochleari exhibeatur. Post eruptionem dentium molarium, carnem modice edant, praecipue vero iusculis non nimis calidis nutriantur. Vinum, nisi tribus partibus aquae diluatur, ut reliqua spirituosae plane omittant, et semper parum bibant, cum satis magnam humorum copiam habeant.

p. 117. Infantes saepe et dormiant, et edant, nec iuxta vetulas iaceant, ne marcescant. Nisi singulis diebus aluum apertam habeant, aquam puram bibant, ut aperiat, erosio cutis, diarrhoea, haemorrhagiarum, cet. saepe salutaris, non medicamentis, sed victu pariori coerceatur, atque, cum nervis maxime sensilibus praediti sint, omnia irritantia fugiant. Subitanea vicissitudo frigoris et caloris iis facile excitat decubitus in cerebro. Visum laedit locus, humiditati, vento, fumo saepe expositus, ad spectus solis, niuis, ignis, lectio nocturna vel in sole, vitra artificialia; quem e contrario corrigit graphice et ars pictoria. Auditum debilitat fragor tormentorum, campanarum, cet. qui arte musica perfectior redditur. Fugiant fortiores odores, ut feruent olfactum; nec gustum corrumpant cibis salitis et aromaticis vel nimis calidis, aut vino mero: nec cutem spirituosae exsiccent, ne tactus laedatur, qui potius instrumentis musicis perficiendus est; atque utramque manum aequali modo adhibeant, ne inaequale fiat robur. Matutino tempore apertis fenestris puriorem aerem respirent, brachia

brachia horizontaliter extendant, deinde foris obambulant. Omnia his conueniunt exercitia, quae corpus valde mouent, vt humores depurentur. Ad institutionem non cogantur, potius delectentur et ad risum saepe moueantur.

In *tertia* periodo Cl. Auctor respicit nominatim p.143. ad optimam vestimentorum, nutrimenti et exercitiorum puerilium rationem. Pueri plerumque sexto anno braccis et veste induuntur, quod autem vno vel duobus annis serius fiat, si debiles et parui sint. Non laudat nostram vestimentorum constringendorum rationem, qua incrementum corporis nimis impeditur, et potius Turcarum methodum suadet. Fasciae, subleuandis braccis accommodatae, coarum motum faciunt; tibialia sint longa, super femora ducta, quo fasciae crurales non requirantur. Caput non tegant, nisi in sole et nocte, et leues induant vestes, etiam hyeme, vt quamlibet tempestatem ferre discant. Capillos praescindere pueris vsque ad decimum annum, vel caput tondere, et ad transpirationem iuuandam, cum facile crusta formetur et pori obturentur, et ad crinium defluxum praecauendum, vtilissimum iudicat. Calceos ligneos adhibere, eos certe, qui sine fulcimento sunt, maxime pueris suadet, ne pedes introrsus flectere adfuescant. Pedes saepe frigido aeri exponantur, nec nimis angustis calceis comprimantur.

Optime iis in hac aetate conuenit iusculum sine p.152. pinguedine, ex pane vulgari, pastinaca, dauco, oryza, cet. non leni igne coctum, ne gluten faciat, nec, nisi tepidum, bis quotidie hoc sumant, idque vario modo paratum. Aromata his nocent, carnem bonam coctam et assatam, sine pinguedine et saepe frigidam edant, vinum merum, potumque caffe et chocolate euitent, nec vllum cibum repudient.

dient. Dentibus nunquam nuces frangant, aut dura corpora, nec dentiscalpiis abutantur et omnia omittant, quae gingiuas et dentes arrodunt; post coenam vero et matutino tempore buccam vino et aqua eluant. Vt a venenis praeferuentur, cibum et potum non nisi in vasis argenteis vel figulinis sumant. Ad annum octauum vsque somnus quotidie duodecim horas perduret, crescente aetate deminuat, et inita pubertate ad septem vel octo horas continetur; nec vnquam impetuose e somno excitentur. Venaesectio his semper nocet; ne medicamenta purgantia quidem prophylactice sumant; potius diaetae strictiori regimine, aqua pura ad aluum soluendam copiosius hausta, cet. vtantur. Solam variolarum inoculationem, inter quintum vel sextum, vsque ad octauum vel decimum annum instituendam, quam maxime commendat.

p.179. Pueri omnia exercitia corporis amant, vti quietem oderunt. Igitur, si ex corporis conditione hoc omittunt, tum ad motum incitentur, et vicissim corpus animusque occupetur. Toto fere die erecti stent, vt membra roborentur; tum discant arbores adscendere et muros, vtraque manu vt, lapides ad scopum iactare, cet.

p.183. In quarta periodo victus sit simplex, solidus, varius; appetitus expectetur, nec nimis satietur, nec cibis suauiter praeparatis, qui semper nocent, stimuletur, quem e contrario deminuunt moeror, inquietudo, humiditas loci, nimius potus, saburra viscida ventriculi. Mixtio victus animalis et vegetabilis, cum praebeat succum, lacti matris, quo recens natus nutritur, maxime analogum, inprimis suadenda est. Odor siti iudex ciborum, quod raro minus suaui ventriculo conueniunt. Optimum potuum genus est aqua leuis, limpida, et ab affuso lixiuio minime

nime turbida. Quae quidem optime diluit humores: attamen phlegmatici, in climate humido viuentes, alimentis pinguibus oleosis nutriti, debiles, et, qui multum dissipant, potius vinum bibant; quod, vt optimus post aquam potus, cum aqua misceatur, ante duos vel tres annos expressum fit, leve, pauco tartaro mistum. Cereuisia minus salubris est, et ebrietas inde orta nocentior est, quam a vino. Cidrum, seu succus pomorum, nervos debilitat; spirituosiliquores fibras exsiccant. Infusa thee, caffe, chocolate, quo maiorem olei copiam continent, eo magis liquoribus fermentatis sunt similia, cum tanta sit analogia olei essentialis cum spiritu fermentatione parato.

Puer leuiter obtectus dormiat corpore extenso, p.206, capite paululum eleuato, et in latere dextro. Mane surgat, et, si fieri potest, in hortis ambulet. Duris incumbat stragulis stramineis, laneis, pilosis, nunquam plumaceis, ne mollescat. Nonnunquam aliqua intemperantia concedatur, semper necessitati se accommodet, et omnia perferre studeat. Vti risus modicus maxime prodest, sic immodicus saepe haemoptoen inducit; instrumenta musica, quae ore inflantur, dissuadenda sunt, cum pectus nimis inde exerceatur. In decimo quinto demum anno, inita iam pubertate, temperamenti speciem cognoscere possumus. Sanguinei temperamenti signa sunt corporis statura mediocris, coma albicans, cutis mollis, color viuus, vrina bona satis colorata, aluus facilis, animus inconstans, hilaris, petulans. Id obseruato diaetae regimine, in hoc tractatu praescripto, facile conseruatur. Phlegmatici signa exhibent, corpus longum, cutis alba, mollis, coma candida, oculi coerulei, habitus tener, suavis, pulsus lentus, mollis, aluus laxa, salivae excretio copiosa, animus docilis, torpidus, dubius. Eiusmodi hominibus

bus concedatur vinum album et caffè, ſtimulantia, diuretica, et omnia, quae paululum calefaciunt, v. c. caro veruecina et ferina; legumina nimis aquoſa et venaefectio nocet; inprimis vero corpus exerceant. Cholericum cognoſcimus ex parua ſtatura, cute ſicca, flaua, pulſu forti, macie, coma nigra, oculo fulgido, halitu calido, magno appetitu, pauca vrina, propenſione ad haemorrhoides, aluo obſtructa, animo viuido, iracundo, iudicio celeri, conſtanti, ingenio facili, amore et odio vehemente. Vinum et ſpirituofa his plane interdican- tur, aquam copioſe bibant, paululum carnis edant, minime cibos aromatibus paratos. Diluentia, balnea, fructus et legumina acida iis conducunt, nec minus interdum paululum otii. Melancholicum plerumque triceſimo anno ſe manifeſtat, potius eſt accidentale quam haereditarium, et a nimia tenſione fibrarum nimiaque neruorum ſenſibilitate pendet. Pulſus eſt durus, viuus, cutis ſubflaua ſicca, capilli nigri, rigidi, facies difformis, oculi parui, ſicci, torui, fa- mes canina, irregularis, digeſtio lenta, difficilis, aluus obſtructa, animus triſtis, ingenium largum, memoria optima, iudicium celere, viuax, ad al- tiora ſtudia idoneum. Moeror, aegritudo, otium, ſolitudo hoc producant, quo infantes et ii, qui cor- pus exercent, nunquam laborant. Vt igitur cauſa depellatur, ſuauiem laborem in loco aere puro re- pleto ſuſcipiant, ſerum lactis, temperantia, anti- ſpaſmodica exhibeantur, ſemper delectentur, a longo labore detineantur, ſpectacula iucunda vi- deant, et inprimis peregrinentur.

p.229. Vſus tabaci pueris ſit remedium, non conſuetu- do; phlegmaticis et iis, qui fluxus ſeri capitis ha- bent, magis conuenit. Capiti pondera non impo- nant, quae ſi brachio portantur, ſaepe vtrumque brachium mutetur. Artificia, quae corpus parum
exer-

exercent et in conclavi aere corrupto pleno tractantur, digestionem laedunt, humores inspissant et obstructions efficiunt; ea vero, quae in aere libero instituuntur, corpus maximopere robustum reddunt. Exercitia anno decimo quinto vel sexto intendantur cursu longo, defatigante, in sole et pluvia; vires vario modo sensim exerceantur saltu, saltatione, gladii et armorum usu, equitando, cet. Caueant vero parentes, ne puerorum pubertas nimis acceleretur.

VI.

Plantarum rudimenta siue illarum methodus, ducta ex differentia earum seminum, cotyledonum, aliarumque partium, quae breui tempore post earum propullulationem ac ulterius incrementum in iis conspiciuntur; inuestigata, effecta ac composita a DAVIDE MEESE Hortulano in horto medico Acad. Frisicae, quae est Franequerae. Prima pars, No. I. Leouardiae Excud. Guil. Coulon 1763. 4 mai. plag. 11. tab. aen. 2. figuris viuis coloribus pictis. Textus belgicus et latinus.

Vt suis satisfaciat promissis Cl. Auctor, nunc primum nouae suae plantarum methodi specimen publice proposuit. Quo autem eiusdem fundamenta eo facilius clariusque pateant, ex praemissa copiosa praefatione primaria notemus. Princeps itaque fundamentum a differentia seminum ac cotyledonum desumfit, idque ideo, quia characteres methodici ab eiusmodi partibus, quae minimum variant, desumi debeant, semen autem, vltima et perfecta pars plantae, eiusque cotyledones minimae mutationi obnoxia sint; certum praeterea est, plantas

tas in iuuenili ac imperfecto statu nec non a feminis forma a se inuicem aequè bene discerni posse, quam in earum maiori perfectione: id quod licet verissimum sit, variis tamen exemplis ab Auctore comprobatur. *Castaneae, Fagi, Iuglandis, Amygdali, Viciae, Phaseoli, Auenae hordeique* et. s. p. semina inter se mixta separantur facile, suisque nominibus insigniuntur; et vſitatorum olerum semina, inter se confusa, a bono distinguuntur olitore. Imo genera plantarum in primo prouentu suae stirpis vel plantulae supra terram, et cum paulo vltius creuerit, ab hominibus peritis et in hac re exercitatis dignoscuntur, id quod vel agricolae docent, qui ex teneris, primum erumpentibus foliis *auenam, hordeum, secale* et *triticum* facile et bene distinguunt. Verum non solum genera hac ratione sese manifestant, sed species quoque, et agricola peritus *viciam satiuam a faba equina*, olitor *apium hortense* a *dulci*, hortulanus denique *Tagetem maiorem* a *minori*, *album, flauum* et *coeruleum Lupinum* a se inuicem distinguere valet. Quae cum ita sint, methodum ex discrimine seminum, et cotyledonum, ac ex quibusdam earum partium, quae cum iis cohaerent et paulo post proferuntur, concinnauit Noster Eruditus Hortulanus, quae, vt ipse recte monet, noua prorsus est, et ab aliis nihil, nisi generalem in mono et polycotyledones diuisionem assumere potuit. Magnam quidem cuiuscunque generis plantarum copiam ad haec duo generalia capita haecenus retulit, et secundum sua principia in classes et ordines digessit, attamen plenariam et absolutam totius methodi clauem nunc proponere nondum potuit, praecipue cum plantae non nisi saepius disquisitae, descriptae, delineataeque ordinari, hinc repetito examine disquiri debeant: multum itaque laboris et temporis ad opus absoluendum cum requiratur, tractationem per sectiones

Sectiones minores edere constituit. Quaeuis autem sectio, ut Cl. Auctor monet, complectetur partem duorum summorum capitum, quaeque in classes et ordines diuisa, quae adhuc plura alia per totum opus sequentur, praeter ea quodque genus vel species, in ea descripta et delineata, sub sua classe et ordine cum suo caractere reperiri poterit cum nomine suo botanico, quandoque et vernaculo, tandem post vnamquamque sectionem haec accurato indice demonstrabuntur; etiam in quauis sectione obseruationes addet, quas vel in generibus vel speciebus enarratis ipse instituit.

Praefationem, nunc a nobis in compendio datam, sequitur explicatio quarundam denominationum et proprietatum earum partium, quae in hoc opere ad discernendas plantas proferuntur. Et primo Cotyledonis definitionem proposuit, dein diuisionem in mono- et polycotyledones explicatam dedit, et licet omnes plantas, quae monocotyledones non sunt, duas modo, nunquam plures ostendere cotyledones statuatur; tamen illas potius polycotyledonum nomine insignire voluit. Porro plantae seminalis et cotyledonum per filum et funiculum quasi considerauit nexum, et cum hac in re magnum inueniatur discrimen, plures differentias notauit, quas ipsius Auctoris verbis hic repetamus: dixit ita: *quod attinet ad longitudinem petiolorum vel filorum cotyledonum, (nam in iis, qui his non similes sunt, ut et in multis monocotyledonibus adpellationem fili aut nexus retinebimus) quae deinceps tantum sub nomine petiolorum veniunt; illi adpellantur breuissimi, quando ferme habent dimidium latitudinis cotyledonis, breues, quando aequant dimidium latitudinis; longiusculi, quando fere tam longi sunt, quam tota latitudo, longi, quando aequant totam latitudinem, longissimi, quando petiolus totam latitudinem cotyledonis*

nis exsuperat. Si vero longitudo petiolorum latitudinem cotyledonum adeo superat, ut eorum dimidium vel totam longitudinem aequet, vel tota longitudine paulo longiores sunt (nempe talium cotyledonum, quorum latitudo cum longitudine clare discrepat) tum petiolorum longitudo ita poni debet; scilicet si propemodum habent dimidium longitudinis cotyledonis, breuissimi dicuntur; quando aequant dimidium longitudinis, breues, si vero fere tam longi sunt, quam cotyledonis longitudo, longiusculi, si autem eorum plenam longitudinem attingunt, longi; et si illam superant, longissimi adpellantur. Cauliculi etiam, ut deinceps Cl. Auctor, quarundam plantularum, quos memoro, quique in duas partes discreti sunt, et duabus particularibus adpellationibus nominati; scil. ea pars cauliculi, quae a radice sursum profertur eo, quo cotyledones inhaerent vel adhaerent, adpellantur cotyledonis cauliculi, ob veros cotyledones, quos portat; atque ea pars, quae ab inhaesione petiolorum verorum cotyledonum ad sedem verorum et priorum foliorum tenerae plantae, quae immediate primo post veros vel proprios cotyledones in plantula generantur, pseudo-cotyledonis cauliculi dicuntur; quia nonnulli illa vera et propria prima folia quarundum plantarum, quae in apice suo verum cotyledonem e terra secum sursum ferunt, et quando propullulant, vel paulo post reducunt, atque plane deponunt, et quantum detegere potui, immerito pro veris habuerunt cotyledonibus; haec vero prima folia, siue proueniunt integra vel diuisa, postea nominantur pseudo-cotyledones.

His itaque illustrationis gratia praemissis, ipsam tandem proponit plantarum methodum Cl. Auctor. Sunt scil. plantae:

Cap. I. MONOCOTYLEDONES aequae

A) INVISIBILES, quae sub terra occultatae manent.

Clas.

Clas. I. *Perforatae* dum plantula plane per totum semen crescit.

Ord. I. *Plantula plane per corticem s. tunicam et ab uno latere cotyledonis crescens, absque quo tunicam vel corticem frangit.*

A) *Totum semen minus magisue oiforme et angulare.*

α) *Tunica* angulata, laeuissima, ossea, et colore parumper coeruleo; a fine acuminato suboblique aperta, et ab altero rotunde umbilicata et perforata.

β) *Cotyledon* subeordatus, ab vno latere planus et profunde sulcatus *).

A. TRIPSACUM **).

Ord. II. nunc deficit, et in hac, vt et sequentibus Classibus suo tempore sequetur.

Cl. II. *Radicatae* dum cotyledon immediate supra radicem collocatur.

Ord. I. Radice recta linea deorsum tendente. *Zea.*

Ord. II. Radicibus fibrosis *Secale.*
Avena.

Cl. III. *Funiculatae*, quae funiculo umbilicali a plantula separatae sunt.

Ord.

*) Ita vbique in reliquis generibus vel speciebus totum semen, tunicam eiusdem et cotyledonem descripsit, quae vero, plerumque peritis Botanicis nota, repetere in sequentibus nolimus.

**) Generis vel speciei hic denominatae delineationem viuus coloribus variam plerumque pictam dedit, quo cotyledonis, radiculae et enatae plantulae varius status habitusque clare adpareat.

Ord. I. Funiculo umbilicali deorsum tendente e dorso cotyledonis, ac inhaerente apici crassae et quasi oblique defectae atque deorsum dehiscents vaginae *Phoenix*.

Ord. II. Funiculo umbilicali deorsum tendente ex vno fine cotyledonis declivem efficiente arcum, inhaerente vaginae quasi plane defectae limbo *Narcissus*.

Ord. III. Funiculo umbilicali sursum tendente e medio vel dorso cotyledonis, inhaerente apici cuiusdam quasi oblique defectae et aliquantulum dehiscents vaginae. *Commelina*.

Ord. IV. Funiculo umbilicali sursum tendente ex vno fine cotyledonis, breui arcu sursum curuato, recte sursum tendente in substantia ad apicem cuiusdam subhamiformis vaginae, quae oblique deorsum dehiscit. *Wachendorfia*.

B) VISIBILES. Quae supra superficiem terrae crescunt.

Cl. IV. *Cuculatae*. In quibus cotyledon supra in apice primi folii vel foliorum plantulae collocatur.

Ord. I. Primo folio, in quo semen vel cotyledon collocatus est, subulato, folio, succido et laeuissimo; ab inferiori parte absque cauliculo atque torosam efficiente crassitudinem apud principium radiceis. *Allium*.

Cap. II. POLYCOTYLEDONES.

A) INVISIBILES, quae subter superficiem terrae occultae manent, atque edanem magnitudinem habent.

Cl. I. *Semireniformes*. Quisque cotyledon, minus magisque reniformis secundum longitudinem dissectus.

Ord. I. Cartilaginosa, plerumque conclusae manentes. *Vicia*.

Cl. II. *Semiglobosae*, quisque cotyledon globosus dissectus.

Ord. I. Cartilaginosa, plerumque conclusae manentes. *Pisum* *).

B) VISIBILES. Quae veniunt supra superficiem terrae, et eandem magnitudinem habent.

Cl. III. *Semiouiformes*, quisque cotyledon ouiformis longitudinaliter dissectus.

Ord. I. Cartilaginosa, paululum modo supra superficiem terrae venientes et plerumque a se inuicem separatae, quaeque in limbo suo ad vnum latus a plantula distant. *Phaseolus*.

Ord. II. Cartilaginosa, et supra superficiem terrae longe se eleuantes, et a se inuicem separatae, ac in pla-

S s 2

nitie

*) Duas *Pisi* species, *aruens. fr. albo*, et *Eruilia sylvestris* hoc ordine recensentur, et vtriusque, vt iam monuimus, semen totum, eius tunica et cotyledon describitur, praeterea vero in his prima plantae folia vt characteres distinctiui specfici commemorantur, quae in priori specie ex communi petiolo proueniunt numero quatuor, collocata per paria, primum par ab utroque latere axillae, alterum in fine eiusdem, anteriori apice petioli vnci modo depresso. *Pisi Eruilia* dictae vero primi pseudo cotyledones communiter sunt acute lanceolati et cum suis inferioribus partibus sibi inuicem coniuncti, atque ita apud caulem deorsum tendentes et hoc modo cum eo connexi, qui vero postea proueniunt, apices suos in tres acutos hamulos diuidunt. Eadem ratione duas *mimosae* species respectu primi folii distinguit Cl. Auctor.

nitie sua magis minusue sursum ad
vtrumque latus a plantula distantes
Dolichos.

Cl. IV. *Exsectae*, quisque cotyledon ab in-
feriori parte acuto angulo excrematus.

Ord. I. Cartilaginosae, et quisque limbus
acuto angulo terminans, et ab an-
teriore parte obtuso-rotundus; co-
tyledonis caulis infra apud radi-
cem lato et plano pede extensus.
Mimosa.

Ord. II. Cartilaginosae; et quisque lim-
bus in crispatam desinens auriculam,
a superiori parte latus et aliquantu-
lum concavus, obtuso rotundus;
cotyledonis caulis apud radicem
lato et plano pede expansus, ra-
dix rubicundo fusco colore, *Poin-
ciana.*

Et haec est aliqualis, hoc primo specimine
data, methodi novae delineatio, genera plura
et species in posterum proponuntur. An eadem
Botanicis placebit, diuinare haud quaquam valea-
mus; attamen Cl. Auctoris industriam attentionem-
que, merito collaudamus.

VII.

Dissertatio de Aceto. Auctore Cl. NICOLAO
GEORGIO OOSTERDYK. Traiecti ad Rhe-
num, ex officina Iohannis Broedelet. 1762.
4 mai. pl. 7.

Componitur haec dissertatio ex duabus partibus:
in priori acetum chemice exploratur, in poste-
p. 1. riori vero usus eiusdem medicus exponitur. Ace-
tum

tum liquorem vegetabilem, secunda fermentatione productum, ex vino, in quod omnes vegetabilium succi, cocti potissimum, saccharini omnes apta partium transpositione, hoc est fermentatione, prius mutantur, obtineri, constat. Acidus iste liquor, quonam modo parandus sit, primo explicare Noster annititur; hinc ex hydromelle, quomodo vinum et ex hoc quomodo acetum paretur, ostendit. Recte autem monet, a vitiis, in prima fermentatione commissis, plurima, quae in aceto parando occurrunt, incommoda deriuanda esse, omnemque, acetum bene parandi, artem in eo consistere, ut spirituum, quantum licet, reseruetur. Aceti parandi modo descripto et phaenomenis, in fermentatione obuiis, explicatis ad examen partium ac proprietatum aceti transit. Idcirco destillationi istud subiecit, p. 12. et varia inde acquisita producta disquirens annotavit, qualis sit aciditatis eorum discrepantia et quae-nam ab acido isto, productis inhaerente, sale solui se patiantur corpora; deinde autem in inflammabilem, quae varia sub forma prodit, substantiam inquisiuit, tandem vero residuum exustum explorauit et salinas inde obtentas particulas variae indolis examinavit. Partibus examinatis aceti naturam exponit p. 27. dictumque acidum ab vniuersali illo acido sola tantum componentium partium mixtione ac proportionem nec indole diuersum esse, ostendit. Cuncta haec, quae haecenus exposuit, variis nec paucis experimentis illustravit, quae quidem, licet noua prorsus existimanda non sint, ita tamen comparata deprehenduntur, ut iis, qui acidi huius liquoris naturam eiusdemque vim in varia corpora in memoriam rursus reuocare cupiunt, utilitati esse queat. Ultimo demum loco de usu aceti medico agit Cl. Auctor, quem ex aliorum observationibus se collegisse, fatetur. p. 33.

VIII.

Journal de Medecine, Chirurgie, Pharmacie, etc.
par M. VANDERMONDE, Docteur en Medecine de la Faculté de Paris, ancien Professeur en Chirurgie françoise, Censeur Royal, et Membre de l'Institut de Pologne.
Tom. XIII. a Paris, chez Vincent. 8. Alph. I. pl. 13. tab. aen. 1. Tom. XIV. Alph. I. pl. 13. tab. aen. 2.

h. e.

Diarium, ad artem salutarem, chirurgiam, pharmaciam, cet. pertinens. Auctore Cl. VANDERMONDE. Tomus XIII, et XIV. etc.

T. 13. **I**n mense iulio 1760 haec inprimis notari merentur.

P. 38. 3) *De variolarum eruptione, balneis adiuta*, Auctore Cl. OLIVIER. Puer septem annorum, tempore, quo variolae saeuiebant, subito conuulsionibus cum stridore dentium ac febre afficiebatur. Sumto emetico conuulsio quidem mitigata est, sed purpura erumpebat, post sex horas rursus euanescebat, et regredientibus conuulsionibus. Idem effectus ab usu spiritus volatilis cornu cerui et laudano liquido SYDENHAMI prouenit. Cum cutis emollienda esset, et alba cutis semper densiorem structuram habeat, (chirurgi enim in venaesectione semper maiorem resistantiam a cute alba sentiunt) balneum aquae tepidae ad semihoram tam vtiliter adhibitum fuit, vt somnum, variolarumque confluentium eruptionem excitaret, conuulsionesque plane depelleret.

6) Epist. Cl. AMOREUX de usu interno belladonnae. p. 47.
Femina 36 annorum in mamma dextra iam a pueritia tumorem carcinomaticum habuit, qui tandem, cum terrore menses supprimerentur, motus fuit, et variis imprudenter applicatis, breui tempore maximos dolores excitauit, ichorem et ex fungo excrecente sanguinem emisit. Fomentationes vero crebriores cum decocto belladonnae carnem fungosam sensim compescebant, suppuratio accedebat et aegra tandem plane conualuit.

8) De excrecentia ad linguae radicem, ligatura exstirpata, Auctore Cl. GODART. p. 66.
Hic tumor, nucis moschatae magnitudine, pedunculo infidebat. Aegra et in operatione et postea vomuit, altero die aegrius respirauit halitum foetidum, tertio tumor exfoliari videbatur, quarto hunc simul cum esca deglutiebat aegra atque sic conualuit.

10) Obseruatio de hernia inguinali, vomitu excitata et gangraena finita, Auctore Cl. LATTIZE. p. 71.
Tumori applicuit cataplasmata emollientia sed sexto die gangraena accessit, et crusta oriebatur, per quam foeces egrediebantur. Haec tertio die applicatis digestiuis secessit, effluxus foecum et feri sensim cessauit et cicatrix formabatur. Cum vero aegra purgans sumisset, per quatuor dies magna feri copia, inter intestina et peritoneum proficiscens, e vulnere emanauit, aegra tamen intra mensem plane curata est.

In mense Augusto, 1760.

N. 5. Obseruationem de cardialgia conuulsua exhibet Cl. MARTEAU DE GRANDVILLIERS. p. 141.
Iuuenis quindecim annorum conuulsione extremitatum laborauit cum vomitu pituitae acris, saepe sanguinolentae, fame canina, dolore dextri lateris capitis et condyli sinistri maxillae inferioris, et lan-

guore insigni. Oculi dextri pupilla nimis dilatata vix aliquid vidit, vrina turbida, alba, sero lactis similis erat. Simulac in dextro latere peccinaretur, in syncope et convulsiones incidit. Hoc malum, quod perpetuus usus fructuum crudorum et lacticiniorum sensim excitarat, lapides cancerorum, pulvis de guttetta, infusa florum tiliae, lenia purgantia et aquae martiales breui tempore sustulerunt.

p.149. N. 6) *Observatio de hydrope et parotidis tumore, ad febrem putridam sensim accedente, ubi insignis effectus corticis peruiani in gangraena declaratur, Auctore Cl. RICHARD.* Febris putrida quidem cum ascite per diuretica intra duodecim dies depulsa sunt, sed subito parotis sinistra adeo intumuit, ut, iugularibus compressis, faciei erysipelas efficeret, et altero die gangraena accederet. Resecta deinde parte corrupta, cardiaca et antiseptica, imprimis china china, per dies ad unciam semis sumpta, altero die suppurationem et sensim vires excitarunt. Quamquam vero paulo post muscoli maxillae inflammabantur et pus in saniem mutabatur: duplicata tamen corticis peruiani dosis, digestium simplex et balsamus Arcaei vlcera haec sensim consolidarunt et aeger sanitatem recuperavit.

p.160. N. 8) *Observatio de bezoar humano, Auctore Cl. BONTE.* Vir per aliquod tempus in regione epigastrica pondus sentiens, postremo quaecunque assumserat, vomitu reiecit. Aucta anxietate et dolore in variis abdominis regionibus progrediente, tandem per alium eiecit lapidem insignem, colore flauo, splendente, levem, pinguem tactu, inflammabilem, liquecentem et aquae innatantem. Qui exortus in vesica fellea, per ductum cholodochum ad duodenum delatus, ibique a bile nimis viscida sensim auctus esse videtur.

In mense Septembri 1760.

N. 2) *Obſervatio de comate vigili*, Auctore Cl. p.211.

ALLIET. Vir poſt febrem intermittentem anomalam furunculis vexabatur, paulo poſt ſcabiē, qua reſpreſſa obſtructio alui acceſſit cum calore inſigni pollicum pedum, et procidentia inteſtini recti. Senſim tremores extremitatum inferiorum ſenſit, quaſi paralyſi laboraret, et famem caninam, ſoporem et propter calorem pedum, phrenitidis ſpeciem ſuſtinuit. Ardor pedum, ſi fricarentur eorum plantae, ceſſabat. Balnea ad 14 dies adhibita et mannata mox mitigarunt ſymptomata. Reſoluentia et diaphoretica in forma boli ſumta ſtatim morbum reuocarunt. Variis tandem fruſtra tentatis veſicatoria applicauit ipſi brachio, puſtulis acrem humorem ſtillantibus reſerto, tanto cum ſucceſſu, vt ſenſim plane conualeſceret.

N. 3) *Obſervatio de ſequelis vomitus cruenti*, p.226.

Auctore Cl. MARTEAU DE GRANDVILLIERS. Femina a potu vini pomati (*cidre*) colicam ventriculi et vomitum cruentum paſſa eſt. Ab hoc tempore nihil niſi lac ſumſit, quod ſemper poſt duas horas coagulatum reddebat. Putandum eſt, pylorum fuiſſe obſtructum, cum aluus ad viginti ſex annos nunquam poſtea libera facta ſit. Deinde bis in morbum incidens lac huic non conuenit, ſed iuſculum et vinum, et aluus tum aperta fuit, qua ruruſ obſtructa et reiectione iuſculi et vini dicti conualuit.

N. 5) *Methodus tractandi hydropem aſciten*, p.229.

Auctore Cl. DEPLAIGNE. Incipit per decoctum ononidis ſcolopendrae rad. chinae et glyzyrrhizae, deinde exhibet ad quatuordecim dies bolum ex ſcammon. ſcrup. ſem. antim. crud. croc. martis a gr. v. cum ſyrup. rhamni cathart. poſtea ad quatuor dies purgans et ſyrup. rhamni et pulv. lalap. Tandem ſequuntur cardiaca et tonica; ſic facile colatoria aperiuntur, et morbus

plane tollitur, etiamfi ob nimiam aquae copiam paracenthesis necessaria est.

p.250. N. 7) *Historia vulneris, cum variis symptomatibus coniuncti*, Auctore Cl. GODARD. Homo sibi cultro vulnus sub trochantere maiori fecit ad quinque pollices longum, cuius haemorrhagia, praemisso semper spasmō doloroso in parte superiori interna femoris, saepius regrediebatur. Haec tandem cessavit post sedecim dies, vulnere valde sicco et ab adstringentibus nigrefacto. Vena, manente febre, secta est, et clysmata ob alui obstructionem ad undecim dies durantem adhibita sunt, vulnus autem semper postea sanguinem stillavit. Sedato tandem sanguinis profluvio, suppuratio incepit et sensim deiectiones purulentae accesserunt et vrina pure plena. Tandem e vulnere exhibant frustula carnis putridae, sanguinis grumi maxime foetidi. Corticis vero peruvianī vsu pus correctum est et vulnus sensim consolidatum.

In Mense Octobris, 1760.

p.346. N. 3) *Observatio novae speciei exostoseos ossis cylindrici*, Auctore Cl. DUMONT, fil. Rusticus ab equo in parte inferiori quatuor pollices supra condylos femoris tactus, ab incessu impediēbatur. Variis tentatis tandem ibi ortus est tumor durus ad oui magnitudinem et aeger moriebatur. In cadauere apparuit, omnem contextum cellulosum femoris musculorum a pure destructum esse. Tum vidit Cl. Auctor supra condylos tumorem osseum, quatuor vel quinque pollicum, figura ellyptica, inaequali, petrosa, multis foraminibus pertusum, cauum. Os perpendiculariter sectum, non fractum erat, canalī iusta diametro, exostosis ipsa partim constabat ex materia ossea, femori applicata, partim cum ossis substantia coniuncta, eius cavitās durior erat superficie,
nec

nec cum canali osseo connectebatur. Canalis parum medullae maxime foetidae continebat.

N. 5) *Observatio de aneurysmate vero, sponte sa-* p.352.
nato, Auctore Cl. DESLANDES fil. Feminae 58
ann. arteria brachii dextri in venaesectione secta erat,
sed sanguis forti ligatura coercebatur. Post tres dies
tumor ibi ortus est nucis auellanae magnitudine.
Cum aegra laminam ferream vix ultra tres septimanas
sufferret, tumor intra octo menses ad magnitudinem
oui anserini accreuit, ad annum vsque sic permanfit
et sola madefactione cum aqua lauendulae spirituosa
interdum peracta, sensim decreuit, tandem plane
evanuit, vt hoc brachio omni modo vti posset.

N. 7) *Observatio de aneurysmate arteriae sperma-* P.359.
ticae, et scroto inde scirrroso facto, Auctore Cl. IUL-
LIEN. Operarius a nisu fortiori dolorem inguinis
dextri sensit, cum eius tumore, sensim in scrotum
descendente, qui post quatuor menses maxime du-
rus erat. Cum sitim nimio potu compescere tenta-
set, hydrops accessit et aeger moriebatur. In ca-
dauere funis spermaticus non aderat, sed corpus
scirrhosum cylindricum ad duos pollices cum semisse
in peripheria, ab annulo abdominali vsque ad scro-
tum. In hoc dissecto canali conspiciebatur sola ar-
teria spermatica sic distenta, vt digitus minimus im-
mitti posset, eaque concretionibus polyposis referta.
Membranae huius tumoris fibrae spirales duas con-
stituebant laminae textura quasi cartilaginosa, et inter
vtramque humor limpidus erat. In testiculo fere
exsiccato nec vena, nec arteria, nec nervus conspi-
ciebantur. Penis vsque ad glandem in scroto hae-
rebat, tumore circumdatus. Diuiso septo scroti
hydroceles faccata ad testiculum adhaerens aderat, in
cuius epididymide tuberculum pure flauo repletum.
Arteria spermatica dextra ab ortu vsque ad annulum
sanguine obturata erat, vena vero ligamentum pla-
num vel funem sistebat. N. 8)

P.369. N. 8) *Obſervatio de placenta uterina cauo membranoso retenta*, Auctore Cl. AGASSE. Puerpera relicta placenta et multum sanguinis amiserat, et doloribus angebatur. In vteri anteriori pariete erat cauitas, cuius ostium collum quasi formabat duorum pollicum diametro, fundo ampliore, vbi centrum placentaē adhaerebat, quae totam cauitatem obducebat. Cl. Auctor igitur circumcirca separauit secundinas, sed centrum placentaē cauitati arctissime adhaerebat. Igitur sumit punctum fixum ad regionem iliacam et lumbarem sinistram obstetricis ope, et sinistra manu ad oppositam regionem, et sic multis cum doloribus feminae placentaē, in centro linea circulari instructam, soluit et femina sensim conualuit.

In mense Nouembris, 1760.

P.431. N. 4) *Obſervationes anatomicae*, Auctore Cl. PERRIN. In cadauere deficiebat ren dexter, cum vretere, e contrario ren sinister octo pollices longus, sex pollices latus, et duos crassus erat, vreter maxime dilatatus, duos calculos, amygdalae magnitudine alter, et alter semipollicis longitudine, continuit. In cadauere feminae duplicem vterum detexit.

P.433. N. 5) *Obſervatio de exſtirpatione tumoris in fornice palati, cum descriptione fasciae peculiaris ad ſiſtendam haemorrhagiam*, Auctore Cl. ANSELIN. Haec excrescentia ad 15 annos crescens, totum os impleuit. Inuenit igitur instrumentum ex lamina ferrea alba, hic delineatum, quod affigitur spirae puluinatae. Tum scalpello vtrinque acuto, apice rotundo, tumorem semicirculariter incidit, eumque cum omni tunica exsecuit. Cum vero arteria ad latus dextrum palati, paulo posterius, valde cruentaret, instrumenti laminam conuexam, cochlea-

cochleari similem agarico instructam applicauit, sic haemorrhagiam sedauit et vulnus post septem septimanas coaluit.

N. 6) *Observatio de medela epiploenteroceles cum P.439.*
sphacelo et iactura partis intestini, Auctore Cl. IEART.
 Haec erat hernia inueterata, ex nisu fortiori exorta, magnitudine duorum pugnorum, cum pessimis symptomatibus. Quarto die operatio suscepta est, et dissectis integumentis apparuit, ilei partem gangraena corruptam esse, vti pars epiploei sphacelo. His remotis duo vermes longissimi et albi e vulnere exhibant. Sed infuso cort. peruu. digestiuis ex essentia vulneraria cum hyperico, solano, veronica, tandem intestinum consolidauit, et aeger plane conualuit.

In mense Decembris, 1760.

N. 2) *Obs. de usu interno cicutae.* Auctore Cl. p.511.
 LALLEMENT. Obstructiones scirrhasas hepatis, lienis et glandularum mesenterii pilulis ex pulueribus aperitiuis et extracto foliorum recentium cicutae intra sex septimanas plane sustulit.

N. 5) *Observatio notabilis de lithotomia per lithotomum occultum facta*, Auctore Cl. CHASTANET. p.540.
 Puer iam a pueritia dolore in regione vesicae afflatus, tandem 10 anno ad sex menses dolorem fixum sensit in rene sinistro, cum lateris oedemate. Praeterea rhachitide, incontinentia vrinae, insultu febrili irregulari laborabat. Praeparatus ptisana emolliente, clysmatibus et victu leui, succulento, operatio instituta est, eiusque ope duo lapides 3 drachmarum pondere educti, sine conuulsione et haemorrhagia. Deligatus dormibat et 6to die iam cicatrix consolidari videbatur, cum subito febris accessit, renis dolor auctus erat et multum ichoris e vulnere et cum vrina emanabat. Absterxit vesicam
 copio-

copiosis decoctis emollientibus et regionem aegrotam fouebat embroche oleorum emollientium et fomentis. Sic 15 die multum puris exibat e vulnere, et dolor et tumor lateris disparuit. Aeger sumsit pilulas saponatas cum therebinthina. Cum vero diaetae errorem commisisset, colica deiectionibus accessit, quae vix ab euacuantibus depelli poterant, et febris tertiana superuenit: cortex peruuianus bono cum regimine aegrum tandem post tres menses plane a morbo liberauit.

Tom. XIV. In mense Ianuario 1761 praeter alia, inprimis haec indicari merentur;

T. 14. N. 2) *Observatio de medela cancri mammae, usu*
 P. 11. *belladonnae, cum noua methodo hanc praeparandi, Auctore Cl. MARTEAU.* Femina 45 annorum tumorem maxime dolentem in mamma dextra habuit, qui intra tres annos oui anserini magnitudinem attigit. Adhibuit Cl. Auctor bolos purgantes, electuarium purgans cum laudano et lac asininum, tandem tincturam belladonnae, quotidie ad granum semis, et post duos menses tumor decreuit. Omissis deinde purgantibus tincturae belladonnae dosim quotidie auxit. Octo dies ante catameniorum tempus tumor semper pristinum volumen recuperabat, sed sensim decrefcebat. Ascendit tandem ad vndecim grana belladonnae, et tumor non amplius dolore coniunctus ad phaseoli magnitudinem detumuit, minime tamen plane dissipatus est, quamquam belladonnae bolus duodecim granorum radicis cicutae adiectus est. Praeparatio tincturae haec fuit; belladonnae vnciae quatuor, menthae crispae vnciae duae, croci or. drachmae duae, concisis admisc. spirit. vini librae duae, spir. volat. cornu cerui sine calce vncia semis, digere, exprime et tantum spiritus vini affunde, quantum post colaturam a libris duabus cessit.

N. 3)

N. 3) *Observatio de chorea S. Viti*, Auctore Cl. p. 28.

SUMEIRE. Puella in decimo aetatis anno corpus minime in situ aequali sustinere poterat, nec unquam caput fixum tenere, et labia cum maxilla semper mouebantur. Attamen venaesectio ter instituta, tria purgantia, iulapium paregoricum, electuarium roborans et infusa salviae ac melissae aegram brevi tempore a morbo liberabant.

N. 7) *Observatio de aneurysmate enormi*, Auctore p. 55.

Cl. BOUCHER. In cadauere a rupto aneurysmate arteriae subclaviae dextrae demortui, tumor sub cute ultra viginti pollices in peripheria describens inueniebatur, a costa superiori scapulae ad tertiam thoracis costam usque descendens. Praeterea impulsus sanguinis in hunc saccum aneurysmaticum effecerat luxationem scapulae, cum pars extrema interna claviculae a sterno ad aliquot pollices et scapula totidem ab insertionibus trunci separatae essent. Liqueore, quem tumor continuit, euacuato, cauum tumoris duos pedes geometricos cum semisse constituere, detexit Cl. Auctor. Maxima pars arteriae subclaviae, ab ortu carotidis usque ad arteriam axillarem in hunc saccum aneurysmaticum mutata erat, primae vero ac secundae costae anterior pars, et superior sterni carie exesa.

N. 8) *Epistola Cl. TAIGNON, in qua fungum amadou imprimis mollem ad subito sistendam haemorrhagiam, si orificio vasis laesi applicatur, maxime commendat*, quod tribus exemplis confirmat Cl. Auctor, adeoque eius ope sub forma pessarii magnam vteri haemorrhagiam sedauit. Est verus agaricus quernus ad ignem suscipiendum praeparatus.

N. 10) *Descriptio et usus instrumenti ad sectionem lateralem calculi praestandam*, Auctore Cl. p. 68.
BROMFIELD. Hoc instrumentum, *le double gorgeret* dictum, et sufficienti sectione ad collum vesicae et pro-

prostatam, et defendendo intestinum rectum contra vulnus, se commendat. Sectis integumentis et vrethra manubrium sub pollice ponitur, vt pars conuexa secundae phalangae indicis innitatur. Apice instrumenti in sulcum specilli ingresso, hoc specillum sinistra manu versus sinistrum gluteum dirigitur et instrumentum in vesicam immittitur, vt prostata oblique extrorsum scindatur; tum retrahitur superior instrumenti pars, et concaua tantum pars in vesica relinquitur, vt tanquam canalis, ad calculum forcipe educendum, inseruiat.

In mense Februario, 1761.

p.108. N. 2) *Observatio de cancro mammae, usu interno belladonnae curato*, Auctore Cl. VAN DEN BLOCK. Exhibuit aegrae infusum belladonnae, ex foliis tenerrimis, reiectis stipitibus, ad modum a Cl. LAMBERGEN commendatum, quotidie ad duo vascula, tandem ad tria, et siccitatem quidem oris, vrinaeque insignem acrimoniam, quae vias vrinarias ardebat, inde excitauit, tumor tamen, oui columbini magnitudine, intra nouem menses plane dissipatus fuit, aegraeque sanitas restituta.

p.121. N. 3) *Observatio de bono effectu cicutae in morbis scrophulosis*, Auctore Cl. MARTEAU. Humor scrophulosus viri 40. ann. pedem sinistrum et brachium occuparat, ibique vlcera excitarat, usu tamen pilularum de cicuta, ad quatuor grana pro dosi, aeger breui tempore sanatus est. Alii aegrae pilulis his strumas colli plane depulit Cl. Auctor, eademque in ictero et hepatis scirrho, coniuncto usu aquae de Forges, maxime profuerunt.

p.145. N. 5) *Observatio de cornubus abortis ad femora plurium feminarum*, Auctore Cl. DU MONCEAU. Mulier 78 annorum, cornu ad posteriorem et inferiorem partem femoris sinistri, 4 pollices supra genu per

per quatuor annos percepit. Maximos tandem sensit dolores a separata parte radicis, integumentis adhaerentis, qua plane exstirpata, vulnus post sex septimanas coaluit. Cornu, hic delineatum, arietis cornu simile, nouem pollices longum est, ad radicem 3 poll. crassum, ad finem vnum et octo lineas. Alia femina per 26 annos ad mediam et internam femoris dextri partem cornu habuit decem pollices et octo lineas longum, tres pollices ad basin crassum, quod, cum ad septendecim annos saepe secasset, tandem sponte excidit, et vlcus cancrosum, insignes dolores sensimque mortem excitauit. Alia paruum femoris cornu filo sericeo ligauit et exstirpauit. In aliis post secessum cornuum femoris semper vlcera cancrofa oriebantur.

N. 7) *LOUIS Epistola de Sarcocoele.* Hic mor p.171. bus est tumor testiculi, renitens, non dolens, ab hernia intestinali et epiploi per plicam inguinum integram distinctus. Saepe vt excrescentia carnosafuper corpus testiculi apparet. Curatur inprimis venaesectiōe, purgantibus, balneis, emplastris discutientibus et resoluentibus; balsamo sulphuris tumor illinitur; frictione mercuriali, inprimis sarcocoeles venerea. His frustra tentatis testiculus secatur, ne carcinoma fiat. Si tumor peculiaris super testiculum adest, incidatur cutis scroti et tumor excindatur, vel cauteriis exstirpetur, quamquam exscissio est praeferenda.

In mense Martio 1761

N. 2) *Historia febris continuae in intermittentem* p.303. *anomalam transeuntis*, Auctore Cl. GODART. Femina, 22 annorum febre vehementi correpta fuit cum pectoris affectu, angina, capitis dolore et siti vehemente. Suppressio catameniorum, a febre exorta, symptomata auxit, venaesectio tamen et
Tom. XI. Pars IV. T t rube-

rubefacientia haec mitigauit. Nono die febris post sudorem remisit, decimo substitit et vrina sedimentum deposuit ac febris vndecimo aberat. Duodecimo mannae potio parum profuit, decimo tertio, redeunte sudore aegra sanguinem grumofum et floridum expuit, accessit horripilatio calore excepta et vomicam indicabant. Decimo sexto vena secabatur. Puluis tartari vitriolati sudores auxit, et cortex peruianus convulsiones excitabat, laudano facile compescendas. Decoctum plantaginis, infusum vinosum salviae et extractum corticis peruiani sensim sudores copiosos dissiparunt et aegra post tres menses convaluit.

P.211. N. 3) *Observatio febris proteiformis*, Auctore Cl. PLANCHON. Femina hysterica, 45 annorum, suppressis per sex menses catameniis, inflammatione hepatis cum tussi et sputo cruentoangebatur. Venaesectio bis instituta et purgans conueniebant. Auctis tertio die symptomatibus emplastrum emolliens lateri applicatum profuit. Die sequente paroxysmus vehementer rediit, clysmatibus tamen, fomentis abdominis et diluentibus superatus est. Electuarium tandem corticis peruiani cum rhabbaro et gummi ammoniaco, ac sale ammoniaco, vt et bechica morbum mitigarunt, quinto die menstrua rursus erumpebant et aegra sensim sanata est.

P.218. N. 4) *Observatio febris hecticae*, Auctore Cl. LORENT. Vir in febre continua dosin pulueris D'AILLAUD sumsit, et nimias deiectiones cum vomitu cruento sibi contraxit. Febris quidem cessauit, sed paulo post in febrem hecticam marasmodem mutata, cum variis symptomatibus, inprimis ventriculi debilitate, rediit, et aeger post octo menses mortuus est. In cadauere Cl. Auctor inuenit cartilagineas costarum osseas, ossa maxime sicca, fragilia, pul-

pulmones pleurae adhaerentes, gangraenosos, pericardii partem cartilaginofam idque cordi firmissime adhaesit, polypum magnum in principio arteriae pulmonalis, ventriculum aere distentum, cuius membrana villosa exigua tantum partem circa cardiam inuestiebat, reliqua pars laevis et quasi absterfa videbatur et forte a puluere d' Aillaud destructa. Omentum sphacelo erat affectum, vt et hepar, paruum, siccum, granulosum, fere friabile; vena caua sanguine non satis repleta, et vasa maiora vacua. Virus venereum hanc febrem insanabilem reddidit.

N. 5) *Obferuatio de febre putrida verminosa, cum* p.230.
delirio phrenitico, ubi vinum cum bono successu adhibi-
tum est, Auctore Cl. DE LA MAZIERE. Homo,
45 annorum, vino deditus, febre putrida laborans ac furore affectus, a tribus venaesectionibus parum commodi habuit, et a potione cordiali cum Kermes minerale multos eiecit vermes; altero die, magis debilitatus, delirio persistente, ab eodem medicamento paulo fortiori in affectus soporosos incidit. Vesicatoria profuerunt, tandem aegro reliqua repudiante vinum concessit; adhibitum deinde vomitorium vermes expulit et crebra purgantia febrem, relicto delirio, quo, per magnam narium haemorrhagiam sedato, ipse in somnum incidit. Ab emetico denique materiam biliosam reiecit et plane ad se rediit; tandem continuato purgantium vsu sensim conualuit.

N. 7) *Obferuatio de infante monstroso, Auctore* p.244.
Cl. IUVET. Hic vix dimidiam nouimestris magnitudinem habuit, eique defuerunt brachium dextrum cum scapula, partesque continentes pectoris et abdominis istius lateris, quasi sternum a musculis colli et clauicula vsque ad imam lumborum partem sectione remotum fuisset. Spina dorsi integra fuit, caput bene formatum faciesque formosa, sed loco

partium ossæarum verticis aderat ligamentum cutaneum, membranofum, carnosum, vasculosum, quod tanquam funiculus umbilicalis, qui defecit, in centrum placentæ inferebatur.

p.249. N. 8) *Observatio de contractione maxillæ, a medela morbi venerei orta*, Auctore Cl. HAZON. Spatium inter vtramque maxillam tam paruum fuit, vt aegra non nisi fluida sumere posset. Lingua enim ab vlceribus tumida, et muscoli maxillæ inferioris inflammati et exulcerati erant, quibus tamen cataplasmatibus emollitis, motus maxillæ sensim restitutus est.

p.275. N. 12) *Observatio de vitio conformationis peculiari*, Auctore Cl. DESSAIX. Recens nati manus ita formatae fuerunt, vt duabus massis carnofis similes essent, aequali longitudine, et ad extremitatem vngue difformi instructæ. Levis quidem motus aderat primæ phalangæ ad metacarpum connexæ, sed reliquæ phalangæ cum prima vnum os constituebant. Ad locum pollicis destinatum levis sulcus fuit, quem scalpello recto incidit, vsque ad extremitatem fere ossæam, vt pollicem formaret Cl. Auctor, et ex reliqua massa tres alios digitos fecit, quorum singulus vngue difformi ornabatur. Quibus quatuor digitis, post mensem bene sanatis, infans aliquo modo vti poterat, cum ad metacarpum liberi moueri possent.

In mense Aprili 1761.

p.299. N. 2) *Epistola Cl. DARLUC, de usu alcali volatilis in rabie*. Puer, duodecim annorum vigesimo die post morsum canis rabidi, tristis fiebat et anxius, cum voce rauca, pulsu duro, inaequali, halitu feruido, vulnus faciei callosum valde doluit, sensit auersionem ciborum, et obtusum pharingis dolorem, si biberet, minime tamen hydrophobiam. Illinito vul-

vulnere et collo dolente opiatīs et camphora, singulis duabus horis sumsit aliquot guttas aquae Luceiae (*Eau de Luce*), omniaque symptomata mitigabantur. Ipseque vulneris callus, scarifatus et mercurialibus frictus, post viginti dies sanatus est.

N. 3) *Observatio de hydrophobia spontanea*, Auctore Cl. BRIEU, fil. p.315.

Miles dolore capitis fixo diu vexatus, subito insultus epilepticos insignes sustinuit, tandem in hydrophobiam incidit, omnia alimenta respuit, et vigesimo die mortuus est. Cadaueris cranium parum cohaesit cum dura matre, quae septem ostendit excrescentias scirrhosas, scalpello vix discindendas, quarum duae, pisi magnitudine, ad sinum longitudinalem superiorem sedebant, duae minores supra futuram coronalem, et tres minimae ad ossis frontis impressionem. In cranio parvae cavitates, his respondentes aderant. E sinu longitudinali sanguis niger, spissus, ex meningibus et ventriculis superioribus magna feri copia emanauit.

N. 4) *Observatio de bono effectu cicutae*, Auctore Cl. DESMILLEVILLE. p.322.

Huius extractum, quotidie ad viginti grana externe et interne adhibitum, intra duos menses tumorem carcinomaticum palpebrae superioris depulit.

N. 6) *Observatio de effectu Rapuntii vrentis soloniensis*, Auctore Cl. BONTE. p.350.

Huius infusum, in febris intermittente a rusticis fortuito sumtum, vomitum deiectionesque effecit, saepe tamen colicam, anxietatem, adeoque conuulsiones. Igitur non nisi prudenter adhibitum iuuare videtur.

N. 7) *Observatio de phthisi renali, et duobus* p.352.

ulceribus carcinomaticis magnis, in corpore vesicae, mictui cruento superuenientibus, Auctore Cl. LANEUTE. Miles mictum cruentum spiritu therēbinthinae coercere tentabat, sed ulceribus inde obortis, nimia suppuratione maxime confectus et accedente

febre putrida mortuus est. Cuius sectio ostendit, latus dextrum abdominis et pectoris pure repletum, et diaphragma fissum, lobum hepatis magnum exulceratum, paruum, ut et renem dextrum scirrhosum, sinistrum, ut morbi sedem, pure plenum; pelvis cavitatis pus flosum continuit, in vesicae fundo duo ulcera carcinomatica erant, quorum diameter pollicem aequabat. In thorace pleura a costis separata et ulcerata, pulmonis dextri lobus ulceratus, sinister pulmo pluribus maculis nigris obsitus erat, et cor in magna copia liquoris pericardii natabat.

P. 358. N. 8) *Observatio, de cadauere hominis subito demortui*, Auctore Cl. TITREUX. Venter maxime tumidus erat, intestina inflammata et colon summo-pere distentum. Caudum abdominis, remotis intestinis, ostendit superficiem eleuatam, membranaceam, pinguedine refertam, quae omnes regiones anteriores dextras abdominis, occupabat, posterius adhaerens membranae adiposae renis dextri. Erat massa pinguis cum portionibus membranaceis compactis commista, in quarum crassitie orificium plurimum vasorum conspiciebatur, quae in fundo huius cavitatis aperiebantur, et ad aliud progrediebantur corpus membranaceo cartilaginofum, septum huius cavitatis constituens. Tota haec cavitatis libera erat, intestinis imposita, globulosa, compacta, interius alba et in duas cameras diuisa. Septum vero perfodit ductus, cuius orificium vtrumque quasi sphincterem sistit, per quem aqua limpida flaua ex vna in alteram defluit cameram. Ipsum septum varia continet corpora dura, nigra, splendida.

P. 365. N. 9) *Observatio de maxima hernia ventrali cum grauiditate coniuncta*, Auctore Cl. THIBAUT. Huic feminae tempore dolorum partus pannos gradatim super annulos abdominis posuit, eosque vola manu teneri

teneri iussit, atque sic feminam a gemellis felici partu liberavit.

N. 10) *Observatio de exstirpatione tumoris, super p.369.*
mammam dextram siti, Auctore Cl. GUYARD.
 Quem aegra ad duodecim annos a magnitudine phaseoli portarat tumorem, idem nunc capitis infantis magnitudinem habuit, ex multis glandulis conglobatis compositus et basi angustiori erat. Hunc in basi fortiter ligavit Cl. Auctor, integumenta scalpello recto longitudinaliter incidit, tumorem vndique soluit et aegra paulo post conualuit. Tumor, pondere duarum librarum cum semisse, in medio materiam duram nucis iuglandis magnitudine continuit.

In mense Maio 1761.

N. 2) *De subitanea morte a nimia obesitate,* Au- p.401.
 ctore Cl. GODART. Quinquagenarius saepe ab asthma vexatus, per annum vsque tussi cum sputo cruento laboravit, tandem subito asthma succubuit. Cadaueris pericardium et mediastinum pinguedine onustum reperiiebatur, thoracis cavitates ac pericardium aqua repletum, pulmones autem, cor et trunci vasorum plane integri erant, ut sola pinguedo comprimendis pulmonibus, mortem effecisse, appareret.

N. 3) *Observatio de venae sectione et emeticis saepe p.411.*
cum successu in morbis acutis grauidarum repetitis, Auctore Cl. DE LA MAZIERE. Grauidae, in septimo mense vera pleuritide affectae, quinquies vena secta est, cui, persistente pulsu duro, Cl. Auctor decem uncias sanguinis sexto die e vena duxit, idemque versus vesperam repetiit. Altero die, sumto mannato, aegra conualuit et nono mense peracto felicem partum habuit. Alia grauida in sexto vel septimo mense synocho laboravit. Sumto sale de Seignette per quatuor dies tranquilla fuit. Deinde

maxime debilitata potionem cordialem cum Kermes minerale cum successu sumsit, paulo post quatuor grana tartari emetici et altero die purgans vermes expulerunt; tertio tandem die, repetito emetico, conualuit.

P.435. N. 5) *Observatio de paracenthesi, centies quadragesies ter trium annorum spatio instituta*, Auctore Cl. DUPONT HAUMONT. Femina, 43 annorum post febrem intermittentem in hydropem ascitem incidit, et in quatuor primis operationibus aquam, in reliquis, quarum spatium intermedium vix octo vel nouem dies erat, sanguinem, certe aquam sanguine mistam emisit, neque tamen post 143 paracentheses magis debilitata est, quam post primam. Menstrua nunc restituta sunt, et solus lien nimis magnus esse videtur.

P.440. N. 6) *Historia feminae, quae foetum ad viginti nouem menses in utero gessit*, Auctore Cl. DE LA VERGNE. Haec in septimo mense grauiditatis vomitu correpta, ab imprudenti obstetrice ad labores partus stimulata, quamquam os vteri non apertum erat, maxime debilitata est, et deinde multum aquae ex utero effluxit. Amissa tandem grauiditatis spe, cum detumescente ventre, post viginti duos menses a vehementi motu subito in hypochondrio sinistro maximos dolores, per duodecim dies effluxum foetidum, et in regione umbilicali tumorem pisi magnitudine percepit, quo tandem aperto, ossa extremitatum et cranii foetus eduxit. Natura deinde perpetuo sibi elegit hanc viam ad euacuanda menstrua huius feminae de reliquo sanae.

P.443. N. 7) *De medela vulneris gladii, pectus perforantis*, Auctore Cl. ALLARD. Vulnus inter quintam et sextam costam veram, pollicem a sternone et semipollicem a spina dorsii ad angulum inferiorem scapulae pulmonem transiit. Aeger quidem multum

tum sanguinis expuit, postea tamen libere respiravit, vicinia vulneris parum emphysematica erant, et ipse intra viginti duos dies, ope lactis et balsami peruvianiani sanatus est.

N. 8) *Observatio fracturae complicatae humeri ad p.446.*
articulum cubiti, Auctore Cl. MUTEAU DE ROQUEMONT. Septuagenaria paralytica et cancro mammae occulto affecta, humerum prope cubiti articulum fregit. Applicata accessit inflammatio cubiti maximique dolores. Attamen styrax cum aqua vitae camphorata intra 40 dies motum cubiti restituerunt.

In mense Iunio, 1761.

N. 2) *De hydrope, curata insultu apoplectico p.499.*
Auctore Cl. GODART. Asthmatica, pectoris obstructione laborabat, cum faciei, pedum et manuum oedemate, postremo in anasarcam incidit. Accessit deinde lipothymia cum stupore, paralyti brachii et cruris, et oris distorsione. Sumta mixtura cardiaca urinam turbidam copiose emisit, sensimque oedema disparuit, regrediente sensu et motu membrorum.

N. 3) *Observatio de delirio phrenitico et clauo hysterico, p.504.*
Auctore Cl. DEBAUX. Vir vino deditus, a febre vehementi corripitur, cum insigni capitis dolore, calore ardente et maxima siti, pulsu duro, tendinum subsultu, convulsionibus, singultu, nausea, vomitu et alui obstructione. Haec febris per quatuor dies durabat, sed post tres venaesectiones quinto die remisit, convulsionibus autem et delirium phreniticum tunc maximum fuit. E vena iugulari libra vna semis sanguinis missa est, singulis quaternis diebus octo clysmata aquae frigidae applicabantur, et capiti tonso vesica, aqua frigida repleta, cum fructu imponebatur, tandem balneo frigido ad horam vnam semis immixtus aeger, in lecto sudavit cum

somno reficiente et post decem dies plane conuuluit. Femina clauo hysterico affecta per vesicam aqua frigida plenam et capiti impositam atque per clysmata frigida sanata est.

p.509. N. 4) Epistola Cl. MAUPOINT, in qua effectus cicutae praedicat. In scirrho enim ac carcinomate labii oris adhibuit extractum cicutae eiusque dosin quotidie ad 4 grana, vsque ad drachmam vnam semis, auxit, et sic intra duos menses aegrum plane curauit.

p.547. N. 7) *Descriptio partus laboriosi infantis praeternaturalis*, Auctore Cl. LANDEUTTE. Fuit puella, cassida induta, quae, cum nates primo ostenderet et pedibus educeretur, subito ad caput retinebatur atque post varios demum labores nata est. A matre per decem menses in vtero gesta est, quae, praeter hunc foetum simul hydrope laborat. Cassida, qua caput ornabatur, alba erat, solida, dura, cassidae figuram exacte sistens, et ad dorsum late descendens, in medio autem quasi in duos lobos diuisa, vnde crista proficiscebatur.

IX.

PHILIPPI CONRADI FABRICII, Med.D. Sereniss. Duc. Brunsvic. et Lüneburg. a Consiliis Aulicis. Med. P. P. in Acad. Iul. Carol. Primarii Societat. Med. Helmstad. Praesidis, Acad. Caesar. Nat. Curios. Collegae. Enumeratio methodica plantarum horti medici Helmstadiensis, subiuncta stirpium rariorum nondum satis extricatorum descriptione. Editio secunda auctior. Helmstadii litteris Ioh. Drimbornii 1763. 8. Alph. I pl. 6 cum dimidia.

Euul-

Euulgauit Cl. Auctor ante quatuor hos annos enumerationem methodicam plantarum horti medici Helmstadiensis, quae et supra a nobis commemorata fuit *). Prodiit iam idem liber variis nouis obseruationibus auctus et locupletatus, qui de indefesso Auctoris in rem herbariam studio vbique testatur. Nouas plantas, quae post primam editionem hortum helmstadiensem ornauerunt, suo loco posuit, omnibus vero, inprimis arboribus exoticis, synonyma eorum Auctorum adiecit, qui icones electas habent. Quantum discrepantia Linnaeanae methodi ab Heisteriana permittit, eas plantarum denominationes, quas LINNAEI species, vel eius systematis Naturae editio decima sistit, apposuit. Solum natale plantarum ex LINNAEO sumsit, et nomina germanica, apta ei visa adduxit. Et quamuis nonnullae plantae, in horto suo interea perierunt, earum tamen nomina et synonyma retinuit, quoniam partim, dum ipsa haec editio typum reliquerit, de nouo iterum possidet, partim ad eas recuperandas nullam operam praetermissurus erit. Immutatam in posterum huius plantarum enumerationis formam manere permittit; si quas, vt sperat, ex amicorum beneuolentia nouas plantas acquireret, nec obseruationes, quas cum vegetabilibus porro instituet, supplementorum titulo publici iuris faciet. Indicem Auctorum de re botanica clarorum, quos in bibliotheca sua asseruat, simul enarrat. Eas ergo obseruationes, quibus Cl. Auctor nouam hanc editionem emendauit, nunc indicemus.

Kaempferiam foliis ouatis sessilibus describit, cui calix nullus, quamuis in horto Cliffortiano et apud RUMPHIUM aliquis depictus sit, sed flos ex spatha erumpit, ita vt ex eadem spatha omnibus tribus vel qua-

p. 167

*) vid. Comment. Nostr. Vol. VIII. Part. II. p. 283.

quatuor diebus noua prodeat corolla, priori perfectior, quae postquam vix per diem durauit marcescit. Reliqua huius plantae descriptio, cum Linnaeana aliorumque conuenit.

- P. 23. Plantam radice bulbosa recenset, quam Cl. HEISTERUS ex capite bonae spei olim accepit. Haec an. 1760 per tres menses in hypocausto egregie floruit, et semina matura tulit, quae terrae mandata progerminauerunt, planta vero ipsa ex bulbo mense Ianuarii 1763 vegetum iterum scapum protrusit. Quoad radicem conuenit cum Hyacintho stellato Peruanio CLUSII, quoad floris vero figuram et structuram, nouum genus ex Aloe et Hyacintho compositum, efficere Cl. Auctor autumat. Iconem ei similem apud nullum Auctorem se inuenisse testatur. Radix scilicet bulbosa, solida, fusco violacea, multas e basi emittit fibras. Folia summe viridia, undulata, medio sulcata, summitate repanda, vnum cum dimidio pedem longa, et tres digitos transuersos lata, in scapo ultra duos pedes longo, cylindrico angulato, viridi, multisque paruis maculis obsolete puniceis variegato sedem occupant. In spica, infimae corollae primo ad perfectionem perueniunt, deinde quae proxime superiores. Corollae cuiuslibet longitudo trium digitorum transuersorum, medio gibbae, summitate amplioris, et dimidium transuersi digiti minoris aequantis, deorsum pendulae, et folio florali tantum stipatae. Color eleganter variegatus ex multo pallide roseo, pauco viridi et albo. Inferioris corollae limbus in octo lacinias ouato obtusas diuiditur, quibus octo filamenta alba subulata intus adhaerent. Antherae paruae erectae nutantes basi bifidae. In fundo corollae haeret germen ouato oblongum octangulare viride, prout in Colchico obseruatur. Stilus albus subulatus, longitudine staminum. Stigma obtusum inaequale. Quando germen

germen ad maturitatem peruenit, quadriloculare fit. et multa ouata cylindrica vno extremo magis globosa in se continet semina. Vnius vero eiusdemque florum spicae, corollae superiores pleraeque paullulum discrepant, non solum enim angustiores sunt, sed quoque limbum sexfidum tantum habent, ratione sexus, ad hecandrias monogynias LINNAEI pertinent, et germine triloculari gaudent. Nullus in floribus obseruatur odor. Corollae quando exarescere incipiunt, se claudunt, et germen magis, magisque intumescens in se continent. Capsulae feminales maturae magnae inflatae triales, et triloculares, quauis ala ex duabus valuis constantes, semen vnicum vtplurimum nigricans includunt, quod valuis sponte hiantibus, firmiter annexum manet.

Callam foliis cordatis, spatha plana, vndique p. 41.
hermaphrodito recenset, quae cum Calla aethiopica multam quidem analogiam habet, sed folia minus longa, spatha alba, minor vero et planior, et in spadice hermaphrodito stigmata obtusa fusca.

In Polygono floribus octandris tryginis racemo- p. 46.
sis, quod Fagopyrum orientale ramosum et multiflorum Persicariae folio est, ope microscopii inter corollam et germen, octo nectaria granulata, lutea inuenit.

In Plumbaginis calice plures glandulas nitidas p. 49.
petiolatas detexit.

Limonium orientale plantaginis folio corollam p. 53.
habet, cuius petala basi tantum alba sunt, limbus vero e purpureo violaceus. Quapropter a descriptione et icone AMMANNI et GMELINI aliquantum discrepat.

In Sideritide salviae vel lauendulae folio flore p. 92.
albo HEISTERI, obseruauit, plenos interdum occurrere flosculos, reliquis intermixtos. Filamentorum scilicet loco et styli adsunt quatuor vel quin-

quinque. Lacinae corollae interiores et minores, cochleatae, lacerae, quibus antherae lateraliter adhaerent. Quod vnicum in labiatis exemplum esse monet.

p. 98. Polymorpha HEISTERI, quae plerumque absque corolla conspicua perfecta et matura foecunda semina copiose fert, an. 1759 flores coeruleos satis magnos, cum Icone et descriptione Dilleniana convenientes exhibuit.

p. 194. Nouam Amaranthi speciem describit, cuius altitudo vix pedem assequitur. Caules procumbentes, rubentes. Folia alterna bliti vel maioranae. Flosculi ad alas foliorum conglomerati, albi, pentapetali, petalis ovatis, medio linea longitudinali inscriptis, patulis. Masculi minores, marcescentes, tribus albis filamentis et antheris praediti. Stili femininorum tres. Germen ovatum.

p. 210. Peloriam LINNAEI, varietatem tantum Linariae esse, in prima editione Cl. Auctor monuit. Hoc suum assertum nunc ex eo probat, quod in iisdem saepe caulibus et ramis eiusdem plantae plures flores sint Linariae, vnus tantum et alter Peloriae, quintuplici appendice, calcaris instar, seu nectario praeditus. Immo ex iis floribus, qui vere characterem Linariae exprimunt, quidam non raro duplici calcare sunt instructi.

p. 282. Napaea dioica LINNAEI, simplicem florem conglomeratum ostendit. Conuenit reliquum cum LINNAEI descriptione, hac cum differentia, quod inter plures flores tantum masculos, in eodem exemplari flos vnus et alter occurrerit, octo stilibus albis, distinctis, supra stamina multum eminentibus, praeditus, qui vero aequae parum ac reliqui adhuc semina tulerunt. An. 1759 omnes fere flores hermaphroditici erant, sed antherae steriles, marcidae.

In Vrticae specie obseruauit Cl. Auctor per plu. p. 366. res annos, masculos tantum flores. An. 1762 vero in eadem planta tam masculi, tam feminei flores apparuerunt, semina perfecta producentes.

Inter arbores vnam Oleae speciem syluestrem p. 387. Elaeagrum dictam describit, in qua tantam florum inconstantiam obseruauit, vt in nulla alia planta talem se vidisse testetur. Non solum enim in eadem arbore, sed etiam in eodem ramo, modo quadrifidos, modo quinquefidos, sexfidos, octofidos inuenit flores, et stamina modo 4, modo 5, 6, 7, 8. In fundo floris nectarium globosum, apice quadrifidum, basin stili amplectitur.

Nomina generica a Cl. HEISTERO plantis imposita, nuper iamiam recensuimus *). Quae ergo in noua hac editione accesserunt plantae, harum nomina Heisteriana nunc enarremus.

- Tulbaghia* pag. 4. Polyanthis species.
- Vffenbachia* — 21. Vuularia fol. perfol. *Linnaei*.
- Gemmingia* — 27. Ixiae species.
- Narcissulus* — 28. Narcisso Lyrium *Suert*.
- Aroides* — 42. Callae species.
- Serpillaria* — 54. Illecebrum fol. verticillatis nudis. *Linn*.
- Scorpiurus* — 75. Heliotropii species.
- Ruyschia* — 102. Dracocephalum.
- Blitoides* — 193. Blitum album *Camer*.
- Nigellastrum* — 273. Nigella.
- Melitoides* — 304. Trifolium peltatum creticum *C. B. Prodr*.
- Coluteastrum* — 317. Colutea herbacea *Linn*.
- Serrula* — 324. Biserrula. *Linn*.

Acacia

*) vid. l. c. p. 288.

<i>Acacia</i>	pag. 335.	<i>Mimosa. Linn.</i>
<i>Amaranthulus</i>	— 358.	<i>Achyranthes. Linn.</i>
<i>Burcardia</i>	— 386.	<i>Callicarpa. Linn.</i>
<i>Ambraria</i>	— 435.	<i>Anthospermum.</i>

X.

A Dissertation on the Use of Sea Water in the Diseases of the Glands. Particularly the Scurvy, Jaundice, Kings-Evil, Leprosy and the glandular Consumption. Translated from the Latin of RICHARD RUSSEL, M. D. To which is added a Translation of Dr. SPEEDS Commentary on Sea Water. As also an Account of the Nature, Properties and Uses of all the remarkable Mineral Waters in Great Britain. By an eminent Physician. The fourth Edition, revised and corrected. London Printed for *W. Owen*, 1760. 8. pl. 15. tab. aen. 1.

h. e.

RICHARDI RUSSEL, M. D. Dissertatio de usu aquae marinae in morbis glandularum, praecipue in scorbuto, ictero, scrophula, lepra et tabe glandulari, translata ex latino sermone in Anglicum. Cui addita est traductio Doctoris SPEED Commentarii de aqua marina. Accedit Tractatus de natura, proprietatibus et usu praecipuarum aquarum mineralium Magnae Britanniae. Auctore quodam Medico excellente.

In hoc libello tria continentur opuscula. Primum facit Cl. RUSSEL. *Dissertatio de Tabe glandulari,*
quae

quae 1750 e theatro Sheldoniano prodiit, e latino sermone in anglicum translata. Huius recensio- nem in nostris iam dedimus *supplementis* *), ad quae B. L. ablegamus. Alterum est Cl. SPEED *Commen-* p.145.
tarius de aqua marina itidem ex latino in anglicum sermonem traductus, cuius latinum exemplar non- dum vidimus.

Tria praemittit Cl. Auctor experimenta, quibus naturam aquae marinae exponere, eiusque partes constituentes detegere contendit. Sumsit scilicet aquam non solum diuersis littoribus, sed etiam diuerso fluxus nempe et refluxus tempore haustam, quam euaporationi lentae exposuit, et materiam remanen- tem non diuersam, nisi ad pondus, quod in aqua, tempore refluxus hausta, decem granis minus fuit, inuenit. Color huius materiae est albidus, flauescens, sapor vero subamarus, salinus. Massa autem ipsa constat ex sale et terra sabulosa, quae quam diu adhuc mixta est, impedit confectionem salis in crystallos. Ex residuo liquore flauescente, quem quondam Cl. HOFFMANNUS lixiuium salis adpellauit, more de- bito tractato, parantur crystallos prismaticae, quae de- nuo solutae, in crystallos redactae, praebent, se- cundum Cl. Auctorem, salem catharticum, *Epsom* dictum, quem additione alius adhuc salis parari Cel. HOFFMANNUS adfirmavit. Adfert etiam Cl. Au- p.148.
tor in nota textui adiecta, se in salinis, ad *Nouum- Castellum* (*Newcastle*) sitis, percepisse, salem ammo- niacum posse parari ex partibus tribus vrinae, et parte vna lixiuii salis bene mixtis, et in ahenis plum- beo per 48 horas seruatis, donec fermentent: quo facto massa mixta ad siccitatem euaporatur, et lege artis igne eleuatur, seu, vt chemici loquuntur, su- blimatur. Praeter ea asserit, aquam marinam com- poni

*) vid Decad. primae Supplement. II. p. 245.

poni ex sale communi, qui siccet et obstruat potius corpora; et ex sale amaro, qui diuretica et cathartica gaudeat indole, hinc obstructions referat. Ex ultimo enim hoc sale, quem abundare in aqua marina censet, huius virtutem non solum purgandi per aluum et vrinam, sed etiam soluendi obstructions deriuat. Interim cautos esse omnes monet in usu aquae marinae, praecipue eos, qui calidae sunt naturae. Securius autem hanc possunt bibere ii, qui phlegmaticae, ut aiunt, sunt constitutionis. His roborat ventriculum, eique restituit suum calorem, amissamque reddit appetentiam. Praeterea taxat Cl. Auctor eos medicos, qui omnes aegrotos, quibus usum aquae marinae siue externum, siue internum, praescribunt, sine discrimine purgant, quum aqua marina, ob sale suum amarum, iam vi purgante gaudeat: quae reprehensio etiam illos ex nostris medicis attentos cautosque reddere deberet, qui omnibus suis aegrotis, quos ad aquas medicatas destinant, indistincte alui purgationes exhibent.

Balneorum quoque vis, ex aqua marina paratorum, multum augetur ab illo sale amaro cathartico, quo balnea saturata sunt, et quem Cel. FLOYER verum nitrum veterum fuisse censet.

p.156. Sequitur nunc catalogus morborum, in quibus aquae marinae usus tam internus, quam externus salutaris fuit. In horum numero praecipui sunt scrophula, scorbutus, paralysis, epilepsia, scabies, lepra sicca, rheumatismus, morsus canis rabidi et calculus. Hac occasione Cl. Auctor ipse fatetur, usum marinae aquae in memoratis morbis non esse inuentionem recentiorum medicorum, sed eum priscis medicis iam notum fuisse, quod locis quibusdam ex veteribus allatis, probat medicis scriptoribus. Quemadmodum et hoc monet, aquam mari-
nam

nam minime esse considerandam tanquam remedium vniuersale, quod panaceam vulgo vocant, sed omnino opus esse, vt bene ante inquiratur in naturam morbi atque aegroti, quam praescribatur. De reliquo vsui externo aquae marinae, seu balneis, ex hac paratis, plus tribuit, quam vsui interno: quare, si in quibusdam morbis opus, vt corpus purgetur, Cl. Auctoris parum interest, vtrum hoc aqua marina efficiatur, an alio apto remedio purgante. De libello Cl. RUSSEL, quem de aqua marina edidit, iudicat, illum nimis attribuisse in quibusdam morbis vsui interno aquae marinae, quum plus eum effecisse credit reliquis remediis, inter vsum aquae marinae adhibitis, quam vsu ipso interno huius aquae. Hinc durante cura, cum aqua marina instituenda, ab omnibus aliis medicamentis, si morbus fert, potius abstinet, vt eo certior fiat in cognitione sua, num aliquid, an parum, vel nihil in hoc vel illo morbo aqua marina effecerit? in quo Cl. Auctori libenter assentimur.

Hunc commentarium excipit vltimum opusculum de natura, proprietatibus et vsu medico aquarum mineralium, in diuersis locis Magnae Britanniae profilientium. Est autem totus libellus nil aliud quam catalogus, vel potius nomenclator octoginta et septem diuersorum fontium medicatorum, quorum plurima ne quidem nomina ad nostras peruenere aures. Quilibet, qui numerum aquarum paucis his pagellis pertractatarum perpendit, ipse facile iudicare poterit, Cl. Auctorem parum dicere potuisse. Hoc tamen ab eo expectauimus, vt nobis saltem notissimos indicaret auctores, qui de hac vel illa aqua, quam persequitur, scripserunt: sed vix vnum vel alterum horum scriptorum apud Nostrum legitur nomen, quum tamen Magna Britannia, vt

ex nostris ipsis patet *Commentariis*, excellentissimos habuit aquarum mineralium scrutatores.

His praemissis, ex copioso illo numero aquarum medicatarum eas tantum eligemus, quae in terris nostris notae atque auditaе fuere, reliquas tanquam obscuras praetereunt.

Prima et celebratissima est aqua *Bristolienfis*. Ad tepidas haec pertinet aquas: omnique caret odore, albido tamen gaudet colore, qui eadem perit proportionē, qua aqua defrigescit. Congius Anglicus huius aquae ad vulgarem modum, igne scilicet aperto, euaporatae continet 34 grana; in vase vitreo autem, quod *retortam* vulgo vocant, 36 grana materiae, ex sale et terra calcaria compositae. Sal rite separatus neutrius videtur naturae: cum acidis enim non efferuescit; terra vero contra cum iisdem fermentat, et coctione fit calx. Ratio terrae contentae ad saleм fuit in quibusdam experimentis vt 15 ad 11; in aliis vt 13 ad 11.

p.180. Aqua *Bristolienfis* specificē, vt aiunt, leuior est aqua *Bathonienfi*, hinc etiam virtute differt. *Bathonienfis* enim attenuat, soluit et laxat. *Bristolienfis* vero humores spissat, et fibras stringit. Transuehi potest ad alia loca, virtus eius tamen ef-

p.185. ficacior est ad fontem ipsum. Ad mentem recentissimorum scriptorum continet aqua *Bristolienfis*, praeter aquam communem, spiritum volatileм, acidum vitriolicum, acidum salis marini, saleм neutrum et terram absorbentem.

p.186. Transit Cl. Auctor ad aquam *Bathoniensem*, quae pariter ad calidos pertinet fontes. Postquam quaedam de causa caloris fontium calidorum protulit, de odore aquae *Bathonienfis* monet, quod sit ingratus, sapor vero mollis et lactis instar. Quum aqua *Bathonienfis* solutum in spiritu nitri argentum plus praecipitat, quam sal petrae, plurimi inde concludunt, saleм

salem marinum aquae inesse. Aliae praeterea experientiae probant, principium vitriolicum contineri in aqua, siquidem et purpureus et nigricans color, ex admistione gallarum, ferrum non excludit. Olim communis fuit sententia, aquam *Bathoniensem* argenti nitorem mutare in aureum colorem, quod sulphuris contenti esset indicium, sed fraudem fuisse, post haec ostensum fuit.

Ex plurimis experientiis collectis apparere con- p.193.
tendit Cl. Auctor, aquam *Bathoniensem* componi ex terra calcaria, margacea, et ochra, ex sale marino, pauco sale calcario nitroso, spiritu, seu *Gas* vitrioli, pauco bitumine et perpauco sulphure *).

Quod ad virtutem aquarum *Bathoniensium*, earumque praesertim usum externum et internum attinet, Noster asserit, balneas *Bathonienses* calefacere, siccare, attenuare, soluere et roborare, hinc singularem effectum edere in morbis frigidis et humidis, easdem autem aquas interne sumtas aluum laxare, urinam atque sudorem ciere, inde salutare esse in omnibus morbis, qui ex imminutis secretionibus oriuntur: noxias autem euadere in corporibus siccis, et ubi motus humorum inordinatus, atque nimis celer est, vno verbo, ubi morbos febricula comitatur.

Limus aquarum *Bathoniensium* etiam in usum vo- p.201.
catur, miscetur enim cum earum spuma, aut herbis conuenientibus, et pultis instar parti laesae applicatur.

Praetermittimus fontes *Buxtonienses* et balneas *Matlock*, in prouincia *Derbyshire*, fontes *Tunbridge* in *Kent*, et transimus ad aquas *Epsom*, in

V v 3

pro-

*) Sulphur aquis *Bathoniensibus* inesse grauissimis ex argumentis negat Cl. LUCAS in *Essay of Waters*.
Vid. Comment. Nostr. Supplement. l. p. 32.

p. 217. *prouincia Surry* profluentes. Aqua haec ad fontem limpida et sine omni odore reperitur: sed seruata in vasis bene clausis, tempore aestatis, post aliquot hebdomadas foetere incipit et nauseosum amarum, cum falsugine quadam coniunctum, acquirit saporem. Quando recens cum sapone miscetur, eum coagulat, cum sale tartari vero et spiritu salis ammoniaci grumofum nanciscitur sedimentum: cum oleo vitrioli et spiritu salis parum fermentat, cum aequali quantitate lactis cocta hoc, vt saponem, coagulat. Congius huius aquae continet vnciam vnā materiae residuae et interdum plus. Haec ex octo partibus salis, et vna parte terrae, secundum Cl. ALLEN, consistit, quam proportionem Cl. RUTTEN reii-
cit, et terrae partem minorem facit.

Cryſtalli inde paratae figuram habent prismati-
cam rectangularem cum quatuor parallelogrammis. Sal purgandi possidet qualitatem, vncia enim semis in aqua fontana, vel alia medicata solutus, vt aliud purgans medicamentum operatur. Pars terrea re-
sidua cum aceto vini vix, cum oleo vitrioli parum, et cum spiritu salis fortiter fermentat, hinc absor-
bentibus adnumeratur a Cl. Auctore.

Nomen et fama, quam ille sal sibi acquisiuit, ef-
fecit, vt imitando effectus fuerit, et licet fraus post
haec detecta fuerit, nihilominus is sal in numerum
medicamentorum purgantium, sub nomine salis ca-
thartici amari, a pharmacopolis receptus est, quia
a vero sale, quod ad effectum et virtutem attinet,
parum vel nihil differt. Paratur enim ex residuo
amaro lixiuio, quod post coctionem et confectio-
nem salis communis restat. Quum reliquarum,
quae supersunt, aquarum medicatarum enumeratio
nihil memorabile continet, earumque nomina in
nostris oris prorsus incognita sunt, harum vltiore re-
censione supersedemus, lectoresque ad ipsum Cl. Au-
ctorem ablegamus.

XI.

10. BAPTISTAE MORGAGNI P. P. P. P. de
 sedibus et causis morborum per anatomen
 indagatis libri quinque. Dissectiones, et
 animaduersiones, nunc primum editas com-
 plectuntur prope modum innumeras, medi-
 cis, chirurgis, anatomicis profuturas. Mul-
 tiplex praefixus est index rerum, et nomi-
 num accuratissimus. Tomus primus duos
 priores continens libros pag. 298. Tomus
 secundus tres reliquos continens libros pag.
 452. Praefatio et indices pag. 96. Vene-
 tiis MDCCLXII. Ex typographia Remon-
 diniana.

Inter celeberrimos, praesertim vel nostri aevi ana-
 tomicos, si quis vnquam eluxit, certe MORGAG-
 NUS tantam labore, industria atque doctrina
 partam post se relinquit famam, vt non iisdem, qui-
 bus orbis terrarum, finibus terminetur nominis eius
 gloria. Optumus quisque enim lector ingenii eius
 monumenta tanti aestimat, quam quemlibet am-
 plissimum triumphum. Nec quis tam tardi tamque
 hebetis est ingenii, quin diu multumque legendo,
 facilem disciplinae praebet aurem, si vim istam ner-
 uumque in aduersariis et epistolis MORGAGNI
 nusquam vel inuitus offenderit. Neque haec so-
 lum huius rei praebent testimonium, sed et maius,
 illustriusque multum, opus hoc, cedro vtique di-
 gnum exhibet. In hoc enim perspicacissimus au-
 ctor non tantum tam gnauiter quam ingenuose in
 corporis nostri latebras atque recessus pene-
 trat, sed et ea, quae docta obseruatio docuit, tra-
 dit, subsidiaque subministrat, quibus vitam nostram

a variis cum quibus conflictandum est, valetudinum generibus, quin ipso praemature saepe nimis interitu praemunire conueniat.

- p. 9. Praefationem huic operi Cl. Auctor praemisit, in qua, de variis in BONETTI sepulchreto desiderandis conqueritur; precibus iuuenis cuiusdam eo se dicit esse adductum, ut has VALSALVAE aliorumque, ineditas ante hac observationes, una cum
- p. 13. suis ediderit; causas, quae fecerint, ut ampliora adeo scholia cuius observationi addiderit, exponit; quinque academiis, se ut harum membrum, libris suis, epistolas instar dedicationum praefixisse narrat, et in harum quidem prima dubia utilis dissectionis remouet et cautelas in indagandis causis addit; in secunda utilitatem affirmat ex consensu medicorum, quorum nomina et res gestas indicat; in tertia ad obiectiones, contra utilitatem anatomes practicae, motas respondet, easque diluit; in quarta soluitur quaestio, an melius praestet, morbos rariores, an magis communes secundo scrutari? in quinta praerogatiua indicatur practicae anatomes prae theore-
- p. 15. tica. Praemissis his, ad quatuor indicum recensitionem nunc descendit Cl. Auctor, et quid in singulis inueniatur, docet. Tradit itaque primus argumenta et ordinem; secundus quae in viuis obseruata sunt, ut symptomata, causae, vitae genus etc. tertius, quae in mortuis praeter naturam adfuerunt; quartus, qui omnium vberimus est, memorabilia anatomes eiusdemque historiae, controuersias, monita et obseruata alia.

Priusquam ad ipsius praeclari huius operis recensitionem propius nunc accedamus, opus esse videtur, quin ordinem, quem Cl. Auctor, in ipso conscribendo obseruauerit, quam breuissime fieri id poterit, indicemus.

Totum

Totum igitur opus in duos tomos dispescitur, quorum primus duos priores, secundus tres reliquos libros continet. Omnes hi quinque libri, septuaginta epistolas comprehendunt, in quarum singula primum VALSALVAE aliorumque observata, dein vero propria sua profert, et vtraque prolixis satis eruditissimisque scholiis illustrat. Agit vero *liber primus* de morbis capitis, et quidem Epistola 1) de capitis dolore 2) de apoplexia in uniuersum, et speciatim de ea, quae fit a sanguine. 3) de eadem apoplexia sanguinea; 4) de apoplexia serosa; 5) de apoplexia neque sanguinea, neque serosa; 6) de reliquis affectibus soporosis; 7) de phrenitide, paraphrenitide et delirio; 8) de mania, melancholia, hydrophobia; 9) de epilepsia; 10) de conuulsione, et motibus conuulsivis; 11) de paralyti; 12) de hydrocephalo, et hydrorachitide; 13) de catarrho; et de oculorum affectibus; 14) de aurium et narium affectibus. Et de balbutie. *Liber secundus* morbos thoracis describit, agit itaque epistola; 15) de respiratione laesa a causis potissimum extra thoracem positis, sed et a positis intra pulmones, calculis praesertim; 16) de eadem laesa a thoracis, aut pericardii hydrope; 17) de eadem laesa a cordis, aut aortae intra thoracem aneurismatibus; 18) de eadem itidem laesa; 19) de suffocatione et de tussi; 20) de pectoris, laterum, et dorsi dolore; 21) de eodem; 22) de sputo sanguinis, et de sputis purulentis, empyemate, et phthisi; 23) de palpitatione et dolore cordis; 24) de pulsibus praeter naturam; 25) de lipothymia, et syncope; 26) de morte repentina ex vitio vasorum sanguiferorum potissimum in thorace; 27) de eadem ex vitio cordis. Et de gibbere. *Liber tertius* morbos ventris complectitur, et exponit quidem epistola; 28) de fame praeter naturam. De morte ex inedia. Et

de laesa deglutitione; 29) de singultu. De hominum ruminatione. Et de ventriculi dolore; 30) de vomitu; 31) de alui profluuiis incruentis et cruentis; 32) de alui adstrictione. Et de haemorrhoidibus; 33) de recti intestini prolapsu; 34) de intestinorum dolore; 35) de eodem; 36) de tumore, et dolore hypochondriorum; 37) de ictero. Et de calculis biliosis; 38) de hydrope ascite, tympanite, peritonaei, et de aliis quos faccatos vocitant; 39) de reliquis internis ventris tumoribus; 40) de lumborum dolore; 41) de urinae suppressione; 42) de urinae difficultate, ardore, aliisque eius vitiis; 43) de herniis; 44) de gonorrhoea; 45) de vteri tum descensu, tum, vt mulieres aiunt, ascensu; 46) de veneris impedimentis, et sterilitate in utroque sexu; 47) de menstrui fluxus vitiis. Et de fluore muliebri; 48) de grauiditate falsa. De abortu et de partu infelici. *Liber quartus* agit de morbis ad chirurgiam, aut ad vniuersum corpus spectantibus et quidem epistola; 49) de febribus; 50) de tumoribus; 51) de vulneribus, et ictibus capitis; 52) de iisdem; 53) de vulneribus, et ictibus colli, pectoris, et dorsi; 54) de vulneribus, et ictibus ventris, lumborum, et artuum; 55) de vlceribus, et sphacelo; 56) de ossium fracturis, luxationibus, aliisque vitiis motui officientibus; 57) de arthritide, aliisque artuum doloribus; 58) de lue venerea; 59) de morbis a veneno inductis. *Liber quintus* addenda ad singulos quatuor libros superiores continet, loquitur itaque epistola; 60) de apoplexia; 61) de deliriis, quae sine febre contingunt; 62) de epilepsia, conuulsione, paralyfi; 63) de caecitate, aphonia, angina; 64) de pluribus thoracis morbis; 65) de pleurisque ventris morbis; 66) de morbis potissimum vesicae urinae; 67) de morbis partium genitalium ytriusque sexus, et praesertim muliebris; 68) de fe-

bri.

bribus et de tumoribus; 69) de ictibus, et vulneribus capitis, et thoracis. De iuncturarum vitiis. Et de lue venerea; 70) de promissis in extrema epistola 66. Et simul de quibusdam ventris, et thoracis morbis.

Difficillima sin plane impossibilis res fuit, vel primaria saltem momenta, in quacunque epistola contenta recensere, neque tamen limites, in recensendo nobis praescriptos transgredi voluisse. Veniam itaque nos facile impetraturos, haud dubitamus, si ex quouis priorum quatuor librorum, vnam et alteram tantum epistolam recensendam summus, lectu digniora visa, in eadem contenta lectoribus tradituri.

Epistola igitur secunda apoplexiam describit. p. 10.
Cuius in sanguineam atque serosam non tantum adsumit diuisionem Cl. Auctor, sed et huius distinctionis veritatem et VALSALVAE aliorumque praestantissimorum virorum, et sui ipsius in apertis cadaueribus obseruatis comprobat. In iis enim, quos sanguinea apoplexia extinxerat, sanguinis plus minus notabilem quantitatem, aut intra meninges, aut in ipsos ventriculos effusam, atque hinc inde peculiare in cerebro cauernas formantem Noster vidit, cum in iis, serosa confectis, loco sanguinis serosa colluies cum hydatidibus ex plexu choroide pendentibus conspiceretur. Praeter ea etiam in viro, apoplexia, p. 23.
quae a sanguine est, raptò, in media ferme falce, os inuenit tres transuersos digitos longum, sesquidigitum fere latum, mediocriter et quidem inaequaliter crassum, in ambitu attenuatum, sic, vt in simplex stratum ex parallelis fibris osseis conflatum desinere videretur. In alio, sexagesimo primo aetatis anno, subito demortuo, nec sanguinis, nec ipsius feri quicquam in cerebro effusi, sed vasa saltem adeo disten-

distenta sanguine offendit, ut vel tenuissima maximopere turgentia conspicerentur; id quod coniicere Cl. Auctorem fecit, vel a sola vasorum turgescencia, et cerebri compressione ab hinc oriunda, interdum apoplexiam proficisci. Inter eos, quos serosa confecerat, vnus fuit, cuius cerebrum praedurum, cerebellum autem minus firmum se videndum obtulit; plures vero, in quibus praeter feri, in nobili hac parte collectionem, glandula pituitaria vario modo laesa atque corrupta comparuit.

Quantumuis vero apoplexiam Cl. Auctor in sanguineam et serosam diuiserit, nihilo tamen minus in epistola quinta ingenue fatetur, praeter has nominatas nonnunquam et alias huius valetudinis causas inueniri, quarum eas, quas et VALSALVAM neque minus ipsum dissectiones docuerunt, commemorat. Plurimum nimirum cerebrum pure oblitum vidit.

- P. 39. Mira quadam duritie praeditum idem hoc viscus in
P. 41. muliere, et vasa cerebralia in aliis duobus aere distenta, et paucis saltem sanguine impleta inuenit.

Epistola octaua sermones de mania, melancholia, hydrophobia continet.

- P. 54. Iuuenis robustus, mania captus post horulam peractam, ex quo chirurgus ex medicorum consilio, libram vnā sanguinis ex arteria temporali eduxerat, moritur, non tam ab hoc auxilii genere, quin potius a pugnīs, quos custos, apparatus vulnēri impositum dimouenti impeggerat, et a vinculo, quod idem ille insano insanius aegro, quo coerceret, quam arctissime iniecerat, post vero discesserat. Facies die insequente ex purpureo liuida, et ad nasalum ossium fractorum sedem nigricans, venter turgidus, alicubi ex viridi liuescens; pulmones paulum tumidi; pauca in aspera arteria spuma; multum sanguinis fluidi in vena pulmonari, et valvulae arteriae pul-

pulmonalis iusto duriores conspiciebantur. Vasa utriusque meningis, septi lucidi, et parietum ventriculorum lateralium, multa aqua turbida occupatorum, ab atro sanguine, fluidoque distenta se offerebant. Ex plexus choroidei parte postica plures pendebant hydatides. Non modica utriusque substantiae cerebri durities, cerebelli vero substantia corticalis iusto mollior inueniebatur.

Lanio, quatuordecim iam menses, a philtro, ut p. 55. passus est, stultus, frigoris intensissimi vi periit. Capite aperto, sub pia meninge aqua effusa, cerebrum vero adeo durum conspiciebatur, ut durius a se dissectum, non meminisse Cl. Auctor confiteatur. In superiore posterioreque corporis callosi superficie, loco duorum neruorum longitudinalium, ut LANCISIUS vocabat, sulci duo profundiores reperiiebantur. Fornice itidem duriore propius a basi inciso, per singulas huius basis radices, pelluentes quasi lymphae ductus deprehendebantur, utrinque per tractus medullares, processus nimirum seu neruulos, a basi pinealis glandulae prodeuntes a LANCISIO dictos, pergentes, et lympham continere et nodulis distingui visos, tandemque versus glandulam illam se inflectentes, cui a parte anteriore parua congeries materiae flavae, in grana minuta conformatae adnectebatur.

In muliere quadraginta annorum stulta angina p. 56. demortua, pariter cerebrum praedurum inuentum fuit.

Feminae decem iam annos insanae, nunc thoracis inflammatione confectae capite dissecto, sub tenui meninge aqua, aereis subinde bullis referta comparuit, quas quidem vel et in aliquibus vasculis adeo confertas Cl. Auctor vidit, ut eadem replerent. Cerebri substantia medullaris subfusca, insolitaque praedita fuit duritie. Nerui intra cranium firmiores,

res, minusque humidi inter secandum apparuerunt. Corticalis substantia cerebri satis etiam firma, cerebelli vero mollissima inuenta fuit, licet pedunculi, vicinaque interior cerebelli medulla firmiores conspicerentur.

p. 58. Viri a longo tempore stulti, febris diuturna demum rapti, cerebrum durum, cerebellum contra molle flaccidumque, sub meningibus autem, in ventriculis lateralibus, et inter duas septi, quo dirimuntur, lamellas aqua fuit.

In alio itidem stulto, praeter cerebri duritiem, vel interiores huius particulae, in quibus et fornix, et glandula pinealis strigosa valde et ex fusco subflava, mollissimae comparuerunt.

Quum hydrophobia defunctum nunquam Cl. Auctori, quod aegre admodum fert, diffecare licuerit, quae Cl. MEDIAVIA in duobus, et Cl. IACOBUS DE MACHY in alio obseruarunt, sequentem in modum tradit.

p. 61. Vir ante aliquot menses a cane rabioso morsus, manifesta hydrophobia correptus moritur. Cadaver, licet decima sexta modo a morte hora incidetur, vehementer male olebat, quo graui odore itidem pulmones nigri displicebant. Bilis nigerriima; auricula cordis dextra valde dilatata, sinistra arctissima; in ventriculis tenues polyposae concretiones, quae pariter quasi adiposae in sinibus durae matris deprehendebantur. Vasa quaecunque cerebri sanguine plena. Cerebrum et cerebellum sicca potius, quam humida. Sanguis magis ad concretionem quam dissolutionem pronus.

p. 62. Vir ante mensem a rabioso cane morsus, iam hydrophobus, delirans, clamans, et febricitans in aquam immergitur, ex qua vix exemptus perit. Cadaver post horas demum viginti et quatuor feruentissima aestate foetore non adeo insigni displicebat.

Cor-

Corpus, quandoquidem carnosum appareret et nutritum, facies tamen similis ferme erat eorum, quos tabes consumpsit. Collum liuidum, etiam post effluxum sanguinem. Intestina cum ventriculo aere turgida, vasa autem huius sanguine distenta conspiciebantur. Magna hepatis pars liuida, cystis vero fellea fuscae bilis plenissima. Septum transuersum quodammodo inflammatum. Pulmones a postica parte nigricabant, et tumebant, a resitante, ut Noster putat, sanguine. Sanguis ater. Gulae, quae in thorace infimoque collo sana deprehendebatur, pars suprema et pharynx vniuersa, et larynx, et aspera arteria interiore superficie nigricabant. Vuula parua, lingua crassior, et pharynx ad posteriora nasi foramina, suumque fornicem plena spumae ex flauo virentis conspiciebantur. Vasa meningum sanguine valde distenta, interior autem cerebri substantia vbiuis sanguineis punctis distincta. In lateralibus ventriculis feri rubelli parum.

Senex sexaginta annorum ante tres menses a cane rabido morsus, nullumque hydrophobiae intra hoc tempus signum praebens, nouissime atrocibus minis grauioribusque verberibus excipitur, vnde illico mirum pauorem, cum luminis ipsiusque aquae horrore contrahit, et vigesimo die, permanentibus his symptomatibus, exstinguitur. Intestina aere quam maxime distenta inuenta sunt. Parum in ventriculo humoris crassiusculi, colore cinereo. Bilis pauca. Arteriae iliacae plane inanes, venae contra sanguine adeo fuerunt distentae, ut naturalem diametrum intestini gracilis aequarent. Pulmones cruoris plenissimi, postica sui parte gangraena adfecti. Tres fere in pericardio subflauae aquae vnciae. Parum in corde sanguinis picis nigrae semiliquatae similis. Parum in vena azygos sanguinis, cuius in arteriis carotidibus venisque iugularibus nihil. Ad summum
pha-

p. 63.

pharyngis levis rubor, membrana autem epiglottidem inuestiens crispata conspiciebatur. Vasa quaecunque meningum nigerrimo sanguine plenissima. Nerui optici crassiores, sed laxiores flaccidioresque. In cerebri ventriculis subflauae aquae ad uncias tres.

p.246. Epistola vigesima quarta historiam pulsuum praeternaturalium tradit. In quorum quidem examine ita Cl. Auctor versatur, ut vel maiora tantum eorundem vitia diligentius attendat, reliqua vero minusque memorabilia non tangat, ut ne infinitum inutilemque plane laborem susciperet, omnia, quae pulsuum alterare poterant, vitia examinaturus. Loquitur itaque primo de asphyxia, quam summa pulsuum excipit exilitas; dein intermissionem eorum tangendo de polypis fusius differit, tandemque in summa pulsuum vehementia, exponenda scribendi finem facit.

p.248. In sene igitur, iam tres menses, ex quo crus fregerat, quanto leuiore, tanto pertinaciore febris decumbente absentia pulsus deprehenditur. Interrogatus, an peius se habeat, negat aeger, hocque confirmaturus protinus se erigit et in lectulo confidet, paulo tamen post subito moritur. Cadauere aperto, cranioque remoto, ex huius cauo et ex ventriculis lateralibus non pauca aqua effluxit. Cordis ventriculos, et ex his praecipue dextrum, quin etiam vasa maiora polyposae occuparunt concretiones, quarum alba una atque adeo compacta fuit, ut distrahenti valdopere resisteret.

p.251. Vir consistentis aetatis, ob dolorem tumoremque in hypochondrio dextro, in nosocomium illatus, pulsuque infirmissimo frequentissimoque praeditus, quarta hora, ex quo susceptus fuerat, perquam feueris stomachi doloribus, alioquin iam interdum molestis excruciabatur, qui, licet interm
eua-

evanescerent, aliquot dies post tamen recrudescentes, ipsius cordis regionem corripiebant, neque prius quam cum ipsa vita miserum derelinquentes. In pericardio plurima subflavi coloris aqua fuit. In corde praeternaturaliter magno, foedaque pinguedine inuestito, tres apparuerunt polyposae, ex flavescente quasi muco conflatae concretiones, earundemque quidem maxima in auricula dextra, in ventriculis reliquae.

In sene macilento, enterocoele incarcerata, cum p.252. debili ac paruo, neque tamen intermittente pulsu, demortuo arteria coronaria sinistra, a sua origine ad plurimum digitorum tractum, in os mutata, ipsiusque, quem per anteriorem cordis superficiem demittit, rami pars tres transuersos digitos ossea comparuit. Aortae praeter ea facies interna prope superiorum arteriarum origines, et deinceps, ad diuisionem vsque in iliacas, ob osseas laminas durissimas, saepe inaequalis se obtulit, squamis non paucis osseis ad diuisionem in subclauiam et carotidem dextras, quin in ipsis iliacis et praesertim in splenica praesentibus.

In viro annos sex et triginta nato, pectoris, vt p.253. visum fuit, hydrope cum summa pulsuum debilitate, defuncto, omnes semilunares aortae valvulae in breues et inaequales excrescentias adeo extuberatae inuentae sunt, vt angustior modo via superesset, sanguini egrediundo patula. His detractis, valvularum substantia contracta et deficiens comparens suspicionem, vitium ab erosione fuisse, confirmauit.

Pulsus intermittentes, vt persaepe a sola fla. p.254. tuum coacervatione, a saburra primas vias onerante, et neruis vario modo irritatis proficiscuntur, sic rarissime nascuntur a polypis, etiamsi saepissime, minus tamen recte, ab horum praesentia deriuari soleant. Videntur nimirum Cl. Auctori, plurimi eorum post

mortem demum fieri, idemque propenodum esse, quod sanguini eorum, quos laterum dolor male habet, sub nomine crustae inflammatoriae supernatat.

- p.263. Vehementissimum pulsum in sutore consistentis aetatis, bibace Noster obseruauit. Postquam enim hic, per quatuor iam menses, summam corporis lassitudinem, pulsationem in regione cordis insignem, spirandique haud leuem difficultatem perpessus fuerat, ob eadem mala longe ingrauescentia in nosocomium susceptus fuit, vbi quidem, vt quoduis eorum, sic praesentim tamen pulsatio, a cordis regione ad illam vmbilici vsque, adeo inualuit, vt non tantum tota oculis perciperetur, sed et impostam manum percuteret. Praeter ea tanta etiam omnium reliquarum arteriarum fuit pulsatio, vt vel ad extremos vsque pedum digitos eandem peruenire aeger profiteretur, post quatuor dies mortuus. In cadauere nihil vtique detegere Cl. Auctor potuit, quod vehementem adeo cordis et arteriarum pulsationem excitare potuisset, quare eandem nervis irritatis adscribendam existimat, cum simul et reliqua signa ad horum irritationem spectauerint.

Epistola vigesima sexta de morte repentina ex vitio vasorum sanguiferorum, quae sunt potissimum in thorace.

- p.275. Vir ex lusus pilae lignae merique abusu in dolore vtriusque brachii, cum febris coniunctum incidit, quibus deinde ad supremam sterni partem, tumor, instar furunculi maioris se adsociavit. Hic variis et suppurationem promouentibus emollientibusque, ab imperitis chirurgis tentatus, adeo increuit, vt cum in nosocomium aeger susciperetur, mediocre malum cydonium non modo aequaret, sed vero et ipsum sanguinem exsudaret, quem postridie ruptus

ruptus tam immani copia profudit, vt cum eo quam subitissime ipsa vita efflueret. Cutis, et quae huic subsunt, amplo foramine duos digitos admittente erat pertusa. Arcus aortae paries anterior in magnum aneurysma se expandens summum os sterni, et huic infidentia clauicularum extrema, vna cum ipsis costis partim absumpserat, partim vero carie exeserat. Tunicae arteriae ibidem adeo exesae conspiciabantur, vt earum nihil propemodum superesset, quibus alibi substantia crassa, exsuccam luridamque carnem, punctis albicantibus quibusdam distinctam, facileque in plures quasi membranas, sibi super impositas, et euidenter polyposas diuidendam referens adhaerebat.

Iuuenis robustus, a motu violentiore difficulter spirare solitus inter loquendum moritur ab aneurysmate, vt cadaueris inspectio docuit, trunci aortae, ad pugni magnitudinem dilatato, nouissimeque a dextris disrupto, plenoque polyposis, quasi membranaceis concretionibus. Cor durum valde et in se contractum apparuit.

Idem fatum meretricula duodetriginta annorum **p.276.** experta est, vtpote quae inter scortandum ab aneurysmate aortae in saccum, nucis iuglandis, suo viridi cortice inclusae magnitudinis ac formae, formato et rupto periit.

In sene pingui sexaginta circiter annorum, apo- **p.277.** plexia, vt crediderunt, qui trementem alioquin noverant, subito raptō, aorta supra cor non tantum dilatata osseisque bracteis intus obsita, sed et paruo supra cor spatio, foramine, quod digitum admittebat, initium faciente, tres transuersos digitos per ipsas tunicas adscendente, et in superficie demum exteriorē arteriae, intra pericardium hiantē notata comparuit.

Mulier quinquaginta annos nata, pinguis, sobria, natura tristis, tribus annis, postquam catamenia fluere cessauerant, flatu quodam, ut dixit ad cor eiusque viciniam vexari solita, sana surgit, breui post vero repentina morte furripitur, quam arteriae aortae, ea a sede, unde sinistra carotis egreditur, ad cor usque valde dilatatae, et ob rigidas, durasque osseas lamellas asperae et inaequalis disruptio induxerat.

p.278. Pari fato, ex rupto videlicet, intra pericardium aortae aneurysmate femina, annos plus triginta nata obiit.

In muliere eiusdem aetatis quatuor aneurysmata inuenta sunt, nimirum ventriculi cordis sinistri, maximae aortae partis, subclaviae dextrae, eiusdemque lateris carotidis, quorum quidem illud, in quod ipsa aorta erat dilatata, disruptum viuendi finem imposuerat.

p.282. Mulier a longo tempore phthifica, improuiso moritur. Lobus inferior pulmonis sinistri tribus quatuorue tuberculis, puris plenis obsitus comparuit. Vena sine pari, ob latitudinem cum vena caua facile comparanda, circa medium longitudinis disrupta fuit.

Tres adhuc historias Cl. Auctor in hac epistola profert eorum, quibus aortae aneurysmata nequam rupta repentinam mortem attulerunt. Quod vero haec sola arteriae magnae dilatatio, quin sola etiam ipsius interior inaequalitas tunicarumue durities, id praestare valeant, ut cita mors praeter opinionem ingruat, ex septem sic mortuorum exem-

p.285. plis a Cl. SANTIORINO enumeratis comprobare annititur, siquidem in his, praeter osseas in aorta bracteas, nihil utique inuentum fuit, a quo subita adeo mors repeti potuisset.

In epistola trigesima octaua Cl. Auctor de variis T. II. hydropis generibus loquitur, eaque sequentibus p. 94. exemplis illustrare annititur.

Vir quadraginta et septem annorum, robustus p. 101. ante hac, bilioso temperamento praeditus, post varios feliciter satis superatos morbos hydrope ascite cum anasarca coniuncto corripitur, quo frustra tentatis omnibus, tandem etiam conficitur. In ventre aperto frustra quaedam, a Nostro pro omenti habita ex mucilagine quasi purulenta natabant. Ventricu- p. 103 lus, intestina et mesenterium nigricantia; hepar intus durum, extus totum constans ex tuberculis, lobis nimirum glandulosis euidentissimis, optumeque distinctis, neque tamen mole auctum, lien contra solito maior compactior, incisus nihil plane sanguinis effundens, conspiciebantur.

Virgo viginti annorum post catameniorum flu- p. 105. xum, ante duos iam iam annos retentum sensim in hydropem ascitem incidit, quo diu excruciatam tandem extinguatur. Praeter iecur, tota convexa sui parte, ipsaque anteriore limbo cum diaphragmate cohaerens, durius atque pallidius, lien, peritoneum et intestina hydatidibus obsita; pancreas subdurum, testes tubaeque in utroque latere, una cum alis vesperilionum ita inter se, in informem, tuberosam, non medicam massam coalitae inueniebantur, ut ne quidem internoscere, ne dum seiungere liceret. Vtriusque huius massae superficies lacera, et per se aperta magnum aliquod steatoma disruptum repraesentabat. Fiebat enim ex materia semisiccata febrium referente. Eadem materia, minus tamen soluta, cauum fundi uteri repletum conspiciebatur.

Hydropem peritonaei Cl. Auctor quidem ipse p. 112. non vidit, duas tamen ipsius historias a Cl. MEDIA-
VIA in nosocomio obseruatas, sibi communicatas tradit. Mulieris nimirum, hydrope demortuae

musculis transuersis incisis, plurima foeditissimaque aqua effluxit, a ventris cauitate per peritonaeum seiuncta. Hac edueta, tumor ex duabus tribusue vesicis crassioribus conflatus, et peritonaeo innatus in conspectum prodiit, quem defuncta, alioquin iam, ante quam hydrope corripereetur, percepisse narrauerat.

Alia mulier, quinquaginta annos nata, ante decem iam annos tumores quosdam dispertitos, ad tactum dolentes perceperat, qui quidem in vnum nunc coaluerant, adeo magnum, vt aegrae moriundi necessitatem imponeret. Ventrís integumentis et musculis, ipsoque transuerforum tendine probe separatis, et carni, et tendini eorundem saccus, membranae tenuioris subiectus apparuit, cuius cauum non modo tumorem lunatum, exteriori membranae adhaerentem, verum etiam ad triginta libras aquae putidissimae comprehendebat. Iecur pallens et sub cultro stridens.

p.113. Quod ad causas attinet, quae efficiant, vt hic morbus solis ferme feminis insidiosus sit, atque vix vnquam viros aggrediatur, illas Cl. Auctor non tantum cum Cl. NOKIO et RUDBEKIO in vteri gestatione, sed et in sanguine quouis mense, in inferiores ventris partes confluente, vita sedentaria, debiliori feminarum corporis habitu, thoracibusque strictioribus quaerendas existimat.

p.114. Signa, quibus hoc hydropis genus ab ascite dignoscatur, enumerantur sequentia, 1) lentum tumoris incrementum; 2) naturalis faciei color persistens; 3) vires permanentes; 4) nulla, nisi prope extremum tempus, pedum intumescencia, nulla corporis macies, nulla spirandi difficultas, nulla febris, nullus dolor; 5) nullum a medicamentis aerum narum lenimen, quin potius harum augmentum.

Epistola quinquagesima et nona historias quasdam p.373.
complectitur eorum, quibus vitae finem veneno-
rum adsumptio imposuit.

Mulier quippe ad sexaginta annos nata, quae
pastillos aliquos, ex amygdalis et arsenico, ad ne-
candos mures paratos comederat, post peractam
horam, molesto ventriculi sensu corripitur, quem
vomitiones, deiectiones, deliquia, virium prostra-
tio, et tandem mors ipsa excipiunt. Tota cadaue-
ris posterior facies, ne furis quidem et calcibus ex-
ceptis, fuit nigra. Ventriculi facies interior hinc
inde, inprimis prope antrum pylori, vt et duode-
num erosa, pulmones nigricantes, in quibuscunque
vasis sanguis fluidus et coccineus, et in corde duae
concretiones polyposae comparuerunt.

Paupercula sexaginta circiter annos nata succum p.379.
expressum foliorum oleandri, vino admistum bibit,
qui tribus post hōris, vehementes vomitus, sitim,
pulsus debiles, paruos, subduros, ac post nouem
horas, mortem ipsam accersit. Supinum corpus
nequaquam liuidum, prouum vero a capite ad cal-
cem, violaceo colore suffusum apparuit. Praeter
venas ventriculo, omento, et parti intestinorum,
quae mesenterio proxima est, prospicientes valde
dilatatas, rugasque per fundum ventriculi, prope
antrum pylori longitudinaliter decurrentes, aequo
duriores, nihil ferme in toto cadauere detectum est,
quod veneni effectus aestimari potuisset, vnde Cl. Au-
ctor coniicit, neruos, praecipue eos ventriculi et par-
tium adiacentium ita fuisse irritatos, vt conuulsiones
internas, contractionesque effecerint, mortis de-
mum necessitatem inferentes.

Vir quinquaginta circiter annorum ob melan- p.381.
cholicum delirium in nosocomium illatus, ibidem-
que perfecte fere sanatus, extractum sumpsit helle-
bori nigri, vnde aluus quidem soluta primum fuit,

septima vero circiter hora, ex qua propinatum illud fuerat, vomitus vna cum ventris doloribus ingruerunt, qui quidem calido hausto iusculo sopiti sunt, paulo post vero redierunt, iterumque minui visi sunt, vt lectulum aeger peteret, in quo breui post exanimis inuentus fuit. Ventre aperto, ventriculus et intestina hinc inde inflammata comparuerunt. Lien paulo maior, et sima sui facie colore fuit roseo, totus autem adeo laxus, vt dissecti interiora pene diffluxerint. Cerebrum, cerebellum et medulla oblongata, laxiora.

Quod vero non solum venena ingesta, sed vero et in corpore aliquando sponte genita illud destruant, sequens historia a celebri quodam chirurgo Cl. Auctori enarrata comprobatur. Iuuenis tertiana febre diu maceratus, superuenientibus conuulsionibus moritur. Ventriculus et intestina retracta et subrigida multam aeruginosam bilem continebant, qua scalpellus violaceo colore inficiebatur. Idem scalpellus, eadem bile madens in carnem vnus alteriusque columbi impressus est, vnde vterque tremens et conuulsus periit. Quod pariter fatum expertus gallus est, qui micam panis, cui bilis haec fuerat admista, deuorauerat.

XII.

Actorum Academiae Electoralis Moguntinae scientiarum vtilium, quae Erfordiae est Tomus II. Erfordiae 1761. 8. apud Ioannem Fridericum Weberum. Alph. I. pl. 20. tabb. aen. 9.

Ex his ea tantum, quae ad nos pertinent, commemorare placebit.

1) *Dissertatio de concha sphaerica fluviatili, alata, p. 1.*
ex badio et nigro colore variegata. Auctore Cl. HOFF-
MANN. Concha, quae hic describitur, in cista
aquaria, in quam paruulus riuulus per siphones de-
ducitur, larga in copia reperta fuit. Medium ea
tenet inter sic dictas cymbas marinas et inter bucci-
na, eiusque testa vasculum sistit, ventre globoso-
turgido, oblongo, in extrema parte sinuato, ad la-
tus porrecto, margine integro rotundo, labio eden-
tulo, in mucronem papillarem ex gyris duobus vel
tribus assurgens, tenue, fragile, pellucidum, ob-
scure album, seu ex albo subuiride, striis capillari-
bus longitudinaliter decurrentibus; accessiones an-
nuas indicantibus, exornatum, magnitudine nucis
auellanae. Hanc testam inhabitat animal, cuius
pes primo in conspectum venit, cuius ope animal
non solum in fundo et litore fluminum repit, sed etiam
summis aquis se suspendet et per medias aquas na-
tat. Ad pedis latus cochleae caput absque vlllo di-
scrimine iungitur, quod proboscide, tentaculis et
oculis instructum est. Proboscis ex duobus labiis
prominulis consistit, ad cuius vtrumque latus singula
exeruntur tentacula, antennae seu cornicula alias
dicta, quae inquirendae viae et cibo atque etiam
velorum modo velificationi et natationi animalculi
inferuire, Noster putat. Ad radios cuiusuis tenta-
culi ocelli apparent, quae veluti exiguae margaritae
in aqua albicant. Per omnem cauitatem conchae
expanditur cuticula, quae acu puncta aut aliter
laesa centrum versus se contrahit. Animalcula haec
vtriusque sexus sunt et dorso gelatinosam mollem
albamque massam adglutinatam habent, cui nume-
rosa proles adhaeret et a conchis ipsis ad matu-
ritatis statum vsque circumfertur.

P. 16. 2) *Observationes ulteriores de tubulis vermicularibus marinis, cornua ammonis referentibus.* Auctore Eodem. Hic notamus, testacea haec minuta spiralia, ex arena conchacea littoris bergensis regni noruegici aduecta, quae Noster ad classem cornuum ammonis alio loco retulit, ex eadem classe nunc eliminanda et tubulorum vermicularium alborum minorum nomine insignienda esse, insimulque alium vermiculum marinum, quem fossilem orbicularem planum appellat, hic descriptum et tabula I. delineatum esse.

P. 21. 3) *Dissertatio de montibus argillaceo-calcareis et argillaceo gypseis,* Auctore Cl. BAUMER. Montes argillaceo-calcarei ex stratis heterogeneis terreis ac lapideis constructi sunt, ita, ut humus vel argilla, cum arena saepius mixta, filices opaci, variis coloribus tincti, filices cornei, spatium, rarius minora saxi vel iaspidis frusta, lapides calcarei, argilla atque ardesia grysea vel coerulea, terra calcarea albissima seu lac lunae et incredibilis numerus ostracodermatum, plantarum, lignorum, piscium et ossium petrefactorum in iisdem deprehendatur. Dicti montes propemodum ab euro noto versus carum vergunt, iidemque ex diluvio vniuersali ortum suum traxisse videntur. Montes argillaceo-gypsei ex lapidibus gypseis, ardesia friabili, asbesto plumoso, alabastro, lapide speculari et argilla compositi sunt. Ex his etiam ossa fossilia, ad petrefactorum naturam haud accedentia, moschi odore instructa et tantae magnitudinis eruta sunt, ut maioris, quam quae in nostris terris inter cognita bruta degere solet, belluae partes fuisse Nostro videantur. Montes hos vel solitarios vel a montibus argillaceo-calcareis tectos, atque calcareos et gypseos non ab una eademque causa productos, et argillaceo-gypseorum directionem
aequa-

aequatori apud nos et probabiliter etiam alibi parallelam esse, Noster arbitratur.

4) *Observationes de Morochtho*, Auctore Eodem. p. 37.

Morochthus in Franconia luto vel lapidibus admixtus reperitur; si purus apparet, color albissimus est, linguae admotus adhaeret et dulcem saporem excitat; pondere admodum levis est et lapidis valde porosi et fragilis vel terrae speciem sistit. Impurus terram heterogeneam, arenam vel lapides minores in sinu fouet; praecedente magis cohaeret, grauior est et colore variat: qui in Franconia occurrit, rubicundus est vel cinereus. Purus cum aqua effervesceat, eam lacteo colore imbuat, paulo tardius in ea dilabatur, nec penitus soluitur. Spiritu vitrioli aliisque acidis affusis maior suboritur effervescentia, et affusa salis ammoniaci solutione, salis alcalici volatilil odor percipitur. Morochthum hunc ex ostracodermatibus, a natura in calcem mutatis ortum duxisse, Noster putat. Hinc morochthum pro terra alcalina vel calce minerali habendum esse, colligit.

5) *Historia terrae et maris ex historia Thuringiae* p. 44.

per montium descriptionem eruta, Auctore Cl. FÜCHSEL. Montes, Thuringiam ambientes, omnes stratis exstructos esse, atque secundum stratorum massam, modum compositionis, nec non situm nonnullos ita conuenire, Noster perhibet, ut genus montium constituent, a caeteris distinctum. Nouem series montanas et sex series statuminum enumerat. Ex his vltima series montana, montibus calcareis, infinito numero corporum marinorum testaceorum refertis constructa est et a Nostro series testaceo calcarea, *Muschelkalch*, *das oberste Kalchgebürge*, vocatur. Series statuminis, situm et positum horum calcareorum montium sequens, ex stratis

tis argillaceis, hinc inde gypseis, componitur et statumen gypseo - argillaceum rubrum, *das rothe Gypslager*, appellatur. Subtus et a latere prioris series montium arenaceorum, stratis argillaceis distinctorum procumbit et seriem arenaceam, *das Sandgebürge*, exhibet. Huius seriei statumen ex stratis argillaceis, maxime rubris, et nonnullis arenaceis, ignis vim perferentibus, componitur et statumen arenoso - argillaceum, *Glühsand, Hütten-sandlager* format. Tertia series iterum calcarea est, quam vero ob diuersam mixtionem et ob farinaceam, quam habet faciem, farinaceam calcaream, *Meelbatzen, Brennkalkgebürge*, Noster appellat. Huius seriei statumen e stratis, ex glauco - nigricantis, rarius rubrae, argillae, et quibusdam spuriiis constat, quae in nonnullis alabastrina aut gypsea continent, hinc statumen hoc alabastrino - argillaceum glaucum, *das graue Gyps oder Alabafterlager*, Noster nominat. Quarta series secundum strata quidem calcarea est, sed ob heterogeneam metallicam admixtionem calcareo - metallica series, *die Floetze, das Floetzgebürge* appellatur. Huius statumen ex strato arenoso, dein calcareo, impuro, limoso, tandem e stratis albidis argillaceis lapidosiis constat et a Nostro statumen metallico - arenosum, *Sandfloetz*, vocatur. Quinta series e stratis argillaceis, lapidosiis, plerumque fissis constat, quorum color viridiusculus albicans est, diciturque series fissilis albicans. *weiss Gebürge, weisslich Schalgebürge*. Sub hac statumen nullum Noster detexit. Sexta series itidem ex stratis argillaceis lapidosiis, plerumque rubris et aequae fissis constat, et series fissilis rubra, *roth Gebürge, roth Schalgebürge* nuncupatur, neque etiam statumen habet. Septima series, aequae fissi, ex stratis pariter argillaceis constat, quorum color e gryseo coeruleus est, hinc series fissilis coerulea, *schwarzblau*

blau Schalgebürge, Dach-Schiefergebürge, nominatur. Statumen, tribus his seriebus substratum, quoad stratorum massam, non vero quoad duritiem, suis seriebus conuenit et ob alumen, in plurimis locis productum, et ob nigredinem statumen aluminosum fissile nigrum, *Alaunschiefer, schwarz Alaunlager, vitriolisehes Gebürge* vocatur. Octaua series carbonum fossilium ratione numeri stratorum et altitudinis pro tali assumenda non esset, nisi usus et utilitas peculiarem suaderent descriptionem: nomen germanicum *steinkohlicht Gebürge, Steinkohlenfloetze* audit. Statumen vltimum, secundum Lehmannianos indices ex arena et argilla rubra potissimum compositum esse, Noster refert; id tamen ratione altitudinis magis seriem esse, prout praecedentem seriem carbonum magis indolem statuminis habere, autumat, ob defectum vero certiorum observationum statumen, germanice *das rothe todte Lager* nominat. Finita hac serierum et statuminum descriptione situm harum serierum et statuminum Noster describit, quem non secundum grauitatem specificam euenisse dicit. Situ descripto observationes has tam inter se quam cum aliis combinare atque euentus seu historiam exinde deducere annititur, tuncque ostendit, series hasce montanas non immediate sed successiue per coordinationem particularum et a fluido, quod particulas terrestres continet et ad fundum sub luti seu crySTALLORUM forma delabi permittit, productas strataque omnia ex fluidis praecipitata primo mollia et lutum, temporis vero successu duriora vel lapidea facta esse. Tandem quoque maris conditiones exponit et docet, quomodo a varia eiusdem constitutione varius stratorum ordo productus esse videatur.

p.209. 6) *EIUSDEM usus historiae suae terrae et maris.*
Hic ostendit Cl. Auctor, quomodo talis terrae marisque historia primo literatis viris, dein metallicis, porro metallurgis seu, qui mineras fundunt, tum agricolis et architectis, qui ad aedificanda domicilia arenam, calcem, gypsum etc. quaerunt, tandem fossoribus, qui scaturiginem quaerunt et omnibus artificibus et opificibus, qui plurimis naturae productis opus habent, vtilitatem parere possit.

p.255. 7) *Descriptio acuum magneticarum, nouiter inuentarum, quae vulgaribus praestantiores sunt, atque artificii, vires magnetum naturalium insigniter augendi.*
Auctore Cl. AEPINO.

p.273. 8) Cl. LEHMANNI animaduersiones de vera sandaracha veterum et de puteo sandaracino Philostrati, latine reddidit Cl. MANGOLDUS. Sandaracam, Sandaracham, Risigallum, Realgar, Harnat, Zarnich, Zirnich, Alonsis, sulphur rubrum, rubrum sulphur montanum, rubedinem montanam, *Bergroethe*, auripigmentum, flauum fuliginosum, *Rauschgelb*, *Russgelb*, gallice *orpiment*, vnum corpus designare, et a veteribus sandaracham veram, cinnabarim et minium saepe confundi, Noster ostendit, quodque PLINIO Sandaracha spuria appelletur, id nobis minium esse, hoc vero apud veteres cinnabarim designare, exponit.

p.285. Quod ad puteum illum sandaracinum attinet, cuius apud Philostratum mentio facta est, quive ob terram sandaracinam, vt vocarunt, nomen inde accepit, terram istam indolis martialis fuisse, fontemque istum vel e vicinia sua rubram ferri terram absorpsisse, vel illum ipsum nihil aliud forte fuisse, quam fodinam, praeteritis temporibus exustam, quae, consumptis in ea omnibus facile comburendis mineralibus,

bus, sensim et pedetentim desierit ardere, reliqua eiusmodi terra rubra ferrea quaeque ab adfluentibus aquis in fontem mutata fuerit, Noster variis argumentis probare annititur.

9) *Quid veterum fuerit malachites veri simili ratione eruit atque de ortu crystallinarum et quae in fila discerpi possunt, imprimis coloratarum, minerarum* egit IDEM: latine reddidit Cl. MANGOLDUS. Naturae hoc productum mineram cupri viridem crystallinam et compactam esse, Noster ostendit, omnesque species minerarum radiosarum et crystallinarum formam suam spatii immixtis debere et ab eis in mineralia redactas esse, asserit.

10) *Determinatio geometrica propugnaculi maximi in polygono quouis dato*, Auctore Cl. MYLIO.

11) *De plantulis frumenti seminalibus observationes quasdam proposuit* Cl. NONNE. Obseruauit Cl. Auctor in vno seminis grano vnam tantum plantulam seminalem nec plures haerere, eamque vagina inuolui, hanc autem ad defendendam plantulam ab iniuriis et ad praeparandum alimentum adesse, eandemque cum plantula tamdiu crescere, donec haec ipsa plumulam radículasque emiserit.

12) *Annotationes botanico-oeconomicae de Glauce* p.355. RIVINI, Auctore Cl. FRID. AUG. CARTHEUSER. Glaux RIVINI, planta tum viridis quam siccata pecori, praesertim vaccis, gratissimum praebet pabulum, numerosis foliis tenerisque caulibus instructa est; per radices suas repentes intra breue tempus multiplicatur; nullam peculiarem culturam requirit, ex plantarum indigenarum numero est et hyemis iniurias sustinet. Propagatio glaucis per radices

dices transplantationis ope absoluitur, transplantatio autem vere vel autumnno sicca tempestate coeloque sereno instituenda est. Radices huius plantae dulci sapore praeditae sunt, hinc eas, nisi glycyrrhizae, tamen polypodii radicibus in arte medica substitui posse, Noster arbitratur.

p. 361. 13) *Examen chymicum visci betulini*, Auctore EODEM. Viscum betulinum respectu truncorum, foliorum, florum, fructuum totiusque faciei externa a visco quercino nihil differt, ratione saporis autem et odoris utrumque differentia notabilis intercedit: visci enim betulini folia si masticantur saporem obtusum, leniter amaricantem et in recessu quasi subdulcem inprimunt et sub concisione aut contusione odorem subbalsamicum de se spargunt: viscum contra quernum odore et sapore sensibili destituitur. Fructus tamen seu baccae utriusque visci eandem naturam habent. Extractum resinosum foliorum et teneriorum ramorum visci betulini, ope spiritus vini paratum, odorem melleo-balsamicum et saporem e subdulci amaricantem leniterque balsamicum habuit; extractum vero gummosum, ope aquae paratum, odore visci contusi vel dissecti specifico debili et sapore amaricante leniterque balsamico instructum fuit. Extractum ramorum crassorum resinosum odorem melleo-balsamicum et saporem subdulcem aliquanto balsamicum inque recessu nauseose amaricantem exhibuit; extractum vero gummosum odore visci nativo et sapore amaricante vix sensibili dulcedine remixto donatum fuit. Eadem experimenta cum visco querno instituit Cl. Auctor, primoque extractum resinosum foliorum et teneriorum ramorum odore balsamico et sapore amaricante lenissime in recessu adstringente instructum obtinuit, gummosum vero extractum odorem
nauseo-

nauseosum et saporem amaricantem, falsedine quadam remixtum obtulit. Extractum resinofum ramorum crassorum odorem balsamicum singularem, et saporem satis austerum et nauseosum in simul, sed singularem habuit, gummosum autem extractum odorem debilem, pruna, tostione exsiccata, paululum aemulantem, et saporem falsum, amaricante et subadstringente lenissime remixtum exhibuit. Decocto ex foliis ramisque visci betulini parato vitriolum ferri puluerisatum admixtum nullam, ratione coloris, mutationem produxit, visci querni vero decocto obscureflauo admixtum ferri vitriolum mox nigrorem assumsit. Tandem visci betulini folia et ramos cum aqua in cucurbitam immisit et solito more destillauit, sicque aquam limpidam, odore visci betulini specifico, sed fragrantiori et nonnihil ingratoriori, et sapore debili subbalsamico imbutam, neque tamen oleum, obtinuit; aqua vero visci querni odoris nauseosi, maxime ab illius aqua distincti absque oleo transtillauit. Itaque visco bitulino et quercino ratione virium medicarum differentiam inesse, Noster colligit.

14) *Observatio de aphronitro*, Auctore Eodem. p.369.
Aphronitrum gustatum linguae saporem nitrosum, nonnihil obtusum impressit, carbonibus candentibus iniectum multas cum sibilo scintillas circumspersit acidisque affusis efferbuit. Aqua solutum et colatum terram, partim albam, partim griseam, in filtro reliquit, quae, spiritu salis instillato, efferbuit et ex parte soluta, postmodum euaporata, materiem plumoso-seleniticam exhibuit. Liquor colatus, euaporatus et ad crySTALLISATIONEM repositus, cryсталlos tenues, oblongo tetraedras, vtrunque obtusas, planiusculas cum interiecta materie plumosa, tenerri-
ma, seleniticae naturae exhibuit. Cryсталli, prunis impositae, viuide scintillantes, sapore nitri vulga-
Tom. XI. Pars IV. Y y ris

ris instructae fuerunt, quarum solutio, aqua simplici facta, affuso oleo tartari per deliquium, vel etiam solutione salis sodae, lactescens materiem albam deiecit, quae instillato spiritu salis efferbuit. Instillato oleo vitrioli, e crystallis fumi rubentes exeunt, quibus dispersis, massa in coagulum plumoso-striatum abit, quod affusa aqua calida facile soluitur. Euaporata solutio crystallos oblongo-compressas, latas, sali mirabili GLAUBERI similes, largitur, quae, prunis iniectae, aquae instar liquefcunt, in calcem albam fatiscunt et in aqua frigida facillime soluuntur. Itaque aphronitrum depuratum ex acido nitroso et sale alcali fixo minerali componi, ideoque nec ad natri species, nec ad salia alcalia, sed ad genuinas nitri species referendum et nitro cubico analogum esse, Noster autumat, et a nitro embryonato, quod alcali volatile fouet, nec crystallifatur, sed per euaporationem auolat, longe recedere, ostendit.

P.379. 15) *Observatio de relatione succini versus nitrum*, Auctore Eodem. Succinum, cum nitro mixtum et detonatum, Noster varie disquisiuit, tuncque acidum succini sub detonatione dissipari, nec sal commune inde nasci, idemque acidum ob volatilitatem ab acido vitriolico discrepare, hocque, corporibus inflammabilibus immixtum, sub detonatione cum nitro in sal medium, polychrestum dictum, abire, sal acidum vero succini omniumque bituminum per detonationem cum nitro in alcali fixum mutari, reperit.

P.388. 16) *Observatio circa mercurium vitae*, Auctore Eodem. Obtinuit Noster, dum butyrum antimonii cum aqua miscuit et aquam super puluerem albam antimoniam per aliquot dies in vitro aperto
reli-

reliquit, crystallos plumosas, albas, insipidas, quae ficcatae et aeri expositae siccae permanferunt. Hinc aquam, in qua butyrum antimonii solutum est, si ea aliquamdiu super mercurium vitae relinquatur, acidum salis communis, ex butyro antimonii ante susceptum, ex parte rursus deponere, hocque cum mercurio vitae nouam mixtionem inire, et substantiam non amplius corrosiuam, nec in aere deliquescentem, sed insipidam et ficcissimam oriri, colligit.

17) *De cera flaua pictorum vsui accommodata*, p. 391.
 Auctore Cl. IACOBI. Admiscuit Cl. Auctor aquae calcis viuae concentratae vnciiis quatuor, olei tartari per deliquium, valde saturi vnciam semis, inque eas terreo in vase cerae flauae vnciam semis immisit, lenique applicato igne, et adhibita absque interruptione cum spatula lignea agitatione nitidissimam solutionem cum permultis pigmentis, ab acido liberis, iunctionem subientem. Massam hanc per linteam candidum, ad separandas partes grumosas ceraceas, traiecit, eamque, quo diutius vasi inclusa assueretur, eo melius picturae inferuire obseruauit. Vas, ceraceam massam recondens, vitreum aut, si terreum adhibeatur, exactissime coctum probeque vitreatum requiri, notat. Hanc cerae tractationem eundem quidem in pingendo vsum cum noto illo Neapolitano artificio habere, sed a Neapolitana cerae dissolutione, quae cerae in aquam transitum, additione paucarum guttularum liquoris cuiusdam efficit, differre monet, siquidem Cl. Auctoris solutio notabilem lixiuii soluentis copiam pro eodem obtinendo scopo exposcat. Quam ob rem saponariorum lixiuium, nondum saponis coctioni adaptatum, maxime satur, ad ficcitatem vsque evaporatum, calcinatum vitreaeque tabulae impositum, spontaneae in cella deliquescentiae exposuit, iterum-

que euaporatum simili deliquio tradidit, sicque operationem ad quartam vicem repetiit, tandemque liquorem, Neapolitano simillimum, obtinuit. Caeterum picturas, recenter paratas madida statim cum spongia detergendas non esse, sed intervallum quoddam, quo tempus exsiccationi relinquatur, concedendum innuit, omnemque peregrinarum rerum, ut vernicum, mucilaginum etc. adiunctionem vetat, siquidem sufficientem splendorem exsiccatione, aliquot hebdomadum spatio concessio, sponte obtineri perhibet. Respectu pigmentorum, cerae admiscendorum, omnia acidae indolis pigmenta exulare debere, contra pigmentis, germanice *Laccfarben* dictis, locum concedendum esse, monet.

p.401. 18) *Experimenta quaedam chemica de cinnabari eiusque partibus constituentibus cum observationibus quibusdam de eiusdem vi medica*, Auctore Cl. MANGOLD. Cinnabarim, cum singulo metallorum et semimetallorum mistam per caementationem disquisiuit et sequentia observauit. 1) Mercurius, in cinnabari contentus, facillime omnium liberatur per cuprum et ferrum, a stanno contra maxime retinetur. 2) Mercurius, a cupro liberatus singulari modo in globulos colligitur, radios formantes. 3) Nullum metallum et semimetallum, praeter argentum, cuprum et quodammodo stannum cinnabari qualitatem, qua instar plumbi vel saltem cerussae scindi potest et metallicum splendorem acquirit, communicat. 4) Pondus cupri, stanni, reguli antimonii, plumbi, zinci et argenti cum cinnabari per caementationem augetur, bismuthum vero pondere minuitur. 5) Cinnabaris crystallos, splendore metallico praeditas, ex argento producit, quae peculiarem speciem sistunt et salinae acidae sunt, eademque vel pars eiusdem generationi et vegetationi metallorum fauet. 6) Cinnabari metalla

talla ignobiliora et semimetalla, inprimis regulus antimonii, cuprum, plumbum, ferrum et zincum calcinantur. 7) Nulla cinnabaris sublimata pellucida est, praeter eam, quae cum argento caementatur et nulla aurum musicum dat, quam quae cum stanno et bismutho digeritur.

His expositis observationem Noster de effectu p.421. antispasmodico communicat, quem edidit cinnabaris in viro, qui in sinistro pede globulo plumbeo, ex sclopeto emisso, insigniter laesus posteaque horrendis spasmis ita excruciatu fuit, ut totum corpus miris modis conuelleretur. Hanc ob causam aegroto ad methodum Cl. SCHLICHTINGII vnciam dimidiam cinnabaris cum sex aquae pluviae vnciis exhibuit, terrificumque istum spasmum eodem die mitigatum esse, annotavit. Cum autem remedium hoc, recurrente licet spasmu, denuo propinatum non fuerit, atque aeger gangraena proserpente succubuerit, observationem hanc nondum plane perfectam esse, arbitramur.

Observatio de mala quadam conformatione situque partium quarundam imi ventris in puero quinque cum dimidio annorum, Auctore Cl. BOESEFLEISCH. p.431.
Umbilicus in hoc puero non in loco, naturali adfuit; sed eius loco in latere imi ventris sinistro, vnum digitum cum dimidio a regione umbilici, cicatrix quaedam, plana, neque vero excavata visa fuit. Aliquot digitos sub isto loco, ubi alias umbilicus est, inaequaliter rotundum, dilute rubrum et nitens corpus adfuit. Ex hoc corpore inferius versus dextrum latus quaedam urinae striae prodierunt; sub isto autem corpore pars quaedam visui se obtulit, quae glandem penis inuersam repraesentavit, frenulo nempe superius, praeputium autem inferius sito. Eo in loco, ubi corporis istius,
Y y 3 glan-

glandem referentis, finis fuit, atque in lateribus eiusdem nonnullae plicae adfuerunt, speciem quandam scroti praebentes, sed parum elatae. In vna harum plicarum sine dubio paruula adfuit apertura cum lotium inde stillauerit; in corpore vero, glandem referente, eiusmodi apertura plane defecit. Sub ea parte, quae scroto similis fuit, atque in lateribus siue inguinibus insignes et oblongi tumores apparuerunt, instar coni fere compositi, labiaque verendorum muliebrium quasi repraesentantes, inter quos rimae cuiusdam species, ut iisdem verendis, intercepta fuit, ita, ut hermaphroditum imaginari sibi quis potuisset. Memoratus puer non nisi panniculis mollibus et pendens minime vero fellae, insidere, nec etiam cubare potuit, nisi in parte superiori dorsi, vel genubus capiteue. Caeterum appetitus viguit et aluus bene respondit.

P.443. 20) *Historia morbi, maxime complicati, mulieris cuiusdam, in cuius dissectione post mortem praeter alia ventriculus in duas partes diuisus et situs viscerum quorundam mutatus deprehendebatur* Auctore Cl. MANGOLD. Foemina, in iuuentute adhuc constituta, postquam ingens onus tulit, vehementi dolore in latere dextro cruciatur. Viro posthac nupta plures difficiles partus patitur, ultimoque, ubi mortuum edidit foetum, male tractata, febre et inflammatione corripitur, ab eoque tempore ingens excrescentia in vagina apparet. Dolore supra memorato aucto tandem decumbere cogitur, insimulque enormem in utero et sinu pudoris sentit dolorem. Multum demum a variis malis iisque grauissimis defatigata obiit. Corpore eius dissecto, praeter viscerum quorundam situm mutatum, ventriculus in duas partes diuisus in conspectum venit, cuius medio pancreas scirrho-

rhosum et fere cartilagineum solito maius et rubicundum incubuit. Quae in sano statu in sinistro latere haeret ventriculi pars, perque vasa breuia cum liene coniungitur, superius sub diaphragmate vna cum liene locata fuit, quae vero dextrum alias latus respicit, inferius, vmbilicum versus, situm habuit. In medio ventriculus, vbi diuisio apparuit, contractus fuit ingentemque versus inferiora plicam formauit, in cuius medio foramen magnitudine grossi germanici adfuit, per quod et supra plicam cibos e parte superiori ventriculi in inferiorem descendisse, Noster autumat.

21) *Observatio de utero cuiusdam foeminae duplici* p.451.
Auctore Cl. BOESEFLEISCH. Quantum ex descriptione perspicere licet, vterus septo crasso et firmo ad fundum vsque diuisus duas cauitates habuit, in quas hiarunt tubae fallopianae, quarum extremitates, alias liberae, cum ouariis confusae fuerunt.

22) *Observationes de morbis venereis* Auctore p.455.
Cl. BAUMER. Ex his notamus, Cl. Auctorem mercurii dulcis aliquot grana cum olei hyperici vel momordicae semuncia coniuncta et, vitro probe agitato, ter de die iniectionem, syringae ope, in vrethram vel vteri vaginam in gonorrhoea maligna similique fluore albo suscepisse, simulque interne diuretica propinasse, sicque morbum vtrumque feliciter sanasse.

23) *Observatio de praeclaro usu corticis peruuiani* p.461.
in febribus malignis Auctore Cl. VOGEL. Decocti corticis peruuiani vnciam cum pauxillo syrupi acetositatis citri omni bihorio febre maligna decumbentibus exhibuit, nec vllum eorum, qui statim ab initio aut saltem sub incremento morbi eo vsi sunt, periisse, apprehendit.

p.465.

24) *Observationes de vi fulminis electrici in membra frigore vsta, et alio modo adfecta* Auctore Cl. FÜCHSEL. Viro quinquagenario, cuius pedes et manus frigus exussit, electrica vi applicata, intra tres hebdomades stupor et tumor secessit sensusque rediit. Idem aeger posthac defluxione catarrhali ad dentes cum erysipelate correptus fuit; quapropter Noster scintillas electricas simplices in buccam tumidam, vsque dum cutis madescere videretur, proficientes ex machina eduxit; quo facto noctu subsequens sudor capitis largus malum istud profligavit. Alii viro octogenario, doloribus rheumaticis vexato, tumoreque glandularum inguinalium et varice seu spasmo inflata vena brachiali laboranti, electricam vim applicuit; inde dolores quidem imminuti fuere, sed sine constanti effectu; varicem dicta vis intra vnam vesperam abegit et tumorem inguinalem, pugno aequalem, nulli remedio obedientem, intra triduum constanter discussit. Mulier hemiplectica, adhibita simplici electricitate, nullam primo mutationem sentiens, subsequente nocte horrendis epilepsiae convulsivae insultibus distorta fuit; sequentibus horis matutinis eruperunt per totum latus hemiplecticum exanthemata, inter purpuram et urticatam speciem media, tuncque insultus epileptici cessarunt. Verum hemiplexia remansit, corpus autem prius macrum, posthaec magis, et ad obesitatem fere vsque, intra duos annos et ultra nutritum fuit. Tandem nouo insultu apoplectico accedente ad summam maciem redacta periit. Vir rheumate vago laborans brachium affectum tribus scintillis simplicibus concussum illico mouit, nec halitus frigidus, brachium et quodcunque membrum, in quo alternatim latitauit rheuma, nonnunquam perflantes, intra mensem sensit, vsque dum catarrhalis insultus, non rite succedens in nouum, aut leuius, rheuma transfiret.

25) *Ob-*

25) *Observatio de aegra post multum opium sum-* p.477.
tum secura Auctore Cl. STRACK. Ancilla phar-
 macopoei cuiusdam remedium, ex spiritus vini gal-
 lici vnciis quatuor, saponis veneti vncia vna et di-
 midia, camphorae drachmis duabus et opii crudi
 scrupulo vno paratum et externo vsui destinatum
 pro pharmaco purgante habuit et sumsit. Aliquot
 horis praeterlapsis pharmacopoeus tincturam hanc
 aegro transmittere cum voluisset, ab ancilla relatum
 accepit, se eandem, pro purgante habitam, sum-
 sisse nec inde quidquam persentiscere. Statim igitur
 aquam calidam ancillae potandam dedit, paulo-
 que post Noster consultus vomitoria, purgantia et
 spiritum cornu cerui propinauit, quibus cunctis
 duorum dierum spatio largiter sumtis tertio die bene
 sana e lecto surrexit, nec vllum vitium, a nimio opio
 alias metuendum, persensit.

26) *Observationes de maniaco, usu pulueris tunqui-* p.483.
nensis sanato, a Cl. SEBASTIANI *propositas latini-*
tate donauit D. B. Viro, annum quadragesimum
 agenti, qui ob infantis obitum primo tristis, tandem
 furibundus euasit, venae sectione variisque remediis
 incassum adhibitis, dosin pulueris tunquinen-
 sis, ex moschi optimi granis sedecim, cinnabaris natiuae et
 antimonii ana granis duodecim parati, cum multa
 aqua simplici ingerendam curauit; inde post aliquot
 horas quietior factus, parum demum vel nihil absoni
 locutus est. Postridie alteram laudati pulueris, ex
 aequalibus ingredientium partibus, cuiuslibet ni-
 mirum viginti quatuor granis compositi, dosin No-
 ster exhibuit; quo facto plenaria menti rediit tran-
 quillitas.

27) *De pilorum circa pudenda resectione singu-* p.490.
tari methodo, ad humores in gonorrhoea effluentes di-
 Y y 5 *minu-*

minuendos, dolores in gonorrhoeis diurnis tollendos nec non bubones venereos resoluendos, quam inuenit et communicat, Cl. MEDICUS. In curando hoc morbo ad imminuendum humorum affluxum et corroboranda vasa debilitata respiciendum esse, Noster monet. Ad explendam igitur regulam primam, quam primum virus venereum ex membro virili elutum est, pilos circa pudenda penitus defecari atque locum aqua calida lauari iubet. Quo facto, duodecim horarum spatio profluuium minui, duobus vero peractis diebus fere nullum amplius esse, dicit. Si vero pili mediam superarint longitudinem, profluuium etiam validius et copiosius euadere, illico vero, quam primum pili rursus resecuti fuerint, diminui obseruauit. Altera resectionis pilorum utilitas in sedandis tollendisque gonorrhoeae diurnae doloribus consistit: in benigna enim gonorrhoea, per longum tempus iam durante, adeoque cum doloribus coniuncta, pilos circa pudenda Noster resecavit, interne vero medicamenta incrassantia exhibuit, sicque dolores decrescere, nunquam redeuntes obseruauit. Tandem idem remedium, dummodo sine temporis iactura adhibeatur et interne sal resoluens insuper propinetur, ad bubones venereos dissipandos idoneum esse, asserit et triplicem hanc utilitatem ab impedito humorum ad vrethram affluxu dependere, autumat: humores enim, morbum constituentes, ad incrementum pilorum impendi, ostendit. Minime tamen pilorum resectionem solum remedium gonorrhoeae existimat, sed roborantia omnino remedia adhibenda esse et corticem peruuiianum, subiuncto aquae frigidae balneo cum fructu propinari, monet.

p. 500. 28) Μελετυματα de nummis quibusdam antiquis e mari eiectis Auctore Cl. APELBLAD.

29) Com

29) *Commentatio historica de morte Gustavi Adol-* p.504.
phi. Regis Suecorum Auctore Cl. OETTEL.

30) *Eiusdem Commentatio de prophetis Aegy-* p.554.
tiorum.

31) *Commentatio historico-literata de libro heroi-* p.570.
co vulgo dem Heldenbuche, Auctore Cl. FREYTAG.

32) *Dissertatio de ערביים seu de optimis* p.631.
arborum speciebus apud Hebraeos, et de officio curato-
rum, quos illis plantandis ac tuendis Dauides praese-
cit ad 1. Chron. XXVII. 28. Auctore Cl. HADE-
LICH.

33) *Eiusdem Tractatus de America, ante Co-* p.649.
lumbum veteribus Rabbini nota.

34) *Eiusdem Comment. de lineis veterum he-* p.672.
roum thoracibus et de insigni illorum praestantia in re
militari.

XIII.

Noua physico - medica.

Petropoli relatum habemus, rei medicae per va-
stissimum Imperium Russicum habendam ra-
tionem; prorsus noua ideo ab Augustissima Impera-
trice data lege nouoque per illam constituto Colle-
gio Medico Supremo, insigniter mutatam esse, cu-
ius notitiam iisdem verbis, quibus exaratam acce-
pimus, nostris quoque lectoribus exhibendam esse
putamus, ne institutum illud forsan aliter, ac sese
habeat, explicasse videamur.

Haec

Haec nunc est Imperii Rossici felicitas, vt auspiciis Augustissimae CATHARINAE II habeant exteri, quod mirentur, et ciues, de quo gaudeant. Quam indefessa cura et labore omnes boni principis partes sapientissima explevit Imperatrix, tot tantaque loquuntur monumenta, vt cum breuitate temporis comparata, fidem fere exsuperent. Vnum ex his haud tamen postremum est, publico Augustae mandato constitutum esse Collegium Medicum, eadem auctoritate, qua reliqua suprema Imperii tribunaalia, pollens, cui omnis rerum medicarum per totum Imperium directio, quae olim penes solum Archiatrum erat *), credita est. Gratum erit exteris, leges collegio datas nosse: nec vero id vtilitate carebit, praecipuas saltem compendio exhibere, quum non parum sit, quod ad eos aequae ac ad ciues imperii pertinet. Medici, chirurgi ac pharmacopoei omnes tam in exercitu et classe, quam et prouinciis et ciuitatibus, auctoritate collegii constituuntur, et ab eo agendorum normam accipiunt. Quum vero hucdum omnes medici, magnaque chirurgorum pars ab exteris exciti fuerint, huic ita malo prospectum est, vt paucis annis facile Rossia hoc exterorum beneficio carere possit. Hoc scopo Augusta imperauit, vt communi consilio cum vniuersitate Moscouensi, collegium quantocius de erigenda facultate medica, constituendisque professoribus cogitet, ne ii, qui arti medicae destinantur, peregrinas ad oras proficisci cogantur, sed natali in solo eius praeceptis imbuantur. Magnum adeo imperium, tot continens regna, tot prouincias et coeli et soli diuersitate mirum quantum sibi dissimiles spem facit, multa adhuc esse parum cognita, gratissima tamen naturae scrutatoribus, si olim detegantur, futura,

*) vid. Comment. nostr. Vol. IX, P. I. p. 168 et 169.

tura, non medicis tantum, sed et aliis vñsibus, apta. Quum omnibus his prouinciis non chirurgi solum, sed et medici dati sint, sperandum sane est, multa in apricum productum iri, si vllam saltem operam huic rei impenderint: hoc vero vt collegium exequatur, summo imperiali mandato decretum est, datis simul praemiis, si qui praeclari aliquid praestiterint. Nullum est dubium, quin et res medica nouis obseruatis et inuentis coniuncta tot virorum opera increseat, cum id quoque sapientissimae Legislatricis attentionem haud effugerit. Ea enim data simul Collegio cura est, vt omnia rariora et scitu digna, peculiaribus Commentariis medicis a collegio quouis anno edendis, publici iuris fiant. Medici scientia et eruditione clari, qui labore suo ad Commentaria haec aliquid contribuere, ex decreto collegii, nomine Augustissimae imperatricis, titulum membrorum honorariorum obtinebunt, cum, praeter administrationem rei medicae, idem fere collegii sit institutum, quod academiarum scientiarum. Quum adhuc non pauca sint, quorum cura identidem collegio incumbit, e compluribus membris illud constituere Augustae placuit, quibus Praeses datus est

Illustrissimus et Excellentissimus L. B. ALEXANDER DE TSCHERKASSOW S. S. M. Imperialis cubicularius actualis, cui quoque soli res oeconomica cum aerario tradita est. Collegii membra sunt:

GEORG. THOMAS L. B. DE ASCH, Exercitus Imperialis Proto-Medicus.

CHRISTIANVS PAECKEN, Medicus Academiae militaris.

ANDREAS LINDEMANN Medicus obstetricius; quibus honor additus est consiliariorum altiorum Imperii tribunalium.

E phar-

E pharmacopoeis constitutus est: IOH. GEORG. MODEL, pharmacopoeus primariae officinae Imperialis, addito titulo consilarii aulici.

E chirurgis data sunt collegio membra:

IOH. GEORG. WULFF, Primarius chirurgus (*Stabs-Chirurgus*) academiae militaris, addito aulici consilarii titulo.

CHRISTIANUS LUD. BLOCK, chirurgus legionis praetorianae Semenouiensis, nomine Assessoris.

Cum Augustissimae Rossiarum imperatricis CATHARINAE iam vniuerso orbi amor innotuerit, quo omnis generis scientias et artes, humano generi utiles, non ipsa tantum colere, sed et tueri dignatur: nulum certe dubium est, quin aequae ut omnibus eruditis, sic et inprimis medicis gratissimum hoc institutum futurum sit, et quin vitam immortalis famae coaeuam magnae et sapientissimae principi voueant.

Regia chirurgiae Academiae *Parisiensis* duplicatum praemium, quaestioni *de optimo aperiendi tractandique abscessus modo* propositum et ad hunc annum 1764 dilatum *), adiudicauit nuperrime CL. DAVID, artium magistro et chirurgiae candidato. Is iam praeter varios huc vsque editos commentarios in primis ex praemio illo innotuit viris doctis, quod ante hos duos annos a scientiarum societate *Harlemensi* consecutus fuit, optime nimirum soluta quaestione *de augendo vel supprimendo lacte* aliisque circa hoc naturae negotium obuenientibus malis optime tollendis **).

Regiam

*) vid. Comment. nostr. Vol. IX. P. II. p. 344 et Vol. XI. P. I. p. 163.

**) ib. Vol. IX. P. III. p. 542.

Regiam scientiarum societatem *Gottingensem* duo quidem praemia oeconomicis argumentis praefixa, *de ouium scilicet cultura et pascuorum comunione*, auctoribus adhuc incognitis tribuisse nuper indicauimus *). Nunc vero legimus, duplex istud praemium ab vno eodemque auctore fuisse reportatum, Viro Cl. IOANNE AUGUSTO SCHLETTWEIN, serenissimo Marchioni Badensi Durlacensi a consiliis reddituum siue camerae et politiae, in oppido ob egregium ibi florentem hortum botanicum valde claro, *Carlsruhe* dicto, degente.

In vniuersitate porro, quae *Goettingae* floret, Vir Cl. GEORGIUS MATTHIAE, Medicinae Doctor et Professor huc vsque extraordinarius, nunc eiusdem Professoris Ordinarii honoribus exornatus fuit. Quam is egregie de medicina et litteraria in primis medicorum historia meruerit, insigni specimine lectoribus nostris nuper iam comprobauimus **).

In eandem quoque vniuersitatem *Goettingensem*, vt Medicinae et Anatomiae Professoris Ordinarii munus ibi subeat tertiumque facultatis medicae sic dictae locum occupet, euocatum fuisse eoque iam secessisse legimus Virum Cl. PHILIPPUM GEORGIUM SCHROEDER, Medicinae Doctorem eiusdemque haftenus Professore Publicum Ordinarium in Academia Marburgensi.

Ibidem denique Professoris Medicinae Extraordinarii munus delatum fuit in Virum Cl. IOANNEM ANDREAM MURRAY, Medicinae Doctorem, qui eandem huc vsque cum laude iam coluerat *Goettingae*.

Abo

*) vid. Vol. XI. P. II. p. 353 et 354.

**) ib. Comment. nostr. Vol. X. P. III. p. 538.

Aboa quidem vocatus fuit *Petropolin* Vir Cl. PETRUS KALM, Med. D. et Oeconomiae Professor Publ. Ordinarius Aboensis, vt Professoris Botanices munus ibi susciperet, largo satis stipendio aliisque eximiis praemiis afficiendus. Patriae autem et amantissimus et ipsi fidelissimus munus illud eiusque praemia deprecatus a se fuit.

In Academia *Erlangensi* Professoris Medicinae Ordinarii munus auspicatus nuper fuit Vir Cl. IACOBUS FRIDERICUS ISENFLAMM, Med. D. serenissimo Marchioni Brandenburgico Culmbacensi a consiliis aulae, publice habita oratione *de mutuo scientiae medicae reliquarumque scientiarum consortio*, editoque eum in finem programme *de tunica cellulosa*.

Nostra quoque vniuersitas *Lipsiensis* denuo habet, de quo sibi gratuletur. Nouum enim Oeconomiae Professoris munus ex auctoritate serenissimi nostri Principis Electoris, fundatum fuit hoc anno 1764, quod iam prima vice datum est Viro Cl. DANIELI GOTTFRIED SCHREBER, Iuris Vtriusque Doctori, Buzouio huc euocato, viro permultis ad rem oeconomicam similesque scientias pertinentibus scriptis inter viros doctos claro facto. Adit is illud nuperrime, die sexto iunii, sermone publice dicto *de damnis, quae ex neglecta in academiis disciplina oeconomica necessario consequuntur*, editoque programme sub titulo: *delineatio historiae scientiarum oeconomicarum, quatenus vt academicae considerandae sunt*.

A Regia scientiarum societate *Londinensi* in sociorum numerum recepti nuper fuere Viri Clarissimi, BERNARD SIEGFRIED ALBINUS et HIERONYMUS

MUS DAVID GAUBIUS, Doctores et Professores
medicinae Lugduno-Bataui, quos modo nominasse
satis erit.

Hafnienfis e contrario vniuersitas virum et fama
et meritis clarum amisit, PETRUM scilicet HOR-
REBOW, Medicinae Doctorem, Philosophiae, Ma-
theseos et Astronomiae Professore, Consistorii Af-
forem, vniuersitatis seniore, academiarum scien-
tiarum Hafnienfis, Parisiensis et Berolinensis socium,
qui senio confectus nuper die decimo quinto aprilis
vitam cum morte commutauit. Quemadmodum
enim et docendo et scribendo bene de suis ciuibus
meruit, ita et longam atque honorum plenam et
optabilem vitam egit. Anno seculi superioris septua-
gesimo die maii vicesimo quinto in Iutia natus, iam
ex anno huius seculi decimo quarto Professoris mu-
nere functus fuit Hafniae. Patris quoque felicitis for-
tuna fruitus, viginti liberos suscepit ex coniuge, nata
ROSING, anno huius seculi vndecimo in matrimo-
nium ducta, ex quibus septem superstites reliquit.

Grauiissimam porro iacturam non *eadem* solum
Hafnienfis vniuersitas, sed omnis literatus orbis fecit
anno superiore. De societate illa doctorum virorum,
qui Potentissimi Daniae Regis auctoritate atque
sumtibus ante paucos annos iter in aliquas pro-
uincias orientales, Arabiam in primis, susceperant,
olim iam *) et deinde plus simplici vice de itinere
ab iis haecenus feliciter continuato, ad lectores no-
stros retulimus. Sed valde nunc tristem de vi-
ris illis accepimus nuncium. Postquam enim
omnem felicem Arabiam per octo menses pera-
grauerat illa societas, omnibus, quae annotatu
digna

*) vid. Vol. VIII. P. II. p. 348.

digna ipsi obuenerant, omni studio atque diligentia inuestigatis atque conquisitis, in tristissimam incidit calamitatem, quum omnia ipsius membra grauius corripere morbis, qui die vicesimo quinto maii Professore DE HAVEN, iulii yndecimo alterum Professore FORSKAL, Viros Cl. paulo post pictorem BAURENFEIND atque vnum ex apparitoribus, e medio sustulerunt. Reliqui hinc focii, et medicus, Cl. CRAMER, et Cl. NIEBUHR, architectus militaris, Bombacum (*Bombay*) petere coacti sunt, reditum in Europam paraturi. Quamuis interim triste hoc fatum valde doleamus, non omnes tamen ab illa societate collectos itineris fructus perituros esse speramus, quum annotationes suas sine dubio literis consignauerint optimi illi viri, quas ab eorum focis superstitibus editum iri existimamus.

In relationibus publicis obseruationem quandam legimus, quae attentionem meretur, sique vltiore usu atque experientia comprobata fuerit, insignem vtilitatem promittit. Fertur scilicet *Vtini*, quae vrbs in Foro Iulio, prouincia quadam Veneta, sita est, vir quidam a cane rabido morsus et per largum satis aceti vini haustum, ex incuria ipsi propinatum curatus fuisse; hinc fama tam felicitatis curationis Patavium lata, medicus nosocomio eiusdem vrbs propositus, Cl. LEONISCA, veritatis inuestigandae cupiditate permotus, ipse *Vtinum* se contulisse; ibique de ea certior redditus, domum redux factus, tentamen illud in non nullis talibus aegris idque semper cum felici successu ita repetiisse, vt ter per diem, mane nimirum, a meridie et vesperi aceti libram iis propinauerit. Num autem prophylactice, an curatiue, contra dirum istum hydrophobiae morbum datum fuerit acetum, haud clare satis expressum legimus.

Memoria IOANNIS FRIDERICI GRONOVII,
Medicinae Doctoris, Reipublicae Leidenfis
Senatoris, et Societatis Regiae Vpfaliensis
Socii.

Neminem putamus esse literarum studiosum, quin GRONOVIORUM nomen fama et auditione acceperit: adeo nullus est terrarum locus, ad quem verae doctrinae humanitatisque lumen penetrarit, quin huius etiam nominis splendor cum literis eo delatus sit. Doceremus operose, colenda humanitatis disciplina IOANNEM FRIDERICUM, huiusque filium, IACOBUM, viros in primis doctos, ceteris etiam doctrinae partibus consuluisse, nisi ab omnibus sciremus humanitatis studiis hunc honorem libenter et sponte haberi, aut si dubitare quemquam vereremur, tum demum singulis in locis signum bene de literis sperandi sublatum esse, cum vel e sinu suo humaniora ingenia proferre et alere coeperunt, vel aduenarum beneficio superiorem tarditatem abigi senserunt. Iam si et ii, qui hodie humanitatis studia profitentur, instauratores aequant, cum non solum stabiliant literarum fundamenta, sed caueant etiam tam beneficae humanitati a barbarorum incursionibus: quantam putabimus eius familiae gloriam esse, quae primum duos progeniit, humanitatis omnis peritissimos, quos non dicam cum paucis conferri debere, sed quisque imitari, si qua ratione possit, affectat: deinde ceteros posteros, nominatim ABRAHAMUM, eius, quem hic describimus, fratrem, ad humanitatis literas domesticis exemplis incendit, seuerissimam earum in omni genere doctrinae tenendarum legem sanxit, suppeditato denique tam praeclaro adminiculo in sua quemque arte ad altissimum gradum adscendere iuuit. Non ergo

temere in posterum quoque medicinae doctores commendabunt tironibus humanioris doctrinae amorem, non frustra sine eo negabunt etiam in re medica et naturali aliquid effici posse, cum sententiae huius tantae prostant auctoritates, quibus novum hoc GRONOVII exemplum recte iungetur, qui, ex quo scriptis innotuit, huius etiam doctrinae laudem consentienti doctorum opinione tulit.

Leidae natus est a. 1620. e IACOBO, viro summo, et ANNA VAN VREDENBURG, felicique omine celeberrimi aui, IOANNIS FRIDERICI, nomen accepit, quod ita mereri studuit, ut non vna nominis similitudine, sed et doctrinae laudisque amplitudine dignus avo esset nepos, dignus item IACOBO patre, filio parentis simillimo. Non potest nomen ipsum et consanguinitas ita liberorum animos afficere, ut necessario eos informet ad omnem paterni ingenii similitudinem: sed de incitamento clari nominis celebrataeque familiae dubitari non debet, quo saepe tarditas impellitur, stupor commouetur, auersatio denique abstergitur. Certe videtur domestica laus in mente GRONOVII non paruum fecisse ad sequendos maiores momentum, cum nihil indulgeret magnae debilitati, qua natura corpus emolliuerat, nec retardari pateretur animum segnitie, quem corporis ratio tardius ad praeceptorum disciplinam admiserat, ac ne obtusum quidem aurium sensum praetexeret negligentiae magno in illa aetate amoris. Nec pugnavit GRONOVIVS contra hanc infirmitatem tantum externa quadam assiduitate, qua saepenumero etiam sana corpora adquiescunt; sed ipsa animi contentione veroque studio, sine quo ad doctrinam accedere numquam potuisset. Ergo satis maturo tempore ad academicas scholas venit, primumque ante alios audiuit patrem, non opinione aut amore addu-

adductus, sed quod literarum graecarum latinarumque studia, quarum professionem IACOBUS sustinebat, centies audierat iis esse vnice aemulanda, qui stabile fundamentum doctrinae iacere vellent. Hoc apparatu instructus animus felicius tractauit duce RAUWIO anatomica, faciliusque accepit botanica, chemica et practica ex magni BOERHAAVIO ore. Sed vt ii, qui ad multorum amicitias se applicant, eligunt ex omnibus vnum, quo praecipue familiariter vtantur, non quo spretos velint ceteros aut destitutos, sed quod vnum aliquem suo ingenio suisque moribus in primis similem deprehendunt: ita mirum non est, si GRONOVIVS, ceteris quidem medicinae reique naturalis partibus accurate tractatis, praecipuo tamen amore botanice coluit, de quo infra plura dicentur, ne nunc temporis ordo turbetur. Scilicet discessit tandem ex ea disciplina, quam academicae scholae praescribunt, editaque dissertatione, quae *historiam camphorae* exposuit, cepit cum summa dignitatis laude honorem doctoris a. 1715 d. 23 Maii. Ex quo autem magnum cum medicina vsum contraxerat, eodem amore atque studio, quod eum paulo ante docuimus botanicae consecrasse, CORNELII CELSI libros ita versauit, vt omni diligentia, quidquid ad interpretationem et crisin pertineret, colligeret, si forte emendata editio hoc modo confici posset. Atque etiam praeclara potuisset esse eius opera, cum ob literarum humaniorum diuturnum et GRONOVIANAE familiae proprium vsum, tum quod omnes editiones et codices Leidensis, rursus quosdam libros Oxoniensis bibliothecae cum exemplo ALMELOVENIANO contulerat, nisi, incertum coactus an volens, totum hoc consilium materiei digerendae abiecisset. Post vigesimum quartum h. s. annum, cum morte coniugis domus eius afflictata esset, consolandae

orbitatis causa literario amore Angliam adiit, maxime vt plantas a Batauo solo alienas, saltem domi-
rariores, conquireret. Conuenit ibi doctissimos vi-
ROS, DILLENIIUM, SHERARDUM, LAUSONUM,
COLLINSONUM et CATESBAEUM, contulitque
hoc totum tempus ad firmandam botanices cogni-
tionem, quam in eo summam fuisse satis demonstrat
herbarii ditissimi collectio, libri multi accurate
scripti, in his *Flora Virginica et Orientalis*, plurium
plantarum diligentior descriptio, vita etiam hoc ma-
xime literarum genere transmissa, et in mediis his
occupationibus finita, tum magna fama, iudiciis vi-
rorum intelligentium commendata. Coeperat et-
iam extremis vitae annis, quoniam bibliothecae Lei-
denfis curam habuit, manu scriptas schedas CLU-
SII, quae in illa bibliotheca asseruantur, excutere,
vt vitam eius et res omnes cum fide iustaque dili-
gentia descriptas ederet, fueratque aliquantum col-
ligendo progressus. Sed interceptit hunc fructum
ingrauescens senectus, quae etsi legitimam habet
excusationem, tamen, id quod certo scimus, non
solum narrationem de CLUSII vita nobis eripuit,
sed et exemplar vitae huiusmodi scribendae. Huic
indefesso literarum studio, huic amoris doctrinae,
atque ipsi etiam scientiae debetur, quod plantarum
in herbario seruatarum, librorum et lapidum tan-
tam multitudinem reliquit, vt valde laetemur, quod
a LAURENTIO THEODORO, filio GRONOVII,
catalogum herbarii expectare possumus. Pro-
stant, praeter libros GRONOVII, et in actis Societatis
Vpsaliensis descriptiones piscium nonnullorum, quas
ductu Cl. ARTEDII inseruit, postquam a. 1744.
Societati adscriptus erat. Veniendum est tandem
ad aliud genus meritorum. Quamquam ciuibus ae-
que ac exteris scribendo satis vberem vtilitatem ad-
iunxerat, praeterea tamen ingressus est curriculum,
in

in quo maxime patriae ciuiumque causa exerceretur. Nam anno h. f. 42 allectus est in Senatum Leiden-
sis ciuitatis, et ab hoc gradu altius adscendit ad mu-
nus Curatoris rerum pupillarium, hinc ad Scabina-
tum, quo magistratu ter functus est, donec bis accepta
Consulari dignitate ad summum ciuitatis locum pro-
motus est. Vt vero ex hoc tempore ciuitati nulla
ex parte defuit, ita nec a literis se abstrahi passus
est illius administratione, sed sic distinxit ciuiliū
curarum et doctrinae tempora, vt illas etiam in vsum
literarum conuerteret, et, cum honor Bibliothecarii
consulatu coniunctus esset, asservatas in bibliotheca
Leidenſi Clusianas schedas, de quibus antea diximus,
perlustraret. Nos vero, quibus propositum non
fuit, permagna Viri in rempublicam merita laudi-
bus cohonestare, sed instituta literaria narrare, et
nomini eius etiam nostro modo consulere, ita puta-
mus satisfactum esse hac narratione consilio nostro,
vt, qui haec legerit, et nos intelligat. GRONOVII
amantissimos fuisse, et nobiscum tam illustrem do-
ctrina Virum venerandum censeat.

Index scriptorum, quae edidit Cl. GRONOVIVS.

Dissertatio inauguralis sistens camphorae historiam.

Lugdun. Batau. 1715. 4.

Flora Virginica exhibens plantas, quas V. Cl. IO. CLAY-
TON in Virginia obseruauit atque collegit. Easdem
methodo sexuali disposuit, ad genera propria re-
tulit, nominibus specificis insigniuit et minus co-
gnitas descripsit I. F. GRONOVIVS, Pars prima *ib.*
1739. 8. recusa *ibid.* 743. 8. Pars secunda, *ibid.*
743. 8. Vtraque pars coniuncta denuo Eiusdem
opera et studio impressa est *ibidem* 1762. 4.

Index suppellectilis lapideae, quam collegit, in clas-
ses et ordines digessit, specificis nominibus ac

- synonimis illustravit. *Lugd. Bat.* 1740. 8. Editio altera longe auctior, *ibid.* 1750. 8.
- Flora Orientalis s. recensio plantarum, quas LEONH. RAUWOLFFUS 1573 - 1575 in Syria, Arabia, Mesopotamia, Babylonia, Assyria, Armenia et Iudaea crescentes observavit et collegit, earundemque ducenta specimina, quae in bibliotheca publica Lugduno Batava adservantur, nitidissime exsiccata et chartae agglutinata in volumen retulit. Has methodo sexuali disposuit etc. *ibid.* 1755. 8.
- A method of preparing specimen of Fish, by drying their skins. — exstat in *Philosoph. Transact. Angl. Vol.* 42. n. 463. p. 57.
- A Letter to PETER COLLINSON concerning a Water Insect, which being cut into several pieces, becomes so many perfect Animals. — exst. *ibid.* vol. 42. n. 466. p. 218.
- The Figure of the Mustela Fossilis communicated to Mr. PETER COLLINSON. — exstat *ibid.* vol. 44. n. 483. p. 451. tab. 2. fig. 1. et in *Act. Vpsal.* 1742. p. 79.
- Descriptio Cotti officulo pinnae dorsali primo longitudine corporis. — exstat in *Act. Vpsal.* 1740. p. 121. tab. 8.
- Pisces Belgii, seu piscium in Belgio natantium et a se observatorum catalogus — exst. in *Act. Vpsal.* 1741. p. 67. — item Belgice in *de Uytgez. Verhand.* etc. vol. 1. p. 145. et huius catalogi additamentum *ibid.* sistitur, vol. 1. p. 324.
- Salmo oblongus maxillae inferioris apice introrsum reflexo — exst. in *Act. Vpsal.* 1741. p. 85.
- Pisces Belgii rariores — exst. in *Act. Vpsal.* 1742. p. 79. tab. 3.
- Piscis scombri et percae descriptio — exst. in *Act. Vpsal.* 1744. p. 36. tab. 4.

XIV.

Continuatio indicis scriptorum physico - medicorum, quae anno 1761 prodierunt.

Le Clavessin électrique, avec une nouvelle Theorie du Méchanisme et de Phénomènes de l'Electricité par le P. DE LA BORDE. a Paris 12.

ERN. GOTTLÖB BOSE, Diss. inaug. de anastomoseos vasorum corporis humani dignitate, Resp. *Gottl. Frid. Fischer*. Lips. 4.

LUDOV. CLAUD. BOURDELIN, Quaest. med. vtrum homo sanus, qui et bene valet et suae spontis est, nullis obligare se legibus debeat? affirm. Resp. *August. Roux*. Parisiis 4.

ANDR. EL. BÜCHNER, Diss. inaug. de probe attendendis mixtionis imminutae et suppressae variis causis. Resp. *Petr. Ianssen*, Hal. 4.

Eiusd. Diss. inaug. de vasorum lymphaticorum glandularumque conglobatarum vtilitate. Resp. *Frid. Iac. Vogel*. ibid. 4.

Eiusd. Diss. inaug. de neglecta benigna febre catarrhali frequenti morborum pulmonalium causa. Resp. *Aug. Frid. Dohlhoff*, ibid. 4.

Eiusd. Diss. inaug. de cauto usu sternutatoriorum in apoplexia. Resp. *Adam Hildebrand*. ibid. 4.

Ei. Diss. *περι της Φλεβοτομιας ως εν αει αναγκαιας εν τοις οξεσιν αιμα και κακοηθεσι πυρετοις*: de venaesectione in febribus acutis malignis non semper necessaria. Resp. *Demetr. Nic. Karakassēs*. ibid. 4.

Eiusd. Diss. inaug. de vera podagrae sede et fomite, Resp. *I. H. Ge. Balth. Stolle*. ibid. 4.

SPIRIT. CLAUD. FRANCISC. CALVET, Diss. inaug. de lymphae secretionis natura et usu. Resp. *Dominic. Isidor Vicary*. Auenione, 4.

- SPIRIT. CLAUD. FRANCISC. GALVET, Diss. inaug. de haemorrhagiis internis. Resp. *Mich. Io-
seph. Dandrimont. Auenione. 4.*
- IO. FRID. CARTHEUSER, Diss. inaug. de branca
vrsina Germanica. Resp. *Ioan. Georg. Kunst. Frf.
Viadr. 4.*
- Eiusd. Diss. inaug. de saccharo. Resp. *Philip. Mendel,
ibid. 4.*
- Eiusd. Diss. theses quaedam miscellaneae de calore
et refrigeratione corporis humani naturali. Resp.
Abrah. Wolff. ibid. 4.
- CARL WILHELM. CARTHEUSERS *vermehrte Be-
trachtungen über einige Materien aus der Diätetic,
Glückst. u. Altona. 8.*
- Il Latte: Idilio di GIUSEPPE CERRECESI, in Mi-
lano 8. (*Decantatur poemate salubritas lactis, opti-
mi pro corpore humano nutrimenti*).
- A Treatise on the Disease called a cold by I. CHAND-
LER. London. 8.
- Nouvelles observations sur la Goutte et sur les qua-
lites de la Poudre ou Ptisane Balsamique, qui en
est le spécifique calmant, connue et approuvée
par les Chefs de la Médecine par. M. CHANVY
DE MONGERBET. a Paris 12.
- PETR. CHEVALIER, Quaest. med. an phthisi pul-
monari idiopathicae praecauendae, parca sed fre-
quens sanguinis missio? affirm. Resp. *Cosm. Aug.
Lexusier, Parisiis 4.*
- Abregé de l'Histoire des Plantes usuelles; dans le
quel on donne leur Noms differens, tant Fran-
çois que Latins, la maniere de s'en servir; la dose
et les principales compositions de Pharmacie, dans
les quelles on les emploie par feu PIERRE JEAN
BAPTIST CHOMEL, Nouvelle edition revue
corrigée et augmentée. Tom. I. II. a Paris 12.
Voll. 3.

Discorsi dell Dottore ANTONIO COCCHI, in Firenze, 4.

Observations et Reflexions sur la Colique de Poitu ou des Peintres; où l'on examine et l'on tache d'éclaircir l'histoire, la theorie et le traitement de cette maladie. Premiere Partie. Contenant l'histoire et l'explication d'une Colique metallique singuliere par M. COMBALUSIER, a Paris, 12.

The complete Distiller by COOPER. London. 8.

CAESAR COSTE, Quaest. med. an retina primum visionis organum? affirm. Resp. *Lud. Gilb. Boyrot de Ioncheres*, Doct. Med. Monspel. Parisiis 4.

DOMINIC. COTONNY, de aquae ductibus auris humanae internae Dissertatio. Neapoli. 8 mai. tab. aen.

L' Art des Forges et Fourneaux a fer par le Marquis de COURTIVRON et par M. BOUCHY, a Paris, fol. c. f.

HENR. NEPOM. CRANTZ solutiones difficultatum circa cordis irritabilitatem Viennae Austr. 8. c. f.

FRANCISC. AUG. FERDIN. GUENOTTE, Diss. inaug. sistens casum subluxationis vertebrae dorsi cum fractura complicatae post factam repositionem et varia dira symptomata duodecima demum septimana funestae, Argentorati. 4.

HENRIC. FRIDER. DELIUS, Diss. inaug. sistens problema chemicum de alcali primigenio. Resp. *Georg. Frid. Hühfchmann*, Erlangae 4.

PETRI PAULI DESEANS specimen practicum de hydrope peritonaei faccato memorabili casu firmato, edidit D. RUD. AUG. VOGEL, Goett. 4.

Del' air, de la terre et des eaux de Boulogne sur Mer et des environs. Nouvelle edition, corrigée et considerablement augmentée, a la quelle on a joint Constitution Epidemique, observée suivant
les

les principes, d' HIPPOCRATE, a Boulogne sur mer en l'année 1759; avec des Dissertations sur la Maladie Noire, les Eaux du Mont-Lambert, et l'origine des Fontaines en général par M. DESMARS, Méd. Pensionnaire de la Ville; a Paris, 12.

IOAN. IACOB. DUVAL. Diss. med. de inhalatione externa. Lugd. Bat. 4.

Le Gentil-Homme Cultivateur, ou Corps complet d'Agriculture, tire de l'Anglois et de tout les Auteurs, qui ont le mieux écrit sur cet Art; par M. DUPUY DEMPOTES. Tom. I. II. a Paris, 4. c. f.

Idem liber ibidem eodemque anno in duodecima forma prodiit; continetur vero quatuor voluminibus.

I. PETR. EERHARDI conspectus medicinae theoreticae in tabulas redactus. Pars II. Pathologia generalis et specialis. Halae, 8.

Das hundertjährige Alter, welches etliche Männer und Frauens, die noch am Leben sind glücklich überstanden. Es wird zugleich Rath und That gegeben, wie man bey ordentlicher Lebensart, Gemüthsruhe und mässiger Arbeit, nach dem Exempel unserer Väter auch sehr alt werden und Kindes- Kindes- Kinder erleben könne, an das Licht gestellt von Chrysostomo Erasmo Ehrlichmann. Frf. u. Leipz. (Verum auctoris nomen CHRISTIAN. ERN. ENDTER).

M. F. L. EISFELDS Versuch einer natürlichen Beschreibung des bey Quedlinburg befindlichen Gesundbrunnens oder Mineral- und Stahlwassers, Leipzig und Quedlinburg. 8.

BALTHASAR ERHARDS oekonomische Pflanzenhistorie, nebst dem Kern der Landwirthschaft, Garten- und Arzneykunst 10ter und 11ter Theil. Ulm und Memmingen, 8. Voll. 2.

IOAN. FRIDER. FASELIUS, Diss. inaug. de nervis exhalantibus, Resp. Io. Theod. Koehler. Ien 4.

Obser.

Observations sur differens Cas singuliers, relatifs à la Médecine Pratique, à la Chirurgie, aux Accouchemens et aux Maladies Vénériennes; aux quelles on a joint quelques reflexions en faveur des etudians par M. PHILIPP. FICHET DE FLECHY, a Paris 8.

Påminnelse af wid sweriges almänna och enskylta Hushållning af I. FISCHERSTRÖM. Stockholm. 8.

Traité de l'Asthme, contenant la description, les causes et le traitement de cette maladie, par JEAN FLOYER, traduit de l'Anglois, a Paris 12. (*Ex anglica in gallicam transtulit linguam* Cl. IAU, M. D.).

Dissertation sur la Morve, en forme de Mémoire, présentée au Mois d'Avril 1761, à l'Académie Royale des Sciences par le Sieur la FOSSE, le fils: avec un Extrait des Registers de l'Acad. Roy. des Sc. du 24 Juillet 1761. a Paris 12.

Inträdes om Finska Slimatit och diss fölgder i Landets Hushållning för Kongl. Vetensk. Acad. d. 14 Jan. 1761 af ANDR. GADD. Stockh. 8.

PETR. IOSEPH. GAINÉ, Diff. inaug. de acido infantum. Trai. ad Rh. 4.

Comentarios a las Ordenanzas de Minas, dedicados al Catholico Rey, Mestro Sennor Don Carlos III por Don FRANCISCO XAVIER DE GAMBOA, Colegial de el Real, y mas antiquo de San Ildefonso de Mexico, Abogado de la Real Chancilleria de aquella Ciudad, y de Presos de el Santo Oficio de la Inquisicion, Su Consultor por la Suprema, y Diputado de el Consulado, y Comercio de la Nueva-Espanna on la Corte de Madrid. En Madrid, fol.

THEOBALD MATTH. GASSER, Diff. inaug. de morbo nigro HIPPOCRATIS. Argent. 4.

An Account of the structure of the Eye, with occasional remarks on some Disorders of that Organ by THOMAS GATAKER. London. 8.

LUDOV. GERARDI Flora Gallo-Prouincialis, Parisiis, 8. cum. icon. aen.

IOAN. GESNER, Diss. de variis annonae conservandae methodis earumque delectu. Turici 4. c. tab. aen.

Dissertation sur le Thermometre Botanique par M. GESNER. a Basle, 4.

EDMUNDUS ALEXIS GILLET, Diss. de medicamentis compositis. Monspeli, 4.

GEORG. ANDR. GLOXIN, Diss. de ischuria. ibid. 4.

Flora Ingrica ex schedis STEPH. KRASCHENINNIKOW, Botan. et Histor. Naturalis Profess. quondam Petropolitani, confecta et propriis observationibus aucta a DAVIDE DE GORTER. Petropoli. 8 mai.

Gezuiverde Geneeskunst, of kort Onderwys der meeste inwendige Ziekten nutte der Zee en Veld-Chirurgÿns door I. GORTER t' Amsterd. 8. (*Editio tertia*).

D. GEORG. FRIEDR. GUTERMANN'S *Unterricht von äusserlichen oder chirurgischen Arzneimitteln, und ihren unterschiedlichen Classen und Graden, Erkenntniss, Gebrauch, Nutzen, Dosi und Art und Weise, wie sie ihre Wirkung thun* 1. und 2ter Theil. Augsburg, 8.

Vernünfftige und in wohlüberlegter Erfahrung gegründete Bedenken über mancherley aus Unwissenheit, wann und wie ein Kind in Mutterleibe zu wenden, durch Missbrauch stumpfer und scharfer Instrumenten verunglückte Geburten, wie hingegen nach der ächten Entbindungskunst die Kinder und Mütter schonlich zu behandeln und im Leben zu erhalten seyn, nach eingehohltẽ Gutachten herausgegeben von D.

GEORG.

GEORG. FR. GUTERMANN. *Mit einem Responso der löbl. medicinischen Facultät zu Helmstädt und ergangnen obrigkeitlichen Verordnungen 1 und 2ter Theil. Frankf. u. Leipz. 8.*

ANTON. DE HAEN Pars sexta rationis medendi in nosocomio practico, quod in gratiam et emolumentum medicinae studioforum edidit Maria Theresia, Vindobonae. 8.

Eiusdem libri partis IIdae editio secunda, ibid. 8.

Eiusdem ratio medendi in nosocomio practico etc. Tomus I. in quo tres priores partes continentur. Tomus II. partes IV et Vtam complectens: accedit eiusdem Auctoris de colica Pictonum dissertatio. Parisiis 12.

Difficultates circa modernorum systema de sensibilitate et irritabilitate humani corporis orbi medico propositae ab ANTON. DE HAEN. Viennae Austr. 8 mai.

HEINR. HAGEN *physisch chymische Betrachtungen über den Torfin Preussen, Königsberg, 4.*

ANT. NIC. HAGG. Diss. inaug. de hydrophobia, eiusque per mercurialia potissimum curatione. Argentorat. 4.

IOH. SAM. HALLENS *Werkstätte der heutigen Künste. oder die neue Kunstgeschichte. Mit Kupfern und Vignetten. Erster Band, Brandenb. u. Leipz. 4.*

Elementa physiologiae corporis humani, Auctore ALBERTO V. HALLERO. Tomus III. Respiratio, Vox. Lausannae, 4.

Eiusdem ad viri illustris ANTONII DE HAEN difficultates apologia (f. l.) 8. (*Bernae, prodiit etiam Lausannae*).

Eiusd. libellum germanice reddidit praefationemque adiecit D. H. E. HIRZEL sub hac indice: *Herrn ALBR. V. HALLERS Vertheidigung gegen die Einwürfe, welche Herr ANTON V. HAEN wider die*

- die Lehre der Reizbarkeit und Empfindlichkeit der Theile des menschlichen Leibes vorgetragen, Zürich. 8.*
- Traité de la Culture des Terres par M. DU HAMEL DU MONCEAU. Tome VI. a Paris 12.
- L' Art du Chandelier par M. DU HAMEL DU MONCEAU, a Paris fol. c. f.
- Philosophiae naturalis siue Physicae dogmaticae Tom. I. continens physicam generalem, coelestem et aetheream: tanquam continuationem systematis philos. CHRISTIANI L. B. DE WOLF, Auctore MICH. CHR. HANOVIO Halae 4. c. f.
- IOH. IAC. HARTMANN'S *Neue Gartenerforschung, worinnen von Vermehr - Fortpflanz - und Erhaltung nicht allein der Orangerie, sondern auch von Lusthecken, Pyramiden, Alleen, Spalieren und Lustwäldern ausführlicher Unterricht gegeben wird. 1ster Theil. Erfurt, 8.*
- Historia medica trium morborum, qui anno 1760 frequentissime in nosocomio occurrebant, cui adiecta est notabilium obseruationum anatomicarum decas. Auctore I. G. HASENÖRHL, Vindobon. 8.
- I. N. HELD, *medizinische Gedanken über den 147 und 149 Articul der Römisch-Kayserl. und des heil. Römischen Reichs peinliche Halsgerichts-Ordnung, Erf. u. Leipzig, 4.*
- GEORG. MELCH. GEDEON HENCKEL, *Diff. inaug. exhibens experimenta chymica de naphtha nitri etiam per ignem elaboranda. Erford. 4.*
- IOACHIM FRIEDR. HENCKELS *Abhandlung von der Geburtshülfe, m. K. Berlin, 8.*
- N. LAS. HENNER. *conatus physico-experimentales de corporum affectionibus tum generalibus tum specialibus. Pars secunda de attributis corporum specialibus opus posthumum. Würceburg. 8. c. tab. aen.*

FRIDER. HERLITZ, Diff. de ictero, speciatim epidemico. Gotting. 4.

GOTTL. THOM. HERRMANN, Diff. inaug. de remedium quorundam ad placentam vterinam expellendam commendatorum, tam insufficienti, quam noxio usu. Halae 4.

The vegetable System, or the internal Structure and the Life of Plants, their Parts and Nourishment explained; their Classes, Ordres, Genera and Species ascertained and described in a Method altogether new; comprehending an Artificial Index and a Natural System; with figures of all the plants designed and engraved by the Author. The whole from Nature only by JOHN HILL. Vol, II. containing the whole Series of Plants whit Radiated Flowers. Vol. III. containing the Entire Classes of Plants with Tubulate and Ligulate Flowers. London, fol. mai. Voll. 2.

Entwurf eines Lehrgebäudes von Erzeugung der Pflanzen von D. I. HILL, mit Kupfern erläutert. Aus dem Englischen übersetzt und von D. GEORG. LEONHARD HUTH übersehen. Nürnberg, 8.

JOH. HILLS *Entwurf eines Lehrgebäudes von Erzeugung der Pflanzen. Leipzig, 8. m. K.*

An Inquiry into the means of improving medical Knowledge by examining all those methods, who have hinderd or increas'd its improvement by WILL. HILLARY. London, 8 mai.

Die Wirthschaft eines philosophischen Bauers entworfen von H. E. HIRZEL. Zürich, 8.

I. W. HÖNERTS *kurzgefaßte Anlegung und Unterhaltung eines wohlbestellten Blumengartens, nebst genauer Beschreibung der Art, Gestalt, Pflege etc. Bremen, 8.*

Les Principes de l'Agriculture et de la Vegetation: Ouvrage traduit de l'Anglois de M. FRANCOIS Tom. XI. Pars IV. A a a HOME.

HOMER. Au quel on a joint deux Memoires nouveaux sur la maniere de préserver le froment de la corruption et de la conserver. a Paris 12. (Ex anglica in gallicam transtulit linguam Abb. GUE-NEE).

Idem liber eodem anno Amstelodami est recus.

IOANNIS NEPOM. AB HUMBOURG observationes de hydrocelis cura radicali Vindobonae, 8.

CAR. FRID. HUNDERTMARK, Diss. inaug. de vrina cretacea. Resp. Ioan. Sam. Pilling. Lipsiae, 4.

L. G. IACOBI *Abhandlung von der rechten Art die Eichbäume zu säen, zu pflanzen und zu erhalten.* Halle, 8.

L. CHRISTIAN IAHNS *praxis medica theoretico-clinica, welche in 2 Theile abgefasst ist. Der 1. Theil enthält in sich 3 Sectiones. In der 1. ist eine theoretische Einleitung zur Pathologie. In der 2 zur Semio- logie und in der 3 zur Therapie. Der 2te Theil ist ebenfalls in 3 Sectiones eingetheilet; in der 1 wird gezeigt, wie die Krankheiten des Haupts, in der 2 der Brust und in der 3 des Unterleibes zu curiren sind.* Dresd. u. Leipz. 8.

CAROLI IENTY demonstratio vteri praegnantis mulieris cum foetu ad partum maturo. Latine aequae ac germanice opera C. C. SCHMIEDELI) Norimb. fol. c. tab. aen.

A. Short History of Brighthelmston with remarks on its Air and an Analysis of its Water, particularly of an uncommum mineral one by JOHNSTON. London, 8.

FRIDER. CHRISTIAN. TUNCKER, Diss. inaug. de causis luxationum internis. Resp. Frid. Aug. Weitz. Halae, 4.

Eiusd. Diss. inaug. Vindicias virginum, quae ex vteri vitio sub contumelia quidem sed maxima innocen-
tia

tia aegrotant, in tabula exhibens. Resp. *Christ. Frideric. Shelhammer.* ibid. 4.

Vollständige Abhandlung von denen Manufacturen und Fabriken; 2ter Theil, welcher alle einzelne Manufacturen und Fabriken nach der Eintheilung ihrer Materialien abgehandelt von IOH. HEINR. GOTTL. VON IUSTI. Kopenhagen, 8.

Ebendesselben gesammlete chymische Schriften, worinnē das Wesen der Metalle und die wichtigsten chymischen Arbeiten vor dem Nahrungsstand und das Bergwesen ausführlich abgehandelt werden. Zweyter und letzter Band, Berlin u. Leipz. 8.

Ebendesselben Abhandlungen von der Vollkommenheit der Landwirthschaft und der höchsten Cultur der Länder. Ulm. 8.

En Refa til Norra America på Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens befallning och Publici Kostnad, förrättad af PEHR KALMS. T. III. Stockholm. 8

CAR. FRID. KALTSCHMIED, Diss. inaug. de medicamentorum consolidantium modo agendi et usu. Resp. Benj. Traug. Cotta, Ienae, 4.

Eiusd. Progr. de parte ossis humeri exstirpata brachio tamen post consolidationem integram seruante longitudinem. ibid. 4.

Eiusd. Diss. inaug. de prognosi status morborum rite formanda. Resp. Mart. Frideric. Henrici. ibid. 4.

L. H. KEILS compendiöses, doch vollkommnes anatomisch - chirurgisch - und medicinisches Handbüchlein. Königsberg. 8.

Hypothese des petits Tourbillons, justifiée par ses usages, ou l'on fait voir, que la Physique, qui doit son commencement au Tourbillons, ne peut mieux être perfectionnée, qu'en poussant le principe, qui l'a fait naître; par M. KERANFLECH. a Rennes, 12.

IOAN KIES, Diss. de aere. Resp. Iohan. Frider. Sehner, Tubingae, 4.

TH. KIRKLANDES *Abhandlungen von den Brandschäden, nebst einer Untersuchung derer, wider den Gebrauch der Fieberraude in Brandschäden gemachten Einwendungen. Aus dem Englischen übersetzt von GR. LEONH. HUTH, Nürnberg. 8.*

IOAN. THAD. KLINGKOSCH, Diss. inaug. sistens theses physiologicas de sensibilitate et irritabilitate ex experimentis factis deductas. Pragae, 8.

IO. HIERON. KNIPHOFII botanica in originali s. Herbarium viuum, in quo plantarum tam indigenarum, quam exoticarum peculiari quadam operosaque enchiresi atramento impressorio obductarum nominibusque suis ad methodum illustrium nostraeui botanicorum LINNAEI et LUDWIGII insignitorum elegantissima ectypa exhibentur opera et studio IO. GODOFR. TRAMPE. Centuria VIII, Hal. fol.

IO. FRIDER. KNOLLE, epist. gratul. continens decadem librorum anatomicorum rariorum. Lips. 4.

Regnum Florae: *Das Reich der Blumen mit allen seinen Schönheiten nach der Natur und ihren Farben vorgestellt: bis 300 Blat in Kupfer gestochen und illuminirt von GEORG. WOLFG. KNORR, Nürnberg, Fol.*

Lapides ex celeberrimorum virorum sententia diluvii vniuersalis testes etc. *Sammlung von Merkwürdigkeiten der Natur und der Alterthümer des Erdbodens zum Beweise einer allgemeinen Sündfluth aus dem Reich der Steine bewiesen; in Kupfer gestochen und mit Farben ausgedruckt von G. W. KNORR. 2ter Theil bis 37 Blat. ibid. Fol.*

Deliciae naturae selectae: oder Auserlesenes Naturalien cabinet, welches aus den drey Reichen der Natur

tur zeigt, was behalten und gesammelt zu werden verdient; bis 31 Blat; in Kupfer gestochen und illuminirt von G. W. KNORR. ibid. fol.

IOH. GOTTLIEB KOELREUTERS *Nachricht von einigen das Geschlecht der Pflanzen betreffenden Versuchen und Beobachtungen. Leipz. 8.*

Naturspiegel, worinn der Mensch vom ersten Augenblick seiner Werdung bis zu seinem Auschluss aus Mutterleib in einer dreysfachen Abbildung zu ersehen — — deme einige anatomische Erklärung nebst vielen besonders denen Neo - Confessariis dienlichen Anmerkungen, wie auch die ausführlichen Ursachen wegen Fruchbarkeit oder Unfruchtbarkeit beyden Geschlechts vorangefüget werden, gezeichnet und beschrieben von NIC. AMBR. KRAFF. Basel, fol. c. f.

Tankar om den Wanmæckt, uti hwilken Finska Landman sig befinner af I. KRASTMANN. Stockholm, 8.

Progr. quo CAR. CHRIST. KRAUSE institutionum medicarum ab HERM. BOERHAAVIO digestarum Sphos 737-744 commentatur Lips. 4.

D. IOH. CHRISTOPH KÜHNST'S *medizinisches Gutachten von der so genannten Rindviehseuche, derselben Ursache, Praeservation und Cur, auch was von der Ablederung des gefallenen Rindviehes zu halten sey, mit etlichen Anmerkungen nebst einer Vorrede eines vornehmen Rechtsgelehrten, Leipz. 8.*

L'Art de faire le Papier par M. DE LA LANDE. 2 Paris, fol. c. tab. aen. 14.

GEORG. AUG. LANGGUTH, Progr. de modestia sternutantium medica. Witteberg. 4.

Eiusd. Diss. inaug. sistens causas principales, quae efficiunt, quo minus in morbis curandis finis exoptatus semper obtineatur. Resp. Sam. Gottfr. Füssel, ibid. 4.

Historia medica biennalis morborum ruralium, qui a verno tempore anni 1759 vsque ad finem hyemis anni 1761 Laxenburgi et in vicinis undique oppidis pagisque dominati sunt; complectens memorabilem rarioremque febrium intermittentium et de earum genere remittentium epidemiam auctore FRANC. IOSEPH. LAUTTER. Vindob. 8.

MARTIN. FROBENIUS LEDERMÜLLERS *Microscopische Gemüths- und Augenergötzung: bestehend in ein hundert nach der Natur gezeichneten und mit Farben erleuchteten Kupfertafeln, samt deren Erklärung* Nürnberg) 4.

Cadmiologia, oder Geschichte des Farben Kobolds nach seinen Nomen, Arten, Lagerstädten, darbey brechenden Metallen, Mineralien, Erzten und Steinen, wie auch dessen Verhältniß nach der Probierkunst, dessen Gebrauch und andern dabey vorkommenden Umständen; nebst Beschreibung derer darzu gehörigen Oefen, Maschinen und Arbeiten, theils aus andern Schriften, grösstentheils aber aus eigener Erfahrung und sorgfältig angestellten Versuchen und Wahrnehmungen zusammengetragen und mit denen nöthigen Kupfern erläutert von IOH. GOTTLOR LEHMANN, Erster Theil. Königsberg. 4.

Eiusd. *Probierkunst*, Berlin, 8.

Eiusd. *Physicalisch-chymische Schriften*, als eine Fortsetzung der *Probierkunst*, ibid. 8.

PETR. ANT. LEPY, Quæst. med. an bis in die cibari præstet, quam semel? aff. Resp. Simon Vacher. Parisiis, 4.

IOAN. LETCH, tentamen medicum de haemorrhoidibus, Lugd. Bat. 4.

L'Art des Accouchemens démontré par des principes de Physique et de Mechanique, pour servir d' introduction et de base a des Leçons particulières
par

par M. ANDRE LEVRET. Seconde Edition corrigée et considérablement augmentée tant dans le Corps de l'Ouvrage, que dans le Supplément avec addition de deux nouvelles planches et d'un abrégé du sentiment de l'Auteur sur les aphorismes DE MAURICEAU. à Paris. 8 mai.

Herrn LEVRETS *Wahrnehmungen von den Ursachen und Zufällen vieler schwerer Geburten. Mit Anmerkungen über die bishero vorgeschlagenen und angewandten Mittel dieselben zu enden; nebst einigen neuen Mitteln dazu viel leichter zu gelangen. Zweyter Band, herausgegeben und mit Kupfertafeln vermehrt von D. IOH. IULIUS WALLBAUM. Lübeck u. Altona, 8.*

An Experimental History of the Materia medica; or of the Natural and Artificial Substances made use of in Medicine; containing a compendious View of their Natural History, an Account of their Pharmaceutic Properties, and an Estimate of their Medicinal Powers, so far as they can be ascertained by Experience, or by rational Induction from their sensible Qualities; by WILLIAM LEWIS, M. B. F. R. S. London, 4 mai.

FRID. WILH. a LEYSER *flora Halensis exhibens plantas, circa Halam Salicam crescentes, secundum systema sexuale Linnaeanum distributas. Hal. 8.*

Précis de la Médecine Pratique; contenant l'histoire des Maladies, avec des observations sur les pointss les plus interressans par M. LIEUTAUD. Nouvelle edition. a Paris, 8.

Dissertation de JEAN. PHILIP. DE LIMBOURG sur les Affinités Chymiques, qui a remporté le Prix de Physique de l'an. 1758 quant a la partie chymique au Jugement de l'Academie Royale des Sciences, Belles Lettres et Arts de Rouen, a Liege, 12.

CAR. LINNAEVS, Diff. in qua potus coffeae leuiter adumbratur, Resp. *Henr, Sparschuch*. Vpsal. 4. Eiusd. Diff. inaug. Diaeta acidularis, Resp. *Eric. Vigelio* ibid. 4.

I. L. L. LÖSEKENS *Therapia specialis interna: oder gründliche Anweisung zur Erkenntniß und Cur der innerlichen Krankheiten 1ster Theil, welcher die Lehren von den einfachen und zusammengesetzten Krankheiten, die den ganzen Leib befallen, in sich enthält. 2ter Theil, welcher die Lehren von den Mängeln des Kopfs und der Brust enthält. Dresd. u. Warschau, 8. Eiusd. Neue und seltene anatomisch - chirurgisch - medicinische Wahrnehmungen mit Kupferstichen erläutert, Berlin. 8.*

Di TITO LUCRETIO CARO della Natura Libri 6 Tradotti da ALESSANDRO MARCHETTI Tom. I. II. in Londra, 12.

CHRIST. GOTTL. LUDWIG. Progr. de vita molli causa debilitatis in morbis, Lipsiae. 4.

*Zufällige Gedanken auf was Art einem grossen Herrn in foro medico und was die Gesundheit einer Unterthanen betrifft, Nützliches in seinem Lande könnte an gegeben werden, entworfen von D. C. G. M. * * * Königsberg, 4.*

Dell' Inoculazione del Vajuolo. Trattato istorico, politico, fisico, morale di SAVERIO MANETTI, in Firenze, 4.

ANDR. SIEGM. MARGGRAFS *chymische Schriften: Erster Theil. Berlin, 8. m. K.*

Elemens des Sciences et des Arts litteraires, traduits de l'Anglois de BENIAMIN MARTIN, a Paris. 12. Voll. 3. (*In secundo volumine, praeter historiam et philosophiam, physiologia, et in tertio botanica, anatomia pharmacia et oeconomia traditur*).

ANTONII MATANI, Pistoriensis, in Acad. Pisana P. Prof. soc. Monspell. Sod. de aneurismaticis praë-

praecordiorum morbis, animaduersiones; editio italica secunda correctior et auctior. Liburni, 4.

Conspectus historiae medicorum chronologicus in usum praelectionum academicarum confectus a GEORG MATTHIAE. Goetting. 8.

Het XIX Classe van de Genera plantarum van de Heer CAR. LINNAEUS Syngenefia genaamt, opgeheldert en vermeerdert. Mitsgaders een berigt van een Nieuw-Botanisch Stuk, aangaande het leeren kennen der Planten kort na hunne Geboorte of Uitspruiting uyt hun Zaad. Als meede de Beschryving en Afbeelding van een zeldzame en zonderlinge Zee-Plant, door DAVID MEEZE, Hovenier in de Kruidt-tuin aan Frieslands Hoo-ge Shole te Franeker, te Leeuward. 8 mai. c. 8. tab aen.

IOAN. HENRIC. MEINCKE, Diss. inaug. de oeconomia foetus in vtero humano Trai. ad Rhen. 4.

SALOM. THEOPH. DE MEZA, Med. Hafn. armamentarium medicum s. materia medica, quo adducuntur omnia suppellectilia medica ex tribus regnis petita nec non chemica praeparata cum variis raris et curiosis et huc vsque ignotis Hafn. 8.

PAUL. H. G. MOEHRINGII historiae medicinales, iunctis fere vbique corollariis praxin medicam illustrantibus. Amstelod. 8. c. tab. aen.

CHRIST. MOLINARII epistola ad Cl. virum ANT, STOERK, qua mulieris a scirrho curatae historia exponitur. Viennae, 8.

Herrn ALEX. MONRO's, des Aeltern, Knochenlehre, nach der Ausgabe des Herrn SUE übersetzt, und mit der sechsten Englischen Ausgabe sorgfältig verglichen, nebst der Nervenlehre eben dieses Verfassers und einer Erklärung von der abwechselnden Bewegung des Herzens, wie auch einer Beschreibung des menschlichen Milchsaftsbehälters und der Milchsaströhre,

aus dem Englischen übersetzt und mit nöthigen Register versehen durch CARL CHRISTIAN KRAUSE.
Leipz. 8.

PETRI VAN MUSSCHENBROEK *elementa physicae*, quibus nunc primum, in gratiam studiosae iuventutis, accedunt ubique auctaria quamplurima, frequentissimae annotationes, disputatio physico-historica de rerum corporearum origine ac de-
mum de rebus coelestibus tractatus, opera et studio ANTONII GENUENSIS. Editio tertia Veneta, tabulis aeneis ornata, Tom. I. II. Venetiis, 8. Voll. 2.

ALEXANDR. NAHUYs, tractatus chemicus continens noua quaedam experimenta cum basi salis marini, nitri et aluminis. Pars I. adiecta est eiusdem Auctoris oratio de quaestione: vtrum vrosopus ex sola vrinae inspectione morbos quorumuis aegrotantium rite detegere iisque ex arte mederi possit. Amstelod. 8.

Trattato chirurgico di ANGELO NANNONI sopra la semplicità del medicare i mali d'attenenza della Chirurgia. In questo Trattato, come nel restante del libro si trovano riunite molte e varie esperienze, osservazioni, e ragionamenti, cose tutte, che molto giovano per lo stabilimento del buon metodo di medicare mali appartenenti al Chirurgo, introdotto alla lettura del seguente Trattato con un discorso fatto sopra alcuni fatti seguiti dopo finita la stampa del presente Libro. Tomo Primo, in Firenze. 4.

Physicalische Abhandlung von der goldnen Ader, welche sowohl die Eigenschaften, Wirkungen und Ursachen, als auch die Heilungsart derselben in sich faßt zum allgemeinen Nutzen herausgegeben von D. ERNST IER. NEIFELD, Züllichau. 8.

ERN. ANT. NICOLAI, *Diff. inaug. de congesti-
bus. Resp. Ioan. Frider. Wilhelmi Ienae 4.*

Eiusd. *Diff. inaug. de pulsibus Resp. Iodoc. Ehrhart,
ibid. 4.*

Eiusd. *Progr. IV et vltimum exponens rationem
structurae quarundam auris partium. ibid. 4.*

Eiusd. *Progr. exhibens quaedam de cordis et arte-
riarum in sanguinem actione. ibid. 4.*

Eiusd. *Progr. I. de causis pelluciditatis partium cor-
poris humani praesentis et sublatae. ibid. 4.*

ANDR. NUNN, *Diff. inaug. de affectibus rheuma-
tico - arthriticis ex emanatione mensium. Resp.
Carol. Frider. Hauswald. Erfordiae, 4.*

Delle Acque di Recoaro, et delle Regole concer-
nenti il loco uso: *Dissertazione di HOR. MARIA
PAGANI. in Vicenza, 8.*

PAULAE ANDR. PARENTI *de dosibus medica-
mentorum liber singularis in ordinem alphabeti
digestus, quo ex scriptoribus optimis et praxi fide-
lissima pro diuersa hominum aetate plerorumque
tam simplicium, quam compositorum remediorum
usitata et legitima quantitas determinatur, cum prae-
fatione HIERONYMI DAV. GAUBII, Editio
tertia multo emendatior, Lugd. Batav. 8.*

*Eandem hanc libri huius editionem eodem anno Krause,
bibliopola Viennensis recudendam curauit Viennae, 8.*

*Idem liber, ab ipso Auctore vero multum auctus eo-
dem anno prodiit sub hoc indice: Dosium tum ad
simplicia, tum ad composita medicamenta spe-
ctantium index omnium, qui haecenus prodierint,
locupletissime auctus et clarissimorum Authorum
eruditionibus cum chemicis tum botanicis et Ga-
lenicis nouiter ac longe exornatus, variisque hu-
mani corporis aetatibus accommodatus PAULI
ANDREAE PARENTI, vna cum Antidotario
chirurg-*

chirurgico in calce libri ab eodem excogitato, chirurgiae professoribus elargito. Bononiae, 4.

Alia aucta huius libri editio eodem anno prodiit Venetiis, quae in ipso indice eius vocatur Editio post duas Bononienses prima Veneta. 4.

Dictionnaire de Physique, dédié a M. le Duc de BERRY par le P. AIME HENRI PAULIAN. à Avignon. 4. c. f. Voll. 3.

Coniectures nouvelles sur les causes physiques des phenomenes électriques pour servir de nouveau Prospectus au Grand Dictionnaire de Physique par le P. AIM. HENR. PAULIAN. à Avignon. 4.

MICH. PERRIER, Diss. de bradyspermatismo. Monspeli, 4.

Extrait du nouveau Systême de Physique et d'Astronomie; ou du Systêm Electrique de l'Univers de M. DE LA PERRIERE, Chevalier-Seigneur DE ROIFFE a Paris, 12.

CARL PETERSEN Diss. om Metallernes calcinationer i Eld. Vpsal.

Bibliothèque choisie de Médecine, tirée des ouvrages periodiques tant françois qu'etrangeres avec plusieurs Pièces rares et des Remarques utiles et curieuses, avec un très-grand nombre des figures gravées en taille douce; par M. PLANQUE. a Paris, 4. Voll. 6. (*Duplici in forma vno eodemque tempore hic prodiit liber, in quarta nimirum et in duodecima, ut appellant: numerus itaque voluminum dispar est, in quarta quippe forma sex tantum, in duodecima vero duodeviginti iam prostant volumina*).

ANTON. GUIL. PLAZ. Progr. de natura plantas muniente. Lipsiae, 4.

Insecta musaei Graecensis, quae in ordines, genera et species iuxta systema naturae CAROLI LINNAEI digessit NIC. PODA. Graecii. 8.

Infor-

Infortuni del Vajuolo e methodo di andarne al riparo, opera del Conte SILVESTRO ANTONIO PONTICELLI, in Parma, 8.

IOH. HEINR. POTT *physicalisch chymische Abhandlung von dem Urinsalze und dessen weitläufigen Anwendung, nebst einem neuen apologetischen Anhang*, 2te Auflage. Berlin. 4.

Eiusd. *wichtige und ganz neue physicalisch chymische Materien mit vielen Experimenten ausgeführet, samt einer chymischen Zerlegung der Vorwürfe und Beschuldigungen. die ihm der Herr Bergrath von Iusti in dem 2ten Theile seiner chymischen Schriften zur Last legen will.* ibid. 4.

Cl. VIRO D. FRANCISCO SERAO in Reg. Neapolitana Vniuersitate Pub. Med. Professori D. CAESAR POZZI, P. Matthes. Professor. Romae, 4.
(*Perstringuntur, in hac epistola experimenta a Cl. DE TURRE capta, de figura particularum sanguinis*).

Observations on the Diseases of the Army by JOHN PRINGLE. The third Edition enlarged, London. 8.

IOSEPHI QUARIN *tentamina de cicuta*. Vienn. 8.
FRID. LUDOV. ALBERT. RAUCH, *Diss. inaug. de haemoptysi*. Argentor. 4.

La Fabrique des Ancres par M. DE REAUMUR, à Paris fol. c. tab. aen.

L'Art de l'Epinglier par le même. ibid. fol. c. tab. aen.

HENR. IOSEPH. REGAE *tractatus duo de vrinis. Prior Quaestio Quodlibetica, an vlla scientiae medicae inuestigatione, aut experimento, quispiam possit ex sola vrinarum inspectione morborum naturam ad medelam dignoscere? Alter de vrinis vt signo: In quo ordinarius et naturalis hominis sani vrinae ad pectus eiusdemque ab eo mutatae constitutio morbi tempore proponitur, in causas*

causas inquiritur et quid singulae variationes indicent, tam ex veterum, potissimum HIPPOCRATIS quam recentiorum observatione exponitur. Frf. ad Moen. 8.

D. REINHARDS *verletzte Leber. Glogau, 8.*

ANT. RELHAN'S short History of Brighthelmston with Remarks on its air and analysis of its water, particularly of an uncommon minerale one by JOHNSTON. London, 8 maior.

CLAUD. ANTON. RENARD, Quæst. med. an literatis vita coelebs? aff. Resp. Lud, Gilbert. Boyrot de Ioncheres. Parisiis, 4.

GASPARDUS IOANNES RENE, Quæstiones medicæ duodecim pro regia cathedrâ vacante defensæ. Monspeli, 4.

MATTHIAS RICHEVILLE, Diss. inaug. an, vt saepius chronicorum officina ventriculus, ita et acutorum fomes? Trai. ad Rhen. 4.

GEORG. GOTTL. RICHTER. Progr. de antiquitate et salubritate victus animalis, Goett. 4.

COLLINE ROBERTSONE, Diss. inaug. de expuitione sanguinis e pulmonibus editi. Trai. ad Rh. 4.

NICOL. LE ROY DE S. AIGNAN Quæst. med. — an a perito *Χημείας* medico, quam plurima *ὀφέλειās* praecepta salubriora, certiora dentur? aff. Resp. Cosma Aug. Lezurier, Parisiis, 4.

A methodical Synopsis of Mineral Waters by RUTTY, London. 4.

AUG. SCHARSCHMIDTS *Nachrichten von dem Gesundbrunnen bey Freyenwalde. Berlin, 8.*

Der wunderbare und vielleicht in der Natur noch nie erschienene Eulenzwitzer, nebst der Baumraupe, aus welcher derselbe entstanden, und welche vor einigen Jahren an vielen Orten Sachsens überaus grossen Schaden gethan hat, beschrieben und mit einigen auf die Natur dieser Raupen sich gründende Vorschlägen
sie

sie am leichtesten zu verringern und am sichersten auszurotten, begleitet von IAC. CHRIST. SCHAEFFER. Nebst einer Kupfertafel mit ausgemahlten Abbildungen. Regensburg, 4.

Eiusd. piscium Bauarico - Ratisbonensium pentas, cum tabulis 4. aere incis. icones, coloribus suis distinctas, exhibentibus. ibid. 4.

Eiusd. icones et descriptio fungorum quorundam singularium et memorabilium; simul fungorum Bauariae icones, natiuis coloribus expressae, editioni iam paratae, propediem euulgandae denuntiantur. Ratisbonae, 4.

Idem libellus eodem anno Germanice quoque prodit.

IOAN. PHILIP. BONAVENT. SCHALLER, Diss. inaug. de ialappa. Argentor. 4.

D. G. SCHREBERS *Sammlung verschiedener Schriften, welche in die oekonomische Policey und Cameralwissenschaften einschlagen. 7 u. 8ter Theil, Halle, 8. m. K.*

O. HENRIC. SCHÜTTEI Oryctographia Ienensis siue fossilium et mineralium in agro Ienensi breuissima descriptio etc. quam reuidit, nonnulla praefatus est, adnotationes subiecit CHRIST. VALENT. MERCKELIUS. Editio altera renouata, Ien. 8.

IOAN. ANT. SCOPOLI, Ph. et Med. D. S. R. I. et C. M. Montanae Ciuitatis Physici de hydrargyro Idriensi tentamina physico-chemico-medica 1) de minera hydrargyri 2) de vitriolo Idriensi, 3) de morbis fossarum hydrargyri. Venetiis, 8.

GEORG. FR. SIGWART. Diss. inaug. de hydrope vteri grauidi, Resp. Georg. Bern. Bilfinger, Tubing. 4.

GEORG.

GEORG. FR. SIGWART. Diff. inaug. de exploratione per tactum vtilissima et summe necessaria artis obstetriciae enchiresi. Resp. Ioh. Iac. Mann-ner. ibid. 4.

Eiusd. Diff. inaug. medicinae dynamicae specimen IV sistens. Resp. Christ. Conrad. Köhlreuter. ib, 4.

The Family Physician: Being a Collection of useful Family Remedies. Together with Plain and Full Directions for Administering them, and properly Nursing the Sick, where the Advice of a Physician is difficult to be procured. To which is added a short Account of those Cases in which Bleeding and Blisters are really serviceable: by HUGH SMITH. The third Edition with Additions. London. 4.

FRID. SNIP, Diff. de lithotomia s. calculi sectione. Amstelod. 8.

IOH. FRIEDR. SOELEMANN'S *Einleitung in die Pharmaceutik und pharmaceutischen Benennungen, für Anfänger der Apothekerkunst und Chirurgie, durchgesehen und verbessert von D. IOH. ERH. TRAMPPEL. Lemgo, 8.*

IOH. NICOL. SPACH. Diff. inaug. casum sarcohydroceles exhibens. Argent. 4.

IAC. REINE. SPIELMANN, Diff. de hydrargyri praeparatorum internorum in sanguinem effectibus. Resp. Ioan. Frider. Ehrmann. ibid. 4.

FRANZ ANTON VON STEINBERG *gründliche Nachricht von dem in Jenner-Crain liegende Czirknützer See, worinnen alle Seltenheiten desselben beschrieben, wie nämlich in einem Jahre bey An- und Auslauf jährlich in solchem gefischt, gejaget und eingärndiet, Heu und Stroh eingebracht, von den darauf wohnenden die Oeconomie besorget werde. mit 35 Kupfern. Grätz. 4.*

I. G. STOCKAR DE NEUFORN tractatus chemico-medicus de succino in genere, nec non speciatim de eo, quod nuper in agris Wisholzensibus effossum est, in quo per tentamina chemica natura succini succincte examinatur, atque auctorum de eo opiniones inuestigantur atque examinantur. Lugd. Bat. 8.

ANTONII STOERCK annus medicus secundus, quo sistuntur obseruationes circa morbos acutos et chronicos, adiiciunturque eorum curationes et quaedam anatomicae cadauerum sectiones. Vindobonae. 8.

Eiusd. libellus secundus, quo demonstratur, cicutam non solum vsu interno tutissime exhiberi, sed et esse simul remedium valde vtile in multis morbis, qui huc vsque curatu impossibiles dicebantur, ibid. 8.

Eiusd. Supplementum necessarium de cicuta, vbi simul iungitur cicutae imago aere excusa, ibid. 8.

Eiusd. prioris de cicuta libelli hoc anno altera prodiit editio, ibid. 8.

Idem libellus gallice redditus editus est, ibid. 8. Voll. 3.

Land brukets rätta Högd uti rön och machiner af
MAGN. STRIDTSBERG, Stockholm. 8 min.

Traité des Bandages et des Appareils; avec un Description abrégé des Brayers ou Bandages et de plusieurs Machines propres à différentes Maladies par M. SUE. Seconde Edition, a Paris, 12.

Die Kennzeichen der Insekten nach Anleitung des Ritters CARL LINNAEUS durch 24 Kupfertafeln erläutert und mit derselben natürlichen Geschichte begleitet von I. H. SULZER, mit einer Vorrede des Herrn IOHANNIS GESNERS, Zürich, 4.

Description abrégée des Maladies, qui regnent le plus communement dans les Armées avec la methode
Tom. XI. Par. IV. Bb b de

de les traiter; par M. VAN SWIETEN. a Am-
sterd. 12.

Diario dell'innesta del Vajuolo fatto ne due figli del D.
TADINI nel mese di Maggio 1761 in Milano.
CAR. IO. SIGISM. THIEL, Diss. inaug. de singultu.
Goett. 4.

FRID. LUD. THIEL, Diss. inaug. de curatione mor-
borum artificiali per vlcera. ibid. 4.

TO. LE THIEULLIER Quaest. med. vtrum omni-
bus in morbis natura coctiones moliatur? aff.
Resp. *Aug. Roux*. Parisiis, 4.

Nob Illustrissimo ALB. V. HALLERO, Soc. R. Sc.
Goett. Praef. de variolis, apoplexia et hydrope, s.
A. D. TISSOT. Lausannae, 8,

Avis au Peuple sur la Santé. avec des Remedes pour
se conserver par M. TISSOT. *ibid.* 8.

De methodo medendi variolis haftenus cognita,
saepe insufficiente, magno pro inoculatione argu-
mento, dissertatio epistolaris ad Cl. D. E. CASP.
SULZERUM exarata a D. BALTH. LUD. TRAL-
LES. Vratislaviae. 8.

ANDR. GOTTF. TRETZELIUS, Diss. inaug. de
insigni et praestantissimo vsu corticis peruiani in
medicina. Altdorf. 4.

— TRIBOULET, Quaest. med. vtrum sit secunda
vena in indigestione. Duaci.

DAN. WILH. TRILLER, Diss. inaug. de tabaci ptar-
mici abusu ceu atrocis affectus ventriculi aliorum-
que morborum causa. Resp. *Aug. Lud. Vnwürde*,
Witteberg. 4.

H. G. N. TROSCHER, *nothwendige Nachricht von den
wahrhaften Böhmischen Bitterwasser Saydschützer
Ursprungs aus dem Hochbetscher Berge. Leitmeritz. 8.*

IOH. FRID. TÜNCEL, de vita rustica, rusticaeque
rei scriptis ecclesiarum pastoribus rure degentibus
commendandis. Brunsw. 4.

Memoires sur les Defrichemens par M. le Marq. DE
TURBILLY, a Paris 12.

Praeclarissimo viro Abbati NOLLETO, IO. MARIA
DE TURRE S. P. Neapoli. 8. c. 2 tab. aen.
(*Agitur in his literis de particularum sanguinis
figura*).

Nouveaux Systeme du Microcosme ou Traité de la
Nature de l'Homme; dans laquelle on explique la
cause du Mouvement des fluides, le principe de la
vie, du sang et des humeurs, la generation et les
autres operations des parties du corps humain
par le Sr. DE TYMOGNE, a la Haye. 8. c. f.

PAULI VALCARENGHI, Com. Eq. Prim. Prof. Med.
Ticin. de praecipuis febribus specimen practicum
ad VINCENTIUM, filium. Cremonae. 4.

Minéralogie, ou Nouvelle Exposition du Regne Mi-
neral. Ouvrage dans le quel on a tâché de ranger
dans l'ordre le plus naturel les Individues de Regne
et où l'on expose leurs propriétés et usages mé-
chaniques, avec un Dictionnaire Nomenclateur et
des Tables synoptiques par M. VALMONT DE
BOMARE. Tome Premiere, a Paris. 8.

DOMINICI VANDELLI de thermis agri Patauini:
accedit bibliotheca hydrographica et apologia
contra HALLERUM. Patauii, 4 mai. c. tab. aen.

Journal de Medecine, Chirurgie, Pharmacie etc. par
M. VANDERMONDE Janvier — Decembr. 1761
Tome XIV. XV. a Paris 8. Voll. 2.

DAVID VASSE, Quaest. med. an pueri bene mane
cibandi? aff. Resp. Carol. Salin. ibid. 4.

MICHAEL LUD. VERNAYE, Quaest. med. an post
longas defatigationes, subito instituta vita deses
periculosa? aff. Resp. Nicol. Jean-roy, ibid. 4.

EMAN. MAURIT. DU VERNEY, Quaest. med. an
sudare tutius, quam algere? aff. Resp. Hugo Gau-
thier, ibid. 4.

Dell' Arte Ostetricia, Trattato di GIUSEPPE VESPA
in Firenze. 4.

Commentatio physiologica, qua foetum in vtero non
liquore amnii, sed sanguine, per venam vmbilica-
lem aduecto, nutriri ostenditur a IOH. HERM.
VOGEL, Goett. 4.

RUD. AUGUSTIN VOGELS *neumedicinische Bi-*
bliothek. Des vierten Bandes, fünftes Stück. ibid. 8.

Das Steinreich systematisch entworfen von IOH. ERNST
IMMANUEL WALCH, *der Beredsamkeit und*
Dichtk. ord. öffentl. Lehrer auf der Univ. zu Iena,
Halle, 8. m. K.

IOH. GOTTSCHALK WALLERIUS, *Phyfsische Chy-*
mie. 1ster Theil. Aus dem Schwedischen übersetzt.
Gotha, 8. m. K.

Eiusd. Diff. analysin et synthesin pulueris laxantis
d'AILHAUD sistens. Resp. *Petr. Christoph.*
Schulz. Vpsaliae, 4.

Eiusd. Diff. qua dubia quaedam, contra transmu-
tationem aquarum mota, refelluntur. Resp. *Iac.*
Wahlström. Holmiae, 4.

Eiusd. Diff. de principiis corporum, Resp. *Er.*
Schoenstedt. Vpsal. 4.

Eiusd. Diff. Agriculturae fundamenta chemica (*latine*
et suécice) Resp. *Gust. Adolph. Gyllenborg, Comes.*
ibid. 4.

Eiusd. Diff. om Guld och Silfver - skedning. Resp.
Car. Henr. Flintberg, ibid. 4.

Eiusd. Diff. de origine oleorum in vegetabilibus.
Resp. *Georg. Rothmann. ibid. 4.*

Eiusd. Diff. an interitus mundi quaedam indicia in
globo terraqueo sint obuia? Resp. *Nic. Ion. Bred-*
berg. Holm, 4.

Eiusd. Diff. de incrementis montium dubiis. Resp.
Petr. Iac. Frisendahl. Vpsal. 4.

IOAN. GOTSCH. WALLERIUS, Diff. de insulis
natantibus. Resp. *Ioh. Brolin.* ibid. 4.

Eiusd. Diff. de mutata facie telluris. Resp. *Eric. Sv.*
Wagenin. Strognesiae. 4.

Eiusd. Diff. de tellure olim per ignem fluida. Resp.
Ioan. Murberg. Vpsal. 4.

Eiusd. Diff. de origine fontium. Resp. *Sven. Westphal.*
ibid. 4.

Eiusd. Diff. Animaduersiones chemicae ad ictum ful-
minis in arce regia Vpsaliensi d. 24 Aug. 1760
(*latine et suecice*). Resp. *Car. Petr. Wibom.*
ibid. 4.

Eiusd. Diff. om metallernes calcinationes i eld.
Resp. *Car. Petersen.* Holmiae. 4.

Eiusd. Diff. de diluuiio vniuersali. Resp. *Aestian Petr.*
Harlin. Vpsal. 4.

Eiusd. Diff. de vegetatione seminum vegetabilium
per mortem. Resp. *Mich. Henr. Otlin.* ibid. 4.

Eiusd. Diff. de indole aquae mutabili. Resp. *Nicol.*
Schwarz. Holm. 4.

C. L. WALTHERS *sonderbare Anmerkungen, welche*
sowohl in der Medicin, Anatomie, als Chirurgie vor-
fallen. Nürnberg. 8. m. K.

The Life and Literary Remains of RALPH. BA-
THURST by THOM. WARTON. London, 8.
(*Continentur varia scripta medica, ex quibus emi-*
nent tres praelectiones de respiratione habitae).

IO. NIC. WEISIUS, Diff. sistens historiam partus
impediti ex membrana tendinosa os yteri inter-
num arctante. Resp. *Andr. Gottfr. Tretzelius.*
Altdorf. 4.

ANDR. WESTPHAL, Diff. sistens succinctas aliquas
animaduersiones medicas circa potiora quaedam
momenta in passione optimi maximi seruatoris
occurrentia. Resp. *Tim. Christ. Guil. Overkamp.*
Gryphiswald. 4.

Physiological Essays, containing, 1) an Inquiry in to the Causes which promote the Circulation of the Fluids in the very Small Vessels of Animals. 2) Observations on the Sensibility and Irritability of the Parts of Men and other Animals; occasioned by M. de HALLER's late Treatise on these Subjects. The second Edition, corrected and enlarged. With an Appendix, containing an Answer to M. de HALLER's Remarks in the 4th Volume of the *Memoires sur les parties sensibles et irritables*. By ROBERT WHYTT. M. D. F. R. S. etc. Edinburgh. 8.

An Essay on the Virtues of Lime-Water and Soap in the Cure of the Stone. The third Edition corrected and enlarged with an Appendix, containing the Cases of Lord WALPOLE, the Bishop of Landaff, WILLIAM HAY Esq. M, L. TREVIGAR. etc. by ROBERT WHYTT. *ibid.* 8.

10. GOTTFR. WOLFIIUS, Diss. inaug. de balsamis vitae, Altdorf. 4.

Della Cura de Bambini attaccati della rachitide. trattato di GIOV. EVERARD. ZEVIANI, in Verona. 4.

Eiusd. Trattato del flato a favore degl' Ipocondriaci. *ibid.* 4 min.



Contenta in hac parte.

1. Noui Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, Tom. VII et VIII. p. 575
2. BRISSON Ornithologia s. synopsis methodica auium Tom. I ad VI p. 591
3. Histoire abrégée des Insectes qui se trouvent aux environs de Paris, Tom. I et II p. 612
4. BERTRAND Memoires sur la structure interieure de la Terre p. 619
5. BALLEXSERD Diff. sur l'education physique des enfans p. 626
6. MEESE Plantarum rudimenta p. 638
7. OOSTERDYK. Diff. de Aceto p. 642
8. VANDERMONDE Journal de Medecine, Chirurgie, Pharmacie cet. p. 644
9. FABRICII Enumeratio methodica plantarum horti medici Helmstadiensis. Editio secunda p. 664
10. RUSSEL Dissertation on the Use of Sea Waters in the Diseases of the Glands p. 670
11. MORGAGNI de sede et causis morborum per Anatomen indagatis, Libri V p. 677
12. Actorum Academiae Electoralis Moguntinae scientiarum vtilium, quae Erfordiae est. Tom. II. p. 694
13. Noua physico-medica p. 713
14. Continuatio indicis scriptorum physico medicorum, quae anno 1761 prodierunt p. 727



INDEX.

A.

- A**bdominalia viscera, circa ea varia obseruata 306 sq. eorum situs peruersus et mala conformatio 707 sq.
- Ablactationis infantum tempus 414
- Absorptio, quibus vasis fiat 283 seqq.
- Acephalorum consideratio 338
- Acetum quid 642. parandi modus eiusque natura 643. aceti vini vsus in hydrophobia 720
- Achillis tendinis disrupti sanatio 130
- Acida, opii antidotum 120. acidi vitriolici cum aliis corporibus coniuncti separatio 271
- Aconiti eiusque extracti vsus et effectus in variis morbis 239
- Acta Heluetica Vol. IV. 313
- Acus noua declinatoria 579. noua triquetra ad perforandum hydrocephalum apta 267
- Acutorum morborum signa ex discrimine soni pectoris discussi desumenda 59
- Adustio vulnerum sclopetariorum 268
- Aer, quatenus vegetationem promouet 144
- Aerugo cupri pendet a sulphure cupri 211
- Aeschynomenes americanae descriptio 587
- Aggeres exstruendi et aquam iis arcendi ratio 138
- Agriculturae fundamenta chemica 139 seqq.
- Agros pinguefaciendi modus 151
- Albinus, Bernh. Siegf. Regiae scientiar. societatis Londin. socius. 718. de sceletto humano liber. 473
- Alcali volatilis vsus in rabie. 658
- Alston, Car. vita, obitus et scripta 556 sqq.
- Alui obstructio incurabilis 262
- Amadou, fungi vsus ad sistendam haemorrhagiam 653
- Ambrosina, nouum plantae genus 539
- Americae quadrupeda indigena 454. partis, Kamtschadaliae proximae descriptio 16
- Ammoniacum salem, parandi modus 17. 671. huius vis potulenta refrigerans 391
- Amputatio, femoris spontanea 246. huius in articulo difficultates et possibilitas 251 sq. eam in articulo instituendi modus 253 sq.
- Amygdala marina, concha 49
- Anatomia artificialis a virgine *Bihéron* praeparata 254
- Anecdotes de Medecine 53
- Aneu-

- Aneurysma verum, sponte
sanatum 649. arteriae
spermaticae et scrotum in-
de scirrhum factum 649.
arteriae subclaviae enor-
me 653. aneurysmate de-
functorum sectio 688 sq.
- Anguillae massae farinaceae
acescentis microscopio ob-
servatae 531
- Animae sedis disquisitio 341
- Animalcula iusculi carnis mi-
croscopio observata 531.
marina aquae innatantia
in littoribus Belgicis ob-
via 315
- Animalia Americae indige-
na 454. orbi antiquo in-
digena 452. orbi utriusque
communia 456. anima-
lium in Belgio habitantium
Centuriae duae 325
- Anthoporita s. Anthopora
petrescens, quid? 321
- Anus, ad illum excremen-
tiae peculiaris historia 530
- Aphronitri examen chemi-
micum 703
- Apis foetus suos foliis inuo-
lutos in ligno putrido ab-
scondens 34
- Apoplexiae distinctio 681.
ea defunctorum sectio ib.
- Aqua, quatenus vegetatio-
nem promoveat 144.
aquae elementaris forma
73. incondensibilitatis,
circa eandem experimenti
Florentini fallaciae quae-
dam 65. usus in doloribus
ventriculi 57. calidae in-
jectionum in utero usus
in retentione secundina-
rum 270. marinae usus in
- morbis glandularum 670.
experimenta circa eam in-
stituta 671. eam edulco-
randi artificium 358.
aquae minerales magnae
Britanniae 673. vitrioli-
cae in insula Mona 14
- Arationis usus eique aptum
tempus 153
- Arena, an ad foecundatio-
nem terrae conferat 149
- Argi, Zoophyti descriptio
509
- Argilla quid, et quatenus
ad fertilitatem contribuat
146
- Arisarum potamogeti folio
Boccon. 539
- Arsenico demortui cadaue-
veris sectio 693
- Arteriarum structura 393.
irritabilitas, circa eam
difficultates 82
- Artificum morbus singularis
21
- Asbestus in Gall. repertus 33
- Ascaridum historia physio-
logica 488. descriptio et
structura interna 490. va-
rii motus et nutrimentum
491 sq. generatio 492
- de Asch, Geo. in munere
supremi Russicorum exer-
citus Medici confirma-
tus 554
- Ascitis curatio et cum educta
aqua instituta experimen-
ta 266. mira crisi curatio
265. tartaro emetico cu-
ratio 267. venaesectioni-
bus et opio curatio 243.
eum tractandi methodus
647. eo demortuorum se-
ctio 691
- Bbb 5 Asel-

- Asellus maior hermaphroditus 312 sq.
 Asinus marinus 50
 Asper verus, piscis 277
 Asperuli piscis descriptio 277
 Astacorum character genericus 468. propagatio 469. chelarum restauratio 470. astaci Norvegici curiosi descriptio 314
 Astruc, J. Traité des Maladies des femmes 213
 Auditus organi descriptio 297
 Auenbrugger, Leop. Inuentum nouum ex percussione thoracis humani ut signo, abstrusos interni pectoris morbos detegendi 57
 Avis a phasiano et gallina Afric. prognata 33. auium synopsis method. 590 sqq.
 Auriculæ cordis dextræ præternaturalis dilatatio 268
 Auris eiusque partium descriptio et usus 297 seq.

B.

 Ballexferd Diff. sur l'éducation physique des Enfants 626
 Balneorum usus 228. horum incommoda 229
 Barberet ab Acad. Scient. et Artium Rothomagiensi præmium reportauit 552
 Barometri ad instar, nautis inferuituri, cuiusdam instrumenti descriptio 585
 Bassii, Ferd. Ambrosina, novum plantæ genus 539
 Basteri, Jobi opuscula subseciua Liber III. 310. opuscula subseciua Tomi II. Liber I. 468
 Bathoniensis fontis medicati descriptio et usus 674
 Baurenfeind, obitus 720
 Belladonnae usus internus in cancro mammae 645. 654. usus in scirrho intestinorum 258. circa eius usum instituta experimenta 259. tincturam parandi methodus eiusque usus in cancro mammae 652. fructuum effectus funesti 389. horum antidota ib.
 Beltz, Urban. ab Acad. Reg. Scient. Berolinensi præmium reportauit 164
 Berolinensis Academiae Reg. Scient. thesis et præmium ad ann. 1764. et 1765. 164
 Bertrand, Elie, Memoires sur la structure interieure de la Terre 619
 Bezoar humanum 646
 Bilguer, Jo. Vlr. *Anweisung zur ausübenden Wundarzneykunst in Feldlazarethen* 496
 Boehmer, Phil. Adolph. Academiae Reg. Chirurg. Parisiensis socius 166
 Bohadsch, Jo. Bapt. de quibusdam animalibus marinis eorumque proprietatibus Liber 501
 Boleti noua species 316
 Bose, Ern. Gottlob, Prof. Physiologiae ordin. Lipsiensis 168
 Botanica expeditior in tabulis 279
 Boyer Methode a suivre dans

- dans le traitement des différentes maladies épidémiques, qui regnent dans la Généralité de Paris 493
- Brassicae chinensis* descriptio 587
- Briffon, A. D. Ornithologie Tome I. - VI. c. Supplém. 591 seqq. Regnum animale in IX Classes distributum auctius editum 612
- Bristolienfis aquae medicae descriptio et vsus 674
- Büchner, Andr. El. Reg. Scient. Societatis Lond. socius 165
- C.
- Cadaueris hominis subito demortui* sectio 660
- Calculosa massa in intestino colo equi* reperta 31
- Calculus insignis ex vesicae sectionis ope extractus* 262. ad calculi sectionem lateralem instrumenti descriptio et vsus 653
- Caloris vis vegetationem promouens* 143. summi gradus ad certa fluida experimentis declarati 588 sq.
- Caluariae foramina horumque vsus* 101 seq.
- Calvet, Spirit. Claud. Franc. Acad. Paris. Inscriptionum et elegant. literarum correspondens 166
- Calx*, an ad fertilitatem contribuat? 147. eam praeparandi, coquendi eaque vtendi modus 120 seq.
- eius varietates 207 seq.
- calcareae terrae varietates* 207 seq.
- Camphorae proprietates et noua vegetatio chymica, quae ope eiusdem fit* 400 seq. vsus in mania 525. vis venena corrigens 30
- Cancer mammae vsu belladonnae curatus* 652
- Cancris marini ad littus Ariminense* 46. de iis observationes 471. eorundem duae species 471
- Capitis vulneris cum cranio depressio curatio* 533
- Caracal*, animal. 463
- Carbonis fossilis, Bovey-Coal dicti* descriptio et origo 22 seq. analysi chemica 24. cum eo instituta experimenta 43
- Carcinomatis vteri naturae et cura* 222
- Cardialgiae conuulsivae curatio* 645
- Cariei ossis pubis casus* 209
- Carnis frustum e trachea egressum* 256
- Caro ab Acad. Scient. et Artium Rothomagiensi praemium decretum* 552
- Cartilaginum vasa negantur* 285
- Casia fructu nigro Gmel.* 579
- Catalepsis pediluuiis et frictione mercuriali curata* 247
- Catamenia qua ratione contingant* 215 seq. horum diuersi status 216. suppressio 217
- Causticorum effectus in cadauera observatus* 269
- Cellu-*

Cellulosae membranae insensibilitas dubia reddita	82	Colicae verminosae curatio	270
Cera flava pictorum vsui accommodata	705	Coma vigil.	647
Cerebelli descriptio 331. a cerebro et medulla spinali differentia	338	Concha anomia plicata <i>πολυλεπτογυγγλυμος</i> petrificata	326.
Cerebri mensura, definitio et substantia 329 seqq. eius vasa 333. ventriculorum vsus 342. hydrops	269	alata, ex badio et nigro colore variegata 695. conchae minimae ad littus Ariminense	45
Cernuae, piscis descriptio	277	Conchyliorum characteres determinandi ratio	396
<i>Cesto del mare</i> , animalis descriptio	502 sqq.	Congelationis phaenomena	72 seq.
Chlorosis causa et curatio	217 seq.	Corallii spongiosi historia	582 sq.
Choreae S. Viti curatio	653	Cordis vasa et motus 304 sq. motus a voluntate pendens	56.
Chronicorum morborum causae et signa ex sono percussi thoracis sumenda	60	irritabilitas quid? 85 sq. circa hanc difficultates	82.
Cicutae vsus externus chirurgicus 241 seqq. vsus internus salutaris 651. vsus in scirrho et carcinomate 659. 664. in morbis scrophulosis 654. extractum parandi modus 230. eius dosis et effectus 236. huius vsus in amaurosi 234. in podagra ib. in obstructione glandularum 231 seqq. in carcinomate ib. in variis morbis	232 seqq. 236	harum solutio 89 sqq. sensibilitas et difficultates circa eam	81
Cinnabaris, circa hanc experimenta chemica 706. eius effectus antispasmodicus	707	Cornua oborta ad femora plurium feminarum 654. eorundem in hominibus origo 304. cornua ammonis minima ad littus Ariminense	44
Clavi hysterici curatio	663	Cortusae Matthioli descriptio	325
Cochleae punctatae genesis	49	Cotyledonum plantae differentiae 637. ab iis methodus desumpta 638 sqq.	
		Conguar, animal.	461
		Crantz, Henr. Nepom. solutiones difficultatum circa cordis irritabilitatem	84 seqq.
		Cretaria terra an ad fertilitatem contribuat?	147
		Cucumerum succi vsus in vlcere pulmonum	527
		Cutis	

Cutis eiusque glandularum
descriptio 301

D.

Danicae societatis, iter in
orientem facientis, pluri-
ma membra moriuntur 719

David, ab Acad. Reg. Chi-
rurg. Parisiensi praemium
reportavit 716

Delirii phrenitici curatio 663

Diarthrosis ossium, eiusque
genera 475

van Doeveren, Gualt. Me-
dic. theoret. et pract. che-
miae et artis obstetriciae
Prof. Groening. 357

Durae matris descriptio 332.
motus, arteriae et nervi.
292 sq.

Duretus, Ludov. eius in elo-
gium praemium constitu-
tum 356

Duverney Oeuvres anatomi-
ques 290

Dysenteriae ao. 1759 Suin-
furti grassantis descriptio
524

Dysuriae, ex ulcere intesti-
nali in vesicam peruito, in
marasium desinentis ca-
sus 323

E.

Eau de Luce vsus in rabie
658

Echinidae species singularis
326

Echinus f. Echinometra vul-
garis aculeis nigris 48

Electrica experimenta 19.
36 seq.

Electricitatis effectus, in di-

versis morbis 322. in
membra frigore vltia et alio
modo adfecta 710

Ellenberger de Zimmendorf,
summus rerum medicarum
atque chirurg. in exer-
citibus Regis Borussiae
Praefectus et Consiliarius
supremi Collegii Medico-
rum 358

Emeticorum vsus in morbis
acutis grauidarum 661

Endemii morbi vrbis Jön
Koeping eorumque caus-
sae 194

Epiploenteroceles cum spha-
celo et iactura partis in-
testini curatio 651

Epiploi monstrosi observatio
267

Epsomienfis fontis medicati
eiusque salis descriptio et
vsus 676

Eruca salicis lignum rodens
418. 421. eius historia

naturalis 421. corpusculi
diuisio 422. partium ca-
pitis exteriorum descri-
ptio anatomica 423 seqq.

exteriorum corporis par-
tium microscopio obser-
vatarum descriptio 427

seqq. interiorum partium
fabrica 430. musculorum
descriptio 430 sq. cere-
bri, medullae spinalis,

gangliorum, nervorum-
que descriptio 432 sq. va-
forum aereorum descriptio

433 sq. cordis descriptio
435 sq. corpora renifor-
mia 437. vasa granulosa

438. pars adiposa ib. ca-
nalis alimentarius 439 seqq.

vasa

- vasa bombycina 443. vasa
dissoluentia 444 sq. partes
in capite contentae 445.
mutatio in chrysalidem et
phalaenam 421 sq. 446
Euphorbii tincturae effectus
eorumque curatio 29
Excrefcentia ad linguae ra-
dicem ligatura extirpata
645. gangraenosa in ca-
pite membri virilis per li-
gaturam huius partis cu-
rata 127
Exfoliatio ossium post 57 an-
nos contusionem capitis
secuta 248 sq.
Exostoseos ossis cylindrici
nova species 648. mon-
strosae descriptio 271
- F.
- Fabricii, Phil. Contr. Enum-
eratio methodica plan-
tarum horti medici Helm-
stadiensis 664
Febris putridae spasmodicae
et rheumaticae casus 316.
catarrhalis cum ulcere pul-
monis casus ib. continuae
in intermittentem anoma-
lam transeuntis historia
655. proteiformis descri-
ptio 656. putridae vermi-
nosae cum delirio phre-
nitico curatio 657. febre
hectica demortui sectio
656.
Felis ex india orientali de-
scriptio 27
Femoris ossis fractura sola
musculorum actione pro-
ducta 256. os vi externa
luxatum 31. ossis luxatio
et repositio 35. vtriusque
a causa interna luxationis
curatio 323 seq. sponta-
nea amputatio 246. am-
putatio in articulo 211 sqq.
Filicis maris radiceis virtus
foetum ex utero expellen-
di 263
Fimbriae, animalis marini
descriptio 507. an Zoo-
phytum? 508
Fistulae ex adipe renum or-
tae curatio 124 seq.
Flagrorum usus in obstructio-
ne alui 56
Fluidi neruei, materies et
natura 339 sq. motus quo-
tuplex 341. quatenus est
caussa motus muscularis
349 seq.
Fluidorum resistantiae dilu-
cidatio 584
Fluoris albi caussae et cu-
ratio 218
Foemina 9 annorum filiam
peperit 320
Foetus ad 29 menses in ute-
ro gestus et per abscessum
eductus 662
Folia, eorum in plantis per-
fectioribus usus 70 seq. an
respirationi plantarum in-
seruiant? 71
Forskal, obitus 720
Fractura, femoris sola mus-
culorum actione producta.
256. ossis humeri et me-
morabilis eius operatio 28
complicata humeri ad arti-
culum cubiti eiusque cu-
ratio 663
*Franckische Sammlungen von
Anmerkungen aus der Na-
turlehre, Arzneygelahrtheit
Oeco-*

- Oeconomie &c. ster und
öter Band* 521
- Freyenwaldensis agri et fontis descriptio 50 sq. fontis analysis chemica 52
- Frigoris, effectus in instrumenta musica 212 seq. summi gradus ad certa fluida experimentis declarati 588 seq.
- Friis, Christ. Lodberg, Decanus Facult. med. Hafn. 357
- Fulminis effectus nonnulli observati 244 seq.
- Furoris vterini causae et curatio 219
- G.**
- Gadus hermaphroditus 312
- Ganglii in femore feminae extirpatio 257
- Gangraenae abdominis curatio 261
- Gardeniae, plantae descriptio 40
- Gaubius, Hier. Dav. Societat. Reg. Scient. Londin. socius 718
- Gehler, Jo. Car. Botanices Prof. Publ. extraord. Lips. 168
- Gelu quomodo fiat, circa illud phaenomena 72
- Genetta, animal. 467
- Geoffroy iun. Histoire des insectes Tome I. et II. 612
- Gerard, Lud. Flora Gallo-Prouincialis 402
- Glacies an commotionem electricam transmittat 39
- Glandulae, plantarum 399. cutaneae, harum in quinque species distinctio 301.
- glandulae in vagina vteri osseae factae observatio 255. glandularum vaginalium descriptio 308
- Glarea an ad foecundationem terrae conferat? 149
- Glaux Rivini, eius propagatio et usus 701
- Globulus plumbeus diu post acceptum vulnus vomitu reiectus 522
- de Gorter, Jo. obitus 171 memoria 361 seqq. scripta 371
- Gottingensis Acad. Reg. Scient. thesis ad ann. 1764. 355
- Gouan, Ant. Hortus Regius Monspelienfis 154. seqq.
- Grauiditatis signum peculiare 260
- Gronouii, Jo. Frid. obitus 171. memoria et scripta 721
- Gustus organi descriptio 300
- Gymnoti tremuli descriptio et experimenta cum eo instituta 314
- H.**
- Haemoptoseos casus singularis et curatio 20 seq.
- de Haen, Ant. Difficultates circa modernorum systema de sensibilitate et irritabilitate corp. hum. 76. Vindiciae difficultatum circa modernorum systema de sensibilitate et irritabilitate corp. hum. contra Alb. v. Haller 97
- Hagstroemii medicamentaria domestica 197
- Halesiae, plantae descript. 40 v. Haller,

- v. Haller, Alb. ad Ant. de
Haen difficultates Apo-
logia 93. Elementa phy-
siologiae Tom. IV. 329
Harlemensis societatis scien-
tiarum commentarii P. V.
120
Hartmann, Jo. Frid. Reg.
Scient. Societatis Gotting.
Correspondens 166
Hartmann, Petr. Imman. Me-
dicinae Prof. Publ. ord.
Francof. ad Viadr. 168
de Haven, obitus 720
Hellebori nigri extracto de-
mortui sectio 693
Hernia, quatenus cum te-
sticulo communi sacculo
deprehenditur 288. scro-
talis cum inflammatione
vomitu spontaneo curata
255. inguinalis, circa eam
observationes 263. 645.
cruralis 268. ventralis
cum grauiditate 660. her-
niarum congenitarum ra-
tio 289
Hillary, Guil. obitus 171
Hirudines asservandi iisque
vtendi modus 198 seq.
Hirundinum migratio 13
Histoire de l'Academie Roya-
le des Sciences à Paris,
année 1756. 385. abre-
gée des Insectes, qui se
trouvent aux environs de
Paris Tom. I. et II. 612.
naturelle generale et par-
ticuliere, avec la Descri-
ption du Cabinet du Roy
Tom. IX. 449
Holmann, Samuel. Christ.
Commentationum in Reg.
Sci. Societate Gott. inde ab
ann. 1756. recensitarum
sylloge 63
Holmientis Reg. Scientiar.
Acad. thesis 165
Homolocenchrus, novum
graminis genus 327
Hope, Jo. Materiae med.
Botan. et Med. Prof. Edin-
burg. 558
Hordei arista per urinam
evacuata 260
Hordeoli, plantae mexica-
nae virtus 257
Horrebow, Petr. obitus
719
Humus, quatenus vegetatio-
nem promouet 145
Hunter, Will. Medical
Commentaries Part. I.
281
Hyaena, animal. 463
Hydrae, zoophyti descri-
ptio 511 seq.
Hydrophobia, eius sedes
483. curatio 484 seqq.
ei medendi specialis me-
thodus 487. an sit sequela
morsus animalis rabidi?
480. eius per morsum
propagatio ib. seq. natu-
tura et symptomata 482.
ea demortuorum sectio
quid ostendat 482 seq.
684 seq. a solo terrore
exorta 55. spontanea, ea
defuncti sectio 659
Hydrops insultu apoplectico
curatus 663. vitione sana-
tus 54. eo demortuorum
sectio 691. ascites vid.
Ascites, peritonaei, eius
causae et signa 692
Hyoscyami eiusque extracti
effectus

- effectus in variis morbis 238 seq.
 Hyſterici mali cauſſae et cu-
 ratio 224
- I.**
- Iaguar, animal. 461
 James, R. Treatiſe on can-
 nine Madneſſ. 479
 Jancke, Jo. Godofr. de fo-
 raminiſus oſſium calua-
 riae eorumque uſu Diff. I.
 101. de ratione venas c.
 h. anguſtiores, in pri-
 mis cutaneas oſtendendi
 106. memoria et ſcripta
 176 ſeqq.
 Jaſmini promontorii bonae
 ſpei deſcriptio 41
 Ibicis imberbis deſcriptionis
 ſupplementum 584
 Inediae caſus ſingularis 388
 Infantis recens nati cura
 412 ſeq. 627 ſeqq. abla-
 ctati educationis ratio 629
 ſeq. monſtrolli deſcriptio
 657. infantis in orpha-
 notropheae recipiendi tem-
 pus 416. horum veſtimen-
 torum, nutrimenti et ex-
 ercitiſorum modus 641 ſqq.
 Inoculatio variolarum a ſu-
 preſa Pariſienſi curia in-
 terdicta 558. huius prae-
 ſtantia 124. hiſtoria et ori-
 go 128. 225. eam inſti-
 tuendi modus et ratio 226.
 circa illam obſeruata 122
 Inſectorum characteres 447.
 in agro Pariſienſi repe-
 riundorum methodica diſ-
 poſitio 613 ſeqq.
Tom. XI. Pars IV.
- Inſenſibilitas partium unde?
 335. tendinum, eius in-
 uentio controuerſa 287
 Inſitio variolarum vid. Ino-
 culatio.
 Ipecacuanhae in infuſo pro-
 pinatae effectus 266
 Irritabilitas, an ſit qualitas
 occulta? 89. cordis, hu-
 ius a ſenſibilitate diſſe-
 rentia 88. partium quid
 eiusque a ſenſibilitate diſ-
 ferentia 344 ſeq. eius
 gradus 345. circa illam
 difficultates 82 ſeq.
 Iſenſamm, Jac. Frid. Prof.
 Med. Ord. Erlang. 718
- K.**
- Karakatizae, polypi marini
 deſcriptio 580 ſeq.
 Klinkoſch, Jo. Thaddeus,
 Anatomiae Prof. Publ.
 Pragenſis 167
 Kniphiof, Io. Hier. memo-
 ria et ſcripta 559 ſqq.
 Koelreuter, Joſ. Theoph.
 a Ser. Marchione Badenſi
 Conſil. et Hiſt. naturalis
 Prof. 553
 Kongl. Vetenskaps Acade-
 miens Handlingar för år
 1760. Vol. XXI. 193
- L.**
- Lacrymalis glandulae du-
 ctuum deſcriptio 295. ho-
 rum inuentio controuerſa
 285
- Ccc Lacta-

- Lactatio, circa eam monita 413
- Lapidum figuratorum origo et diuersitas 622. 625
- Lapponiae borealis confinium climatis salubritas 206
- Lautter, Franc. Ioseph. obitus 161
- Leber, Ferd. *Abhandlung von der Nutzbarkeit des Schierlings in der Wundarzneykunst* 241
- Lens crystallina, eius vasorum distributio 287. 296. sine ea an visus esse possit? 530
- Leonis historia naturalis 449. seqq.
- Leopardi, a tigride, vncia et pardo differentia 459
- Lepra, piscium et animalium in Norwegia morbus 211
- Lernaeae, animalis marini descriptio 502 seq. 508
- ventriculus dentibus instructus 504. an venenis adnumeranda 506 seq.
- Ligamentorum insensibilitas dubia reddita 80. 100
- Lignorum fossilium in montibus praealtis reperiendorum descriptio 18 seq.
- Limbourg, Io. Phil. ab Acad. Louaniensi praemium reportauit 553
- Linguae partium descriptio 300
- Lithotomia per lithotomum occultum facta 651 vid. Calculi sectio.
- Lochiorum obstructio sanguifugis sublata 55
- Ludolf, Christ. Frid. obitus 358
- Lugdunensis Acad. Scient. elegantiorum Literarum et artium, historia et membra 547 seqq. thesis ad ann. 1765. 550
- Lupi nigri descriptio 467
- Lymphaticorum vasorum origo, circa huius inuentionem controuersia 282
- circa eorundem usum controuersia 283. 286
- Lyncis descriptio et historia naturalis 462
- Lyonnet, Pierre, *Traité anatomique de la Chenille, qui ronge le bois de Saule* 418
- M.
- de Macclesfield, Gep. Comitibus obitus 556
- Magneticae acus usus in mineris ferri inuestigandis 197
- Malachites veterum quid? 701
- Mania, a phantasia et nau-sea exorta breui curata. 525. ea defunctorum sectio 682 seq.
- Manuum monstrosarum descriptio 658
- Marga? quid an ad fertilitatem aliquid conferat 148
- Maris aestus reciprocus eiusque causa 47 sedimentum ad litus Arimini 44
- marinorum corporum in terra

- terra continente origo 74
- Martialium et salinorum
vſus in colica verminosa 270
- Matthiae, Geo. Prof. Med.
Ord. Gotting. 717
- Maxillae contractio a me-
dela morbi venerei orta 668
- Medullae oblongatae de-
ſcriptio 331 ſpinalis di-
ſtributio ib.
- Meduſa palliata ſ. vrticata,
zoophytum 518
- Meefe, Dav. het XIX Claffe
van de Genera plantarum
van de Heer Car. Lin-
naeus Syngenefia ge-
naamt, opgehieldet en ver-
meerdert 535. Plantarum
rudimenta ſ. illarum me-
thodus ex differentia ſe-
minum, cotyledonum cet.
635
- Melancholia, eius peculiaris
caſus 521 in maniam le-
thalem, breui tempore
mutata 525 ope ſanguinis
aſinini curata 534 ea de-
mortuorum ſectio 682 ſq.
- Menſtrui fluxus nimii ſigna
et curatio 218 vid. Cata-
menia.
- Meningum inſenſibilitas,
circa eam difficultates 79
- Mercurii, vſus in vomitu
323 in hydrophobia 485
dulcis vſus in morbis ve-
nereis 709 ſublimate vſus
historia 222 huius vſus in
vena medinenſi 267 mer-
curius vitae, circa eum
obſervata 704
- Meſſerſchmidiae plantae de-
ſcriptio 586
- Meteora ſine fragore viſa 196
- Millepora tubulis parallelis 326
- Moguntinae Academiae Ele-
ctoralis ſcientiarum, quae
Erfordiae eſt, Actorum
Tom. II. 694
- Monſtri infantilis deſcriptio 657
- Montes, horum origo 625
praealti ligno foſſili inſar-
cti 17 ſeqq. argillaceo-
calcarei et argillaceo-
gypſei 696
- Morgagni, Io. Bapt. de ſe-
dibus et cauſis morborum
per anatomen indagatis
Libri V 677
- Morochthi diſquiſitio 697
- Mors, ex gaudio 56 ſubita-
nea a nimia obefitate 661
repentina ex vitio vaſo-
rum ſanguiferorum in
thorace 688
- Morſchiferi animalis deſcri-
ptio et differentia ab ani-
mali zibethico 465
- Mulierum morbi 213 ſeqq.
- Mumiae aegyptiacae effe-
ctus 251
- Murray, Io. Andr. Prof.
Med. Extraord. Gotting.
717
- Mus araneus, amphib. 307
- Muſcularis, fibrae fabrica
342 motus cauſa 347 ſeqq.
- C e c 2 qua-

quatenus a neruis depen-
det 337 phaenomena 343
horum explicatio 346 ad-
minicula 347 utilitas 350
Mytulorum descriptio, eo-
rumque propagatio 310

N.

Napellus vid. Aconitum.
Nani cuiusdam nobilis Po-
loni, Borwslasky descri-
ptio 264
Narium et ad illas perti-
nentium partium descri-
ptio 298 seq.
Nervi, eorum contemplatio
334 an fluidum iis inest.
339 caui sint, observatio
microscopica 523
Nitrariae, plantae descriptio
579
Nutrix, qualis infanti eligen-
da? 628

O.

Observationes anatomicae
387 seq. 650 botanicae
326. 351 seq. physicae
385 seq. practicae 531
Occhio griso, plantae vene-
ratae effectus 317 seq.
Occiput, ad illud magnae
excreſcentiae descriptio
531
Oculi, eiusque partium de-
scriptio et usus 295
Oesophagi obstructio pecu-
liaris 257
Oestrum marinum 50

Οκταπυς, polypi marini
descriptio 580. seq.
Oleandri foliorum succo ex-
presso demortui sectio
693
Oosterdyk. Nic. Geo. Diff.
de aceto 642
Opisthotonus balneis cura-
tus 266
Opium, eius usus in phthisi
107 seq. in hydropē 109
ascite 243 in melancholia
110 in mania ib. seq. in
suppressionemensium 112
in grauidarum morbis
112 seq. in morbis par-
turientium et puerpera-
rum 114 seq. in morbis
infantium 115 seq. in mor-
bis senum 117 usus ex-
ternus 118 quatenus ve-
nenorum antidotum 118
seq. eius tanquam veneni
antidota 119 eius usus uti-
lis et noxius per expe-
rientiam declaratus 135
sine subsequente noxa
larga dosi sumtum 711
Orchidum classis, eius gene-
ra et species 318 seq.
Ornithologia methodica 591
seqq.
Orphanotrophei Holmiensis
ratio 416 seq.
Os in pelui viri repertum
28 a femina deglutitum
et cum vrina eiectum 250
ossa dealbandi noua me-
thodus 355 foetus per
anum eiecta 532 ossium
c. h. descriptio 473. 476
seqq. genesis, articulatio
et

et varia circa eadem ob-
servata 4. 302 articulatio-
nis ratio 474 seq. ossium
eorumque medullae in-
sensibilitas dubia reddita
80

Ostreum plicatum, plicis
valde inaequalibus, lapi-
defactum 326

P.

Paracenthesis centies qua-
dragesies ter trium anno-
rum spatio instituta 662

Parasitae spuriae plantae 390

Pardi descriptio et historia
naturalis 459 seq. a tigri-
de differentia 458

Parentum viuendi ratio, an-
tequam infantem progi-
gnant. 627

Parisiensis Acad. reg. scien-
tiarum historia et com-
mentarii ad an. 1756. 385
et Ac. reg. chirurg. thesis et
praemium ad ann. 1764.
163 thesis et praemium
ad ann. 1765. 552 supre-
mae Curiae (*Parlament*)
interdictio infitionis va-
riolarum 558 regionis mi-
neralogica descriptio 398
varii morbi epidemici
493

Parotidis tumor, cuius pus
in pectoris cauum se eua-
cuavit 269

Partus monstrosi historia 528
laboriosi infantis praeter-
naturalis descriptio 664

Pastinacae aculeus 472

Pectoris, morbi, quatenus
ex sono percussu thoracis

cognosci possint 60 seq.
gladio perfossi vulnus eius-
que curatio 662

Peithner, Thaddens, Me-
tallurg. Prof. Pragensis
166 seq.

Penis valde decurtatus im-
potentiam virilem non
efficiens 532

Penna marina, zoophytorum
genus 514 eius species
ibid.

Percae vulgaris descriptio
273 seqq. fluuiatilis mi-
noris descriptio. 277

Pericardium, eiusque liquo-
ris descriptio 304 sangui-
ne plenum mortis causa
56 aqua impletum, eius
signa 63

Periosteum insensibilitas in du-
bium vocata 80

Peritonaei insensibilitas, cir-
ca eandem difficultates
80

Peruiani corticis vsus in
gangraena 646 in febri-
bus malignis 709

Petropolitani Collegii Me-
dici supremi noua consti-
tutio eiusque membra
613 seqq.

Pewter Medicine vsus in
hydrophobia 486

van Phellsum, M. Historia
physiologica ascaridum
488

Philosophical Transactions
Vol. LI. Part. II for the
Year 1760. 13

Phthisi renali defuncti se-
ctio 659

C c c 3

Pho.

- Pholades**, an saxa perforare possint? 520
- Pilorum** circa pudenda resectionis vsus in gonorrhoea 717 seq.
- Pinguefactio** agri quomodo instituenda? 151
- Pinschbach**, metallum componendi modus 210
- Piscium**, Bauarico-Ratisbonensium pentas 272 auditus organon describitur 278
- Placenta** vterina cauo membranoso retenta 650
- Plancus**, Ian. de conchis minus notis Liber 43
- Plantulae** seminales frumenti, de iis observationes 701
- Pleurae** insensibilitas, circa eandem difficultas 79. 100 huius solutio 95
- Pleurothotoni** vniuersalis curatio 529
- Podex** marinus, vrticae marinae species 47
- Poissonier**, Petr. aquam marinam edulcorandi artificium detexit 358
- Poleni**, Io. obitus 357
- Polypi** marini, Russis Karakatiza dicti descriptio 580 seq.
- Polyporitae** quid? 321
- Polyposae** concretiones ex pectore reiectae 246
- Pulex** marinus 472
- Pulmonum** motus, substantia, vasa 305 insensibilitas dubia reddita 81 vlcus machina Muzelii sanatum 527 succo cucumerum curatum ib.
- Pulsuum** praeternaturalium historia 686. seq.
- Pupillae** vtriusque oculi contractio optice declarata 578
- Pupillaris** oculi membrana, circa eius inuentionem controuersia 287
- Pylorus** osseus exulceratus vomitus diuturni causa 256
- Pyritae** inter lignorum fossilium strata reperti 18
- R.
- Rabies** canina quid sit? 481 eius signa ib. eius cum variolis hominum analogia ib.
- Radicatio** singularis arborum in suo trunco 123
- Raia**, eius caudae aculei descriptio 472 eius ouorum et ouarii descriptio 519
- Rana** piscis Surinamiensis 27
- Rapuntii** vrentis Soloniensis effectus 659
- Raulin**, Ioseph. Reg. scient. societ. Londin socius 166
- Refrigeratio** potulentorum sine glacie 391
- Reichardsrothenlis** aquae medicatae disquisitio 533
- Renes**, horum et vteri peculiare laesiones 522 circa hos observatio anatomica 650 renis atque vreteris vnici in homine reperti observatio 268
- Respirationis** mechanismus et vsus 67 seqq. Rigi-

- Rigiditas manuum a frequenti filorum aeneorum tractatione 41
- Roederer, Io. Geo. obitus 172
- Rosarum tincturae vsus in morbo pectoris cum humorum fluxione 56
- Rothomagensis acad. scient. artiumque thesis et praemium ad ann. 1764 et 1766. 551 seq.
- Russel, Rich. Dissertation on the use of Sea Water in the diseases of Glands 676
- S.
- Sachsi, Io. Iac. memoria 172
- Sal antepilepticus Weismanni quid? eiusque vsus 247
- salia mineralia vegetationem non promouent 150
- Sanches, Ant. Riber. Acad. scient. Petropol. membrum honorarium confirmatum 554
- Sandaracha veterum quid? 700 sandaracinus puteus Philostrati ib.
- Sanguinis, globulorum diuersitas 328 figura 526
- ad caput tendentis mensura et ratio 332 asinini vsus in melancholia 534
- sanguis albus scarificationeeductus 534
- Sanguifugae ex sympathia menstruatæ 55
- Saparillae granorum in colica nephritica effectus salutares 265
- Sarcocoles curatio 655
- de Saussure, Horat. Bened. Phys. atque Mathes. Prof. publ. Geneuensis 167
- Scabies ope gummi ex arbore pruni in aceto soluti sanata 57
- Schaarschmidt, Aug. de agro et fonte Freyenwaldensi 50
- Schaeffer, Iac. Christ. Piscium Bauarico-Ratisbonensium pentas 272 Botanica expeditior 279 ab Elect. Palatino collectione numismatum donatus 555
- Schlettwein, Io. Aug. a Reg. scient. societate Goting. duo praemia reportauit 717
- Schmiedel, Casim. Christ. Ser. March. Brandenb. Onolsbac. Archiater 168
- Schraifer, piscis descriptio 277
- Schreber, Dan. Gottfr. Oeconomiae Prof. Lips. 718
- Schroeder, Phil. Geo. Med. et Anat. Prof. Ord. Goting. 717
- Schulz, Dav. Intrâdes talom Barns Skötsel i gemen 412
- Scirrhus, pulmonum, eius signa 61 vteri, eius causae et curatio 221 intestinorum inueteratus belladonna curatus 258
- Scleroticae oculi tunicae descriptio 295
- C c c 4 Scolo

- Scoolo, Iac. Med. Practicae
Prof. Publ. Primar. Patav. 254
- Scrotum ab aneurysmate ar-
teriae spermaticae scir-
rhosum factum 649
- Seminatio, circa eam moni-
ta 153
- Seminum, vis intrinseca mul-
tiplicatiua 143. quatenus
arte promouenda 150 ex
eorum differentia metho-
dus stabilienda 626
- Sensibilitas partium humani
corporis, circa hanc diffi-
cultates 76 seqq.
- Sensorium commune se-
des animae 341
- Sensus quid? 335 exercetur
per nervos ib. seqq.
- Seta palustris 50
- Shaw, Petr. obitus 171
- Sinum cerebri vtilitas
333
- Smellie, Guil. obitus 171
- Solani furiosi effectus 248
- Speculorum vltiorum
emendatio 577
- Spirituum animalium, mate-
ries s. natura 339 seq. mo-
tus quotuplex? 341
- Squali ex rufo varii, pinna
ani media inter anum et
caudam pinnatam, ouorum
descriptio 519
- Squamarum piscium varietas
et vsus 312
- Squillae marinae, circa eas-
dem obseruationes 472
- Stellae marinae, ad littus
Ariminense reperiundae
46 harum incessus 49
- Stenius, Iac. ab Acad. Reg.
Sient. Holmieni praem-
mium reportauit 355 seq.
- Stoerk, Ant. Libellus II in
quo confirmatur: cicu-
tam non solum vsu inter-
no tutissime exhiberi, cet.
230 supplementum ne-
cessarium de cicuta 236
- Libellus quo demonstra-
tur: Stramonium, Hyo-
sciamum, Aconitum non
solum tuto posse exhiberi
vsu interno etc. 237
- Stramonium, huius extracti
effectus salutare 238
- Succini versus nitrum rela-
tio 704
- Sudor picardinus 493 seq.
huius curatio 494 seq.
- Suecicae acad. Reg. scient.
acta ann. 1760 Vol. XXI.
193
- Sulzer, I. H. *Die Kennzei-
chen der Insekten* 447
- van Swieten, Gerard. imago
in sui honorem in audito-
rio acad. erecta 555
- Syngenesiae plantae chara-
cteres 535
- Syrinx, zoophytorum genus
513
- T.
- Tabani, insecti origo 210
- Taberg, montis Smolandiae
eiusque ferri fodinarum
descriptio 193
- Tactus organi descriptio
301
- Tae

- Taeniae origo, signa et curatio 202 seqq.
- Tartari emetici vsus in hydropse ascite 267
- Tellina fasciata bicauda, concha 49
- Telluris structurae phaenomena 619 seqq. horum phaenomenorum hypotheses 623 seqq.
- Temperamenta dignoscendi tempus et signa 633
- Tendinum, insensibilitas, circa eam difficultates 76 seqq. harum solutiones 86. 94. disruptio, super hac observatio 130. structura et natura 343
- Terra, quatenus vegetationem promouet 145. ex animalibus acquisita, circa hanc experimenta 205 sq. calcarea ex plantis, animalibus et mineralibus producta, eiusque varietas 207. ex aqua parata, circa eius naturam experimenta 194 sq. ex vegetabilibus producta, circa hanc experimenta 200 sq. terrarum mixturae ad fertilitatem conferunt 152. has instituendi modus ib. terrae motuum causa et phaenomena 25 sq. 64 sq. motus in Syria 22
- Testium, in foetu status eorumque descensus 288 sq. vasorum injectio horumque inuentio controuersa 282 sq.
- Tethyum, zoophytorum genus 517
- Tetrahit Gerardi, nouum plantae genus 405
- Thermometri metallici descriptio et vsus 32
- Thoracum noxa in puerperis 414
- Thorax, ex eius percussione variis in locis orta sonorum diuersitas exhibet signum morborum 58 seq.
- Thuringiae montium descriptio 697
- Tibiae amputatae prologatio peculiaris 523
- Tigridis descriptio et historia naturalis 452. 457 sq.
- Tiliae singularis in suo trunco radicatio 123
- Timony, Antoine, Diff. sur l'inoculation de la petite verole 225. Diff. sur les Bains des Orientaux 228
- Tralles, Balth. Lud. usus opii salubris et noxius in morborum medela Sect. IV. 107
- Transactiones philosophicae Vol. LI. Pars II. 13
- Tremoris corporis vniuersalis curatio 261
- Trepanationis, vsus ad sanandam exulcerationem et cariem tibiae 132 seq. repetitae utilitas 136
- Triller, Dan. Wilh. Diff. de morte subita ex nimio violarum odore oborta 159
- Trochitarum descriptio et species 321 sq.
- Ccc 5 Tubi-

- Tubiporae maris albi indigenae descriptio** 583
- Tubuli vermiculares marini, cornua ammonis referentia** 696
- Tumoris, insignis exstirpatio** 270. in orbita exstirpatio 272. in fornice palati exstirpatio 650. super mammam dextram siti exstirpatio 661
- Tunquinenfis pulueris vsus in mania** 711
- Turpethi mineralis vsus in hydrophobia** 480. 484. 487
- V.**
- Vandermonde, Car. Augustin. vita et obitus** 169.
- Journal de medecine, chirurgie pharmacie cet. Tom. XI. et XII.** 243.
- T. XIII. et XIV.** 644
- Variolarum, naturalium artificialibus superuenientium casus** 227. eruptio balneis adiuta 644. inoculatio vid. Inoculatio.
- Vegetabilium principia chymice disquisita** 140
- Vegetatio, plantarum quid?** 142. eius principia ib. chymica, quae fit ope camphorae 400 sq.
- Venae medinenfis curatio** 261
- Venae, earundem irritabilitas in dubium vocata** 82. eas angustiores inprimis cutaneas ostendendi ratio 106
- Venaesectionis reiteratae, vsus in ascite** 243. in morbis acutis grauidarum 661
- Venenis assumtis defunctorum sectio** 693
- Ventriculi, magni descriptio** 533. in duas partes diuisi obseruatio 708
- Verbesinae, Hebenstreitii descriptio** 587
- Verhandeligen uitgegeven door de Hollandse Maatschappye der Weeten-schappen te Harlem V Deel** 120
- Vermium intestinorum causae et curatio** 202 sqq.
- Veronicae vsus in febre tertiana** 531
- Vesiculae aereae post lapsum praegressum in cute ortae** 264
- Vestimentorum infantilium et puerilium ratio** 414 sq. 631
- Vinadienses thermae, harum descriptio et vsus** 34
- Violarum nimius odor mortis causa** 159 seq.
- Visci betulini examen chymicum** 702
- Visus, vitium peculiare** 526. an sine lente crySTALLINA? 530
- Vitrum an transmittat materiem electricam?** 37
- Vnciae a tigride et pardo differentia** 458
- Vomicae ichorosae signa** 61 seq. purulentae clausae signa 62

Vomi.

Vomitus diurni causa et
curatio 256. 323. cruenti
sequelae 647
Vrinae retentio a verme vil-
loso 263
Vrinariae vesicae structura
praeternaturalis observata
324
Vteri appendices venosae
215. vascula vermicularia
ib. inflammatio 220. gan-
græna et sphacelus ib. abs-
cessus 220 sq. vlcus 221.
scirrhus ib. steatoma et
sarcoma 222. cancer eius-
que cura 222. hydrops ib.
tympanites 223. descen-
sus s. prolapsus ib. pro-
lapsus ex terrore conspe-
cti muris orto curatio 56.
ossei facti observatio 255.
vteri clausi observatio
533. duplicis observatio
709 ad eum suffulcien-
dum instrumentum novum
127. vagina, extrinsecus
penitus occlusa, resecta
et sanata 134. vteri et re-
num peculiares laesiones
522
Vulneris contemplatio et sa-
natio 497 sq. symptoma-
ta 499. per sclopetum for-
tius terrae impactum, pe-
ctori inflicti curatio 249 sq.
symptomata a peregrino

corpore ad 14 annos ei
inhaerente orta 255. va-
riis symptomatibus stipati
historia 648

W.

Wagler, Car. Gottlieb. ab
Acad. reg. scient. Gotting.
praemium accepit 355
Wallerius, Jo. Gottsch. Agri-
culturae fundamenta che-
mica 139
Weissenborn, Frid. Guil.
ab Acad. Reg. scient. Got-
ting. praemium accepit
354
Willich, Christ. Lud. de
plantis quibusdam obser-
vationes 351
Wrisberg, Henr. Aug. ab
Acad. Reg. Scient. Got-
ting. praemium reporta-
vit 355

Z.

Zibethici animalis descriptio
eiusque differentia ab ani-
mali moschifero 464. 466
Zinci vsus ad parandum ther-
mometrum 32
Zoophyta petrefacta quid?
321, zoophyti marini e
coralliorum genere histo-
ria 582 seq.



Emendanda.

Pag. 20. lin. 16. medius lege medius. p. 21. l. 10. elixir proprietatis lege elixir vitrioli l. 15 loco proprietatis lege vitrioli. p. 30. l. 16. corrosiua l. corrosiuas. p. 53. l. aguam l. aquae p. 58. l. 2. cognofuntur l. cognoscuntur. p. 60. l. 29. patefciaiendis l. patefaciendis p. 66. l. 4. hydragyri l. hydrargyri. p. 93. l. 73. frusta l. frustra. p. 97. l. vlt. varolarum l. variolarum. p. 101. l. 26. post 1762. add. 4to. p. 106. lin. 7. post pl. 2 $\frac{1}{2}$ add. 4to. p. 120. l. 15. post 1760. add. 8vo. p. 146. l. 8. vegetarianem l. vegetationem. p. 181. l. 23. Giovanni l. Ginanni. p. 194. l. 13. nimis l. minus. p. 207. l. vlt. maximum l. minimum. p. 244. l. 30. nonuullis l. nonnullis. l. 31. Mateau l. Morteau. p. 255. l. 29. scirrofa l. scirrhusa. p. 260. l. 8. ceaffrunt l. cessarunt. 283. l. vlt. queaut l. queant. p. 290. l. 21. post 1761. add. 4to. p. 292. l. 9 Regiae l. Regiae. p. 310. l. 11. post 1761. c. Ind. add. 4to. p. 353. l. 14. ob lege ab. lin. 26. scripsit l. scripserit. p. 354. l. 28. erat l. effet. p. 406. l. 26. fthaecadum l. ftaechadum. p. 418. l. 17. post 1762. add. 4to. p. 444. l. 2. peuitus l. penitus. p. 468. l. 8. post 1762. adde 4to. p. 486. l. 10. fuerit l. fuerint. p. 584. l. 7. imperbis l. imberbis. p. 612. l. 11. post 1762. adde 4to. p. 624. l. 6. Leignitius l. Leibnitius. p. 631. l. 31. affatam l. affam. p. 640. l. penult. edanem l. eandem. p. 687. l. 13. post 1762. add. fol.

